

SCIENTIA ECLIPSIUM

EX IMPERIO, ET COMMERCIO
SINARUM ILLUSTRATA,

COMPLECTENS

INTEGRAS CONSTRUCTIONES

ASTRONOMICAS

P. JACOBI PHILIPPI SIMONELLI,

OBSERVATIONES SINICAS &c.


P. IGNATII KEGLER,

INVESTIGATIONES ORDINIS

ECLIPSIUM

P. MELCHIORIS A BRIGA

SOC. JESU.



ROMÆ, Typis APOSTOLI DE RUSSIS,
Et LUCE, Apud SALV. & JO. DOM. MARINO. 1747.

CUM APPROBATIONE.





ILLUSTRISSIMIS . ET . EXCELLENTISSIMIS . DOMINIS

TRIBUS . UNANIMIS . FRATRIBUS

D. LAURENTIO . DUCI . PALIANI
D. MARCO . ANTONIO (*)
D. PETRO

C O L U M N Æ

EXCELLENTISSIMI . D. FABRITII

NEAPOLITANI . REGNI

COM. STABILIS &c.

FILIIS . NATU . MAJORIBUS

* Cum secunda Pars hujus Operis imprimeretur D. M. ANTONIUS post tri-
duas Disputationes de Physico-
Mathesi de Theologia,
de Jure Canonico cum
plausu publice habitas in
Quirinali Apostolico Pa-
latio coram SS. D. N. BENE-
DICTO PAPA XIV, statim ab eodem
Debor, & Præful Sacri
Apost. Palatii Præfectus
creatus est.

IV
 CONSTANTI . AVORUM . SPLENDORE . CLARISSIMIS
 VETÛSTISSIMAE (a) . AMPLISSIMAEQUE . GENTIS
 NULLI . ROMANARUM . SECUNDAE
 REGUM . PROGENIE . INCLYTAE (b)
 SUPREMO . PONTIFICATU (c)
 PERPETUIS . SACRAE . PURPURAE . INFULIS (d)
 CLASSIUM (e) . EXERCITUUMQUE . PRAEFECTURA
 ET . ALIIS . MAIORUM . DIGNITATIBUS
 DOMI . MILITIAEQUE . PRAECLARE . GESTIS
 FEUDORUM . MULTITUDINE . POSSESSARUM . ARCIUM . MUNITIONE
 ETIAM . IN . PRIVATA . FORTUNA . INTER . NON . REGNANTES . ILLUSTRISSIMAE
 DE . CHRISTIANA . REPUB. (f) . DE . LITERIS . DE . RELIGIONE (g)
 OPTIME . MERITAE
 SED . NON . MINUS . PROPRIA . VIRTUTE . CONSPICUIS
 AB . IPSA . ADOLESCENTIA
 PRAESERTIM . PER . SEX . FERME . ANNOS . IN . NOBILISSIMO
 COLLEGIO . PTOLEMAEO
 UBI . MULTIPLICI . EQUESTRIUM . ARTIUM . EXERCITIO
 RHETORICAE . ET . LINGUARUM . CULTURA
 ASSIDUO . SCIENTIARUM . STUDIO
 PHILOSOPHIAE . MATHEM. . JURISPRUDENTIAE . THEOLOGIAE
 NAVATA . EGREGIE . OPERA
 MODESTIA . IN . SESE . COMITATE . IN . SOCIOS
 EXIMIA . IN . DIUM . PIETATE
 FLORENTISSIMAE . IUVENTUTI
 CONTINUATA . AC . STABILI . FIRMITATE . PRAEFLUXERUNT
 IN . IPSORUM . EX . FODEM . SENENSI . COLLEGIO . DISCESSU
 ATQUE . IN . EGRESSU . E . SUO . THELOGICO . GYMNASIO
 QUOD . PER . BIENNIUM . SIMUL . HONORARUNT
 MELCHIOR . A . BRIGA . E . SOCIETATE . JESU

TRI-

TRIPLEX . OPUS

DE . SCIENTIA . ECLIPSII

COMMERCIO . SINARUM . ET . EUROPÆ . ILLUSTRATA

AD . PUBLICAM . RARI . INTER . PRINCIPES . EXEMPLI (b),

AC . MERITORUM . CONTESTATIONEM

AD . PERENNEM . IN . BENE . COEPTIS . OPPIGNERATIONEM

AD . CONCILIANDUM . TRIBUS . AUCTORIBUS . IMMUTABILE . PRÆSIDIUM (d)

OFFERT . DONAT . DEDICAT

A. D. (h) MDCCXLIV.

- (a) Gentis Columnæ originem *Sammaruceus* ab Hercule deducit; alii a Trajano Imperatore; plures a Cajo Mario septies Consule *Jugurthino Cimbræque triumpho* illustri; alii aliunde. Vid. *Crescent. Narrat.* IX, c. 1. *Gamberti Tract. Apol.* parte I. pag. 68; sed præstat fieri Olympo similem, qui præ summa altitudine *caput inter nubila condit*.
- (b) Brandeburgensem (nunc Regum *Rossia*) Familiam e Columnæ Gente descendere approbat Martinus V, apud *Petrum Ludovic M. S. Diplom.* Tom. V, & in *Actis Eruditor.* Lips. 1714.
- (c) *Hadrianus I.*, Pont. Max. consecratus V Idus Febr. an. DCCLXXII honorificentissimo apparatu excepit Romæ Carolum Magnum, a quo Sedi Apostolicæ Veteres Provinciarum donationes confirmata, novæ adjectæ excusso Longobardorum jugo, ut refert *Baronius* ad an. 774: fedit annos XXIII, menses 10, dies 14, vel 17. *Nobilis, & Magna gentis jam Gente* (ut legebatur in ejus Epitaphio, quod a Carolo Magno compositum testatur *Natalis Alexander Hist. Eccl. Sæc. VIII, c. 7*) quippe *Theodori Filius de regione Via Lata prope S. Marcum*, hoc est de Gente, quæ postea Columna dicta est. Illi haud impar *Martinus V.*, Pont. Max., antea Ordo Cardinal. de Columnæ electus in Generali Concilio Constantiensi (Vide *Spondanum* ad an. 1417): fedit annos XIII, Menses 3, dies 10.
- (d) S. R. E. Card. Cardinalium ejusdem Gentis imagines habes apud *Ughelli* Libro cui titulus: *Columnensis Familia Nobilissima, &c.*
- (e) In elogiis Ducum Illustrium inter eos, qui anno 1481 Hydruntum Turcis eripuerunt, ludatur *Fabrizius Columna* sub Carolo VIII, Reg. Gall., ac deinde sub Ferdinando Rege Aragoniæ; *Stephanus Columna* sub Paulo III, Copiarum Sanctæ Ecclesiæ ductor, ac dei de Cæsarearum sub Carolo V Imperatore. *Marcus Antonius Columna* Pontificiæ Classis Præfatus in celebri ad Echinadas Insulas de Turcis victoria sub S. Pio V, relaxat Romam reverfus ejusdem Pontificis iussu, & Senatûs Consulto triumphavit, ac Statuam in Capitolio erectam habere meruit. Mitto *Joannem Cardina-*

dinalem *Columnam Pontificiarum Copiarum* pariter Ductorem sub Gregorio IX, aliisque Antiquiores.

- (f) In literis Inter Scholarum Principes recensetur *Egidius Columna Doctor Fundatissimus vocatus, patriâ Romanus & splendidus, & Illustris Virgo, Nobili quippe Columnensium Familia oriundus*. Inquit Cave in Hist. Literar. ad an. 1296 (post Bellarminum de Scriptores Ecclesiasticis ad an. 1290) Professor Paris. Prior Generalis Ordinis Eremitarum S. Augustini Archiepiscopus Bituricensis, Primas Aquitanie Inter S. R. E. Cardinales adscriptus, antea Discipulus S. Thomæ, quem egregio libello defendit: obiit Avenione 1316, XI Cal. Jan. ætatis 69; Deinde *Beati* titulo condecoratus, ut videtur est apud *Philippum Bergomasem* in supplemento Chronologia an. 1296, *Joan. Ant. Bianchi O. M. de Potestate Ecclesiastica Lib. 1. §. XI, Natal. Alexand. Hist. Eccles. Sec. XIII. c. V. artic. 1. & quo cap. præcedente laudatur Joannes Columna Cardin.*, qui circa annum 1250, nomen suum ab oblivione vindicavit *libris decem*, quos *Mave Historiarum* inscripsit. De alio *Joanne Card. Columna*, ad quem sunt *Petrarchæ* Literæ, vide *Ciacconium* ejusque continuat. ad ann. 1347. Franciscus autem Petrascha in sua triumphali pompi, e Columnenium Principum Domo (ubi olim Constantini Magni Palatium extitisse fertur) ad Capitolium deductus, ibique Ponticæ laureæ coronatus est, de quo argumento *Hieronymus Squarciaf.*, & alii in ejus Vita. De *Aleasio Cardinali Columna* sui sæculi Mæcenate consule citatum *Ciacconium* ad an. 1585, pag. 183. Inter homines politici laude celebres illustrior cæteris *Victoria Columna Magni Ductoris Ferdinandi de Avalos Marchionis Ficarizæ* uxor, de qua *Hieronymus Vida* in Nice.

- (g) In Religionis curâ supradictis adde *Joanem Cardinal. Columnam*, de quo *Hieronymus Henningus* in Italiz Tab. *Joannes Cardin. S. Prædix Legatus Honorii III cum exercitu victor in Egypto Columnam*, ad quam *Christus flagris cæsus erat Romam detulit: unde cognomen*. Confer *Ciacconium* ad ann. 1216, pag. 663. Adde proligatam hæresim Iconoclastarum in VII Synodo OEcumenicâ assensu *Hadriani I* convocatâ, militique Legatis. Maximum quoque, & diuturnum Schisma per electionem *Martini V*, sublatum in Concilio Constantiens. &c. Ex Fœminis sufficiat memorasse *Joannam Mariam a Passione* Filiam *Philippi Columnæ*, Neptem *Serapis S. Caroli Borromæi*, Romæ Monial. Carmelit. Exalceat. Reginæ Cæli Fundatricem, in odore Sanctitatis mortuam an. 1675, de qua *Blasius a Purificatione* in ejus vita.

Nec tria Rudia Militiæ, Literarum, ac Pietatis, veluti *Charites* in antiquis Gemmis talis habitu circa eundem scapum sibi murum nexæ condecorant Christi Ecclesiam, quam *Columnam*, & *Firmamentum* unitatis vocavit Apostolus 1 ad Timoth. c. 3. Ita munienda Sacra Imperia conjunctis uno spiritu viribus Bellicæ Fortitudinis, Ingenii, & Religionis, quam conjunctionem apud *Veteres Egyptios* significabant tres Columnæ super triangulari basi ante fores Templi constitutæ cum uni. I Sphinge superimpositâ, quales multiplici ordine vidit in Thebæide *Paulus Lucas*, Lib. cui titulus. *Voyage du Levant*.

- (h) Ut enim præluxerat Exemplum Eminentiss. Patris *Hieronymi S. R. E. Card. Columnæ*, cujus imagine Inter Purgatos Principes suos olim

Col.

Convictores veluti ejusdem Prolemaici Collegii Aula gloriatur; ita nunc tribus Majoribus Fratribus ab hoc Cœtu nondum omnino avulsis, destinantur ad succedendum alii Romanorum Principum Filii, ut similiter frondeant: *exemplo monstrante viam* (Manil. Lib. I.)

- (*) *Sfortia Pallavicinus* S. R. E. Cardinal. editioni Carminum Ciampoli, auspiciis excellentiss. D. D. Column. prodeunti præmisit Colu-
maam opere analytico exlatam cum Lemmate:

Per æternæ le nobil' opre cretta.

- (*) Oblatio quidem triplicis Operis facta est Senis per Autumnum anni MDCCXLIV; sed impressio (quamvis ad eam expediendam diversi artifices sint adhibiti) *absente Auctore*, non facile absolvetur ante annum MDCCXLVII expletum, postquam præcipuum Sinicarum Observationum Auctorem accepimus obiisse.

TESTIMONIA DE ASTRONOMIÆ UTILITATE VERÆ FIDEI PRÆCONIBUS IN SINIS.

- I. " Dilecto Filio *Ferdinando Verbieft*
" Vicario Provinciali Sinensi Societatis Jesu

" INNOCENTIUS PP. XI.

- " Dilecte Fili Salutem, &c. Incredibilis prope argumentum
" lætitiæ attulerunt nobis literæ, quibus post devotas filia-
" lis tuæ erga Nos observantiæ significationes, duplex ex
" amplissimo isto Sinarum Regno munus ad Nos detulisti.
" Missale videlicet Romanum Sinensi idiomate conscriptum.
" & Imagines Astronomicas (*) Sinensi item more a te affa-
" brè delineatas ad conciliandum Catholicæ Fidei favorem
" Gentis in omni Disciplinâ liberaliter excultæ, & ad o-
" mnem virtutem mirificè propensæ. Jucundissimum verò
" præ cæteris fuit ex hisdem literis cognoscere, quàm Sa-
" pienter, atque opportunè profanarum Scientiarum usum.
" in Sinensium Populorum, & ad Christianæ Fidei incre-
" mentum utilitatemque deflexeris, earum beneficio refel-
" lens falsas criminationes, & calumnias, quibus nonnulli
" in Christianum nomen invehebantur, viamque tibi ster-
" nens ad eum gratiæ locum apud Sinarum Regem ejusque
" consiliarios, ut solutus ipse gravibus molestiis, quas diu
" magno fortique animo pertulisti, Socios quoque tuos Mis-
" sis.

- (*) Sinicas Astronomicas Tabb. Magni Planisphærii Cælestis vide in Bi-
blioth. Vaticanæ.

„ sionarios ab exilio revocaveris, & Religionem ipsam non
 „ solum pristinae libertati, dignitatique restitueris; sed etiam
 „ ad meliora in dies speranda provexeris. Nihil enim est,
 „ quod, Dei adjutrice Gratia, sperari non possit, te tuque
 „ similibus Viris apud Gentem istam Religionis causam a-
 „ gentibus, &c.

Datum Romæ apud S. Petrum, &c. 3 Decemb. 1681.
 Pontif. Nost. a. 6.

Exstat in Archivio Brevium ad Principes.

II. JEAN DOMINIQUE CASSINI *Astronomie Indienne*
Paris. 1689 sub initium.

„ J' ay crû, que les Missionnaires a qui l'Astronomie donne
 „ l'entrée chez les Grands, & chez les sçavans par tout
 „ l'Orient, pourrïent tirer quelque avantage de ce tra-
 „ vail, &c.

*Inferitur etiam tome VIII (ex his qui antecedunt annum 1699)
 Commentariorum Regiæ Scientiarum Academiæ pag. 215, edit.
 Paris. 1730.*

III. *In Præfatione Libri, cui titulus Innocentia Victrix (adver-*
versus Ethnicorum & Mahomettanorum accusationes) jussu R. P.
 ANTONII DE GOVVEA S. J. in Sinis V. Provincialis Si-
 nico-Latinè exposità, primum caput, de quo accusabantur Evan-
 gelii præcones, narratur fuisse de ignorantia Astronomiæ. Ve-
 „ rùm, inquit Auctor, pugnante pro suis illo, qui est Veri-
 „ tas, Cælum quidem, experimentaque Cœlestia erroris &
 „ ignorantia conviciunt (accusatores Ethnicos, & Mahomet-
 „ tanos) . . . adebüt peritia singularis rei Astronomicæ . . .
 „ eam denuò partem referaret Evangelio, quam cum olim
 „ aperuisset industria S. J.; Sinensium deinde (aliquot Eth-
 „ nicorum) Superbia, invidiaque Mahomettanorum occlu-
 „ ferat. Sed nunc demonstratis Sole propemodum clariùs
 „ & horum, & illorum erroribus, emerferat quodammo-
 „ do velut ex Eclipti suâ . . . Astronomia Europæa, &c.

*Exstat Latino-Sinice in Biblioth. Coll. Senen. S. Vigiliæ edit. 1671
 in Urbis Quin-chèu metropol. Provincia Quâm-tum. Plura vi-
 de hic III Parte in Epistolâ ad Acad. Lehnensem.*

INDEX PRIMUS

Eorum, quæ hoc Volumine continentur.

M. a B. Triplicis Operis Dedicatio.

PARS I. ET II. E SINIS IN EUROPAM,

IN PARTE PRIMA.

R. P. Philippi Simonelli in Sinarum Imperio tertium Vistoris
Tractatus de Geometricâ sive Optica Eclipsium Solis, Lunæ,
& Siderum Constructione an. 1738 e Sinis ab Auctore
ad M. a B. transmissus.

PROPOS. I. Segmentum Telluris Centralibus Solis radiis illustratum non differre ad sensum ab hemisphærio: eminus visum apparere instar Disci.	Pag. 1
II. Circuli Longitud. & Ascensionis Recta in Disco Terrestri.	2
III. Angulum Axium Equatoris, & Ecliptice in Disco Ter- ra determinare.	6
IV. Equatorem, Meridianum, & circulum Longitud. in eo- dem exhibere.	7
V. Parallelos Equatoris instar linea rectæ, quando Sol est in Equatore.	8
VI. Parallelos Equatoris instar Ellipsium, quando Sol ex- tra Equatorem versatur.	10
VII. Solis Declinationem ab Equatore determinare.	25
VIII. Equatoris, aut paralleli projectionem in Discum divi- dere in horas, &c.	27
IX. Datæ diametris Ellipsium construere, ac dividere.	30
X. Instrumentum Transportatorium parare.	35
XI. Angulus plani Orbitæ Lunaris, & Ecliptice in Disco, atque axium utriusque.	41
XII. In Syzygiis angulum verum axium Ecliptica, & Orbi- tæ Lunaris invenire.	46
XIII. In Syzygiis Lunæ latitud. determinare.	47
XIV. Latitud. centri umbræ Lunaris in Disco equalis ad sen- sum veræ Latitudini Lunæ.	48
XV. Apparentia Orbitæ Lunaris in Disco Terrestri ad sensum recta.	49
XVI. Inclinationem apparentem Ecliptica, & Orbitæ Lunaris, atque in hoc motum horarium Luna a Sole æquabilem determinare.	51
XVII. Preparatio ad Ecliptici Typi Descriptionem.	55
XVIII. Typum Eclipsis Terrestris delineare.	56
XIX. Phases Eclipsis Terræ ex Typo per Circulum determinare.	59
XX. Eclipsis Terrestris phases calculo investigare.	62
XXI. Explicite Projectiones in Disco Terrestri similes aliis in plano	

	<i>plano parallelo secante cylindrum, seu totum radium Solis in Cælo Lunari.</i>	64
PROP. XXII.	<i>E Typo Eclipsis Terrestris tempus, & phasæ pro dato loco determinare.</i>	66
XXIII.	<i>Defect. Solar. phasæ ex eodem Typo la Schemate exhibere.</i>	75
XXIV.	<i>Eclips. Solaris phasæ indidem per calculum eruere.</i>	80
XXV.	<i>In Disco Terrestris circulos horarios, & Digito defect. Solaris delineare.</i>	85
XXVI.	<i>Altitudinem Poli, arcum semidiurnum, & dati puncti in perimetro Disci latitudinem assignare.</i>	86
XXVII.	<i>Dato puncto in Disco Terra, & horâ, qua ibidem numeratur, ejus latitudinem reperire.</i>	92
XXVIII.	<i>Tab. Geographicam exhibentem Eclipsis phasæ pro tota Tellure delineare.</i>	97
XXIX.	<i>Peculiaria circa Lunæ Eclipses.</i>	128
XXX.	<i>Siderum sub Lunâ occultationes eodem metodo construere.</i>	134
	TABULÆ Prima Partis.	141

SECUNDA PARS.

R. P. Ignatii Kegler S. J. in Imperiali Acad. Pekinensi Astron. Præsidis, & Sociorum Sinica Observationes Eclipsium, variorumque Cælestium congressuum, &c.
Europ. Observ. consensum adjecit M. a B.

CAP. I.	<i>Observationes Defectuum Luna.</i>	Pag. 1
II.	<i>Observationes Defectuum Solis.</i>	39
III.	<i>Observationes Eclipsium Jovis, & Satellitum.</i>	55
IV.	<i>Specimen occultationum, vel insigniorum congressuum in aliis Planetis.</i>	66
V.	<i>Fixæ aliqua a Lunâ occultatæ.</i>	68
VI.	<i>Cometarum Transitus juxta aliquas Fixas.</i>	71
	TABULÆ Secunda Partis.	88

PARS III. ET IV. EX EUROPA IN SINAS.

TERTIÆ PARTI PRÆMITTITUR INDEX

Investigationum P. Melchioris a Briga S. J. Theologi de Ordine Eclipsium.

- I. *In scriptis, & in Naturâ suâ.*
 - II. *In suis Periodis, sive Harmoniâ Periodicâ.*
 - III. *In Doctrinâ (qua erit QUARTAPARS, quando materia copia & circumstantia majori brevitati minùs favorabiles hoc voluerunt) de quibusvis Eclipsibus calculandis, representandis, & observandis.*
- Ac cedunt in fine NOVÆ TABULÆ Astronomicæ ejusdem Auctoris.*

IN.

I N D E X II.

TABULARUM ASTRONOMICARUM

TOTIUS VOLUMINIS.

In fine PRIMÆ PARTIS TAB. I. (P. Philippi Simonelli) *expansa Universæ Angulorum in Disco Terra, axium Aequatoris, & Eclipticæ ad dena minuta Longitudinis vera Solis in Eclipticâ, in hypotbes ejus maxima obliquitas* 23, 30'. Pag. 141

TABULÆ Cassinianæ pro Eclipsibus Luna ab Editore adjectæ.

TAB. II. (Cassini 28) *Differentia inter oppositionem, & medium Eclipsis.* 150

TAB. III. (Cassini 29) *Semidurationis Eclipsis totalis Luna in umbra Terræ.* 151

TAB. IV. (Cassini 30) *Semidurationis Eclipsis Luna in minusis, & secundis Gradibus.* 152

TAB. V. (Cassini 31) *Quantitatis Digitorum & minusorum Eclipsis.* 156

In fine SECUNDÆ PARTIS (præter Tabulas Cometarum 1737, 1742, & 1744 cap. VI) subjicitur

TAB. I. *Geographica R. P. Christophori Maire S. J. Theat. Polem. Lectoris Longitudinis, & Latitudinis præcipuorum totius Orbis locorum ducto initio Longitud. ab Infula Ferri.* 88

TAB. II. N. N. *Index Chronologicus Solis Eclipsium, quarum fit mentio in toto hoc Volumine.* 93

TAB. III. N. N. *Index Chronologicus Lunarum Deliquiorum, quarum fit mentio in toto hoc Opere.* 97

I N T E R T I A P A R T E.

INVEST. I. §. II. *Tabella Parallax. Horizontal. Luna, ejusque Distantia a centro Terræ.* Pag. 7

Ibidem §. VIII. Diametrorum Solis, & Luna. 20

INVEST. II. §. V. *Quantitatis anni Solaris Astronomici juxta varias sententias.* 106

§. VI. *Quantitatis Mensum Lunarum.* 109

§. IX. *Termini Eclipsium Solarium, Arcus inter eentra in Conjunctionibus.* 119

§. IX. *Termini Eclipsium Lunarum. Latitudo vera Luna in Oppositionibus.* 133

IN FINE III. INVESTIG. SIVE IV. PARTIS,

*Novæ Tabula Astronomica P. M. a B.
Pro Periodicâ Eclipsium Harmoniâ,
& pro Sinicarum Observationum usu.*

TABUL. I.	<i>Motus Solis a priore Luna Nodo, & Epacta exactiores.</i>	Pag. 11
II.	<i>Gradus correspondentes circa Nodos, cum Latitudine, & reductione Lunæ ad Eclipticam.</i>	v
III.	<i>Motus melius relativus in gradibus circuli Solis a Nodo Lunari, & Lunæ a Sole.</i>	vi
IV.	<i>Eclipses annorum XX, ab ann. 1731.</i>	vii
V.	<i>Duplex Periodus Ægyptio-Chald. Eclips. Solis, & Lunæ.</i>	xvi
VI.	<i>Novem Periodi Ægyptio-Chald. sese immediatè consequentes.</i>	xxii
VII.	<i>Ann. Periodici sine Luna Describunt.</i>	xxiii
VIII.	<i>Parallelismus Eclipsium Lunæ in principio, & fine Periodi 179 annorum Lunariarum.</i>	xxlii
IX.	<i>Parallelismus Eclipsium Solis in principio, & fine ejusdem Period. 179 annor. Lunar.</i>	xxlii
X.	<i>Novæ, ac Majores Eclipsium Periodi continuatâ serie per undecim annorum millenaria.</i>	xxiv
XI.	<i>Conversionis Eclipticorum digitorum Europe in Sinicos, Sinicorum in Europæos.</i>	xxv
XII.	<i>Conversionis minorum Europæorum in Sinica, Sinicorum in Europæos.</i>	xxv
XIII.	<i>Digitus Ecliptici Europæi actualis Obscurætionis cum servulis circuli maximi, & apparentis Diametri Luminarium comparati.</i>	xxvi
XIV.	<i>Comparatio Anguli facti in Disco Terreſtri ab axe Equatoris, & Eclipticæ juxta istius triplicem obliquitatis hypothesim, seu varietatem gr. 23, 30', gr. 23, 29', gr. 23, 28'.</i>	xxviii
XV.	<i>Synopsis Doctrina Hallejanæ de Mercurii transitu ante Solis Discum.</i>	xxix
XVI.	<i>Synopsis Eclipsium Satellitum Jovis juxta principia Cassiniana.</i>	xxx



SCIENTIÆ ECLIPSIUM

Ex Imperio , & Commercio Sinarum
illustratæ

PARS PRIMA

Geometricæ , atque Opticæ Constructionis
Eclipsium a Recentioribus Astronomis
excogitatæ

THEORIA ET PRAXIS

ABSOLUTA, EXPOSITA, DEMONSTRATA

A R. P. JACOBO PHILIPPO SIMONELLI

SOCIETATIS JESU

In Sinarum Imperio iterum Visitatore .

ROMÆ , M DCC XLIV.

Ex Typographia Antonii de Rubeis in via Seminarii
Romani prope Rotundam .

SUPERIORUM PERMISSU.

PRO INTRODUCTIONE AD HANC PRIMAM PARTEM
VIDERE POTERIT BENEVOLUS LECTOR
IN TERTIA

CONCORDIAM DOCTRINÆ
DE ASTRONOMICA ECLIPSIIUM CONSTRUCTIONE.

AUCTOR LECTORI.



Am Solis, quam Lunæ defectus, communiter *Eclipses* dictos, in ipsis Luminaribus consideraverunt veteres Astronomi: & quantum attinet ad Lunam, aptissimè; cum enim revera Luna ipsa Eclipsim patiatur, quum Terræ se inter ac Solem interpositæ umbram subit, luminis sui, quod integrè à Sole habet, vel totum, vel partem amittit, cum maximè pleno nobis orbe fulgere deberet. Et hinc facili admodum etiam calculo omnia, quæ ad ejusmodi Eclipses pertinent, determinarunt, eademque etiam nunc methodo Recentiores utuntur. At quantum ad Solem, qui in se fons luminis, quod non aliunde mutuatur, corporis nullius obumbrationi est obnoxius, non licuit rem eadem facilitate, ac brevitate expedire. Solis enim defectus non Solis sunt Eclipses, sed Terræ: nam hæc est, quæ tunc Lunæ inter se ac Solem interpositu, Solis aspectu, ejusque lumine in toto, vel parte privatur, eodem prorsus modo, quo Luna ex Terræ interpositione. At Luna, a Sole longissimè distans, a Terra vero parum admodum respectivè ad distantiam a Sole, valdè diversas, sensibilesque è diversis Terræ locis spectata patitur à Sole Parallaxes. Hinc

veteres per Parallaxium supputationem Solis post Lunam occultationes ad calculum revocare coacti sunt ; quæ supputatio quam prolixa , morosaque sit , experti non ignorant . Primus (ut ait *P. Deschales*) ejusmodi defectus ut Terræ Eclipses , quales verè sunt , consideravit *Keplerus* , easque , utpotè Lunaribus omninò similes (excepto quòd Lunares in Plenilunio , quando aspicienti Terram è Luna appareret conjunctio Terræ ac Solis ; Terrestris verò in Novilunio , cum similiter è Luna appareret Terra pleno Orbe fulgens , contingunt) , statuto verò Novilunii veri momento , eodem omnino facillimo calculo , quo Lunares determinari posse detexit . At quia nobis in Terra positis ejusmodi Terrestris Eclipsis phases aspicere in ipsa Terræ facie , ac observare non licet ; nulli esset usui Astronomiæ ejusmodi Eclipsium calculus , nisi inde Solis post Lunam occultationis (quam tantum datur nobis conspiciere) tempora , ac phases colligantur . An idem auctor rem hucusque sit persequutus , scire non possum , cum ejus commentarios nunquam viderim . Saltem censeo in lucem id non protulisse , nam idem *Deschales* Eclipsis Terrestris calculum integrè exponens in suâ Astronomiâ de eruendis inde defectus Solaris phatibus innuit nihil . Illud certum est saltem a Recentioribus rem hanc fuisse perfectam : quis autem is fuerit , & quis primus edicere non possum , cum nullibi legerim ; imò nec ipsam methodum , præterquam leviter indicatam apud aliquos ; nempe ajunt si fiat typus Eclipsis Terrestris , & in eo convenientes apparentiæ locorum , penumbræ Lunaribus &c. aptè determinentur , posse inde statui defectus Solaris occurrentis phases omnes : methodum autem typi delineandi , & inde propositum eruendi , integro , altoque premunt silentio . Ejus methodi meram praxim oretenus brevissimè ante aliquot annos amicus vir mihi communicavit : & triennio post illius solidam quidem ac dilucidam , breviorē tamen expositionem , demonstrationemque in Romano Collegio a se propositam ad me pro suâ humanitate transmisit *Pater Horatius Burgundius* in Collegio eodem Matheseos Professor . Hac perfecta , animadverti rem dignam esse , cujus Theoria plenius exponeretur , ac praxis integra ad omnem , quoad posset , facilitatem , simulque accuratorem redigeretur . Ita-
que

que curam hanc, cum primum, & quantum per alias majoris momenti occupationes licuit, in commune commodum suscepi. In progressu viam nonnihil a prælaudati Patris via diversam, tenui, quæ mihi planior visa est, ac minus imaginationem fatigans: addidi insuper omnia, quæ in hac re desiderari possent, ac peti. In omnibus tam geometricam, quam trigonometricam praxim profero, ubicumque utraque locum habet: quod ad claritatem, pleniorque intelligentiam Tyronibus confert plurimum: insuper mirum quantum ambæ invicem se juvent: ac tandem, ut integrum sit per alterutram rem conficere, si quando contingat non adesse in promptu necessaria ad alteram. Porro Elementa communia, quæ novæ hujus methodi peculiaria non sunt, nec hic requiras, sed ex communi Astronomia, in quâ Lectorem non peregrinum esse oportet, supponuntur. His præsuppositis, cætera fient, ut in sequentibus. Experimentum autem probabit, quàm facile, expeditè, ac tutò, præ methodo veterum, omnia ad Solares defectus spectantia, non pro uno tantum loco terrestri, sed pro omnibus omninò, calculari, atque edici possint hac via; imò & oculis ipsis subjici; idque etiam pro Lunæ Eclipsibus, ac siderum omnium sub Luna occultationibus. Utere ergo elucubratione hac qualicumque. Si quid in ea Eclipsium tenebris luminis affusum reperias, illum lauda, qui Pater est luminis, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. Vale.

I M P R I M A T U R ;

Si videbitur R^{mo} P. Mag. Sacri Palatii Apostolici.

Ferdinandus M. de Rubéis Archiep. Tarsen. Vicefg.

JUssu Reverendissimi Patris Aloysii Nicolai Ridolphi S. P. A. Magistri vidi librum inscriptum *Scientia Eclipsium R. P. Jacobi Philippi Simonelli Societatis Jesu*, & quum nihil in illo sit, quod ullo pacto Catholicæ Christianæ Religioni, aut bonis moribus adversetur, edi posse censeo.

Ex Collegio Clementino 18. Maji 1743.

D. Joan. Franciscus Baldinus Cl. Reg. Congr. Somaſebæ :

Librum cui Titulus : *Scientia Eclipsium Auctore R. P. Jacobo Philippo Simonelli Soc. Jesu*; mandante Reverendissimo Patre Aloysio Nicolao Ridolphi Sac. Pal. Ap. Magistro, legi, atque in eo nihil, quod Fidei aut Morum Doctrinæ adversetur animadverti. Dignum propterea censeo, qui in rei Astronomicæ commodum, atque utilitatem, publica luce donetur.

Ex Hospitio SS. Bonifacii & Alexii, Prædic. Non. Junii 1743.

*Didacus de Revillas Abbas Hieronym. Sac. Indicis
Congreg. Conf. & Publ. Math. Profesi.*

I M P R I M A T U R .

Fr. Aloysius Nicolaus Ridolphi Ord. Prædic. Sacri Palatii Apostolici Magister .

TRA-

TRACTATUS
DE GEOMETRICA SIVE OPTICA
ECLIPSIUM
SOLIS LUNÆ ET SIDERUM
CONSTRUCTIONE.

PROPOSITIO I. THEOREMA I.

Segmentum Telluris centralibus radiis Solis illustratum est ad sensum hemisphæricum, in cujus Polo vel axe semper Sol est, & bujus centrales radii ad ejus segmenti basim pro parallelis invicem, & ad eam basim perpendicularibus physice haberi possunt.



Esto S centrum Solis, Terræ S , ST radius jungens centra, occurrens superficiæ Telluris in S . Per ST esto planum secans Terram (1. & 6. 1. Theod.) in circulo maximo DSE , & aliud BT ad illud normale, cujus sectio cum Terræ circulus maximus DGE , qui erit basis hemisphærii terrestris DSE , in cujus polo, seu axe TS est centrum Solis. Esto DE communis planorum sectio, quæ ad ST recta est. Sint SA , SB radii Solis centrales tangentes Terram in punctis A , & B circuli DSE . Clarum est radiis centralibus ultra SA , SB Terram non attingi: ideoque A , & B esse limites centralis illuminationis. Jungantur AB , TA , TB .

Demonstratio. SA , SB (26.3. Euc.) sunt æquales; item TA , TB semidiametri Telluris, & ST communis est

A

utri-

Tab. I. Fig. 1.

2 SCIENT. ECLIPS. PARS I.

utriusque triangulo SAT , SBT : ergo (8.1. Eucl.) AST æqualis est BST , & STA ipsi STB , consequenter eorum mensuræ SA , SB æquales sunt. Sunt autem (13.3. Eucl.) SAT , SBT recti: ergo (32.1. Eucl.) STA , STB singuli deficiunt a recto, & eorum mensuræ à quadrante quantitate Anguli AST , seu æqualis BST . Hi anguli sunt Parallaxis Solis horizontalis, quæ juxta Ricciolum non excedit $30''$, juxta alios recentiores $15''$, aut $10''$. *Hirius* ponit tantum $6''$: ergo A à D , & B ab E distant ad summum $30''$, hoc est $\frac{1}{1000}$ totius quadrantis, nempe ad summum 500. passibus geometricis, juxta *Hirium* tantum 100. quam distantiam comparativè ad Telluris hemisphærii patet non esse sensibilem. Segmentum ergo ASB physicè est ipsum hemisphærium DSE , quod est primum.

II. Quia SA , SB æquales sunt, & SC communis, & anguli intercepti ASC , BSC ostensi sunt æquales, erit (4.1. Eucl.) AC æqualis BC , & SCA , SCB , æquales, ideoque (13.1. Eucl.) ambo recti: ergo SAC , $SB C$, ut prius, deficiunt à rectis ad summum singuli $30''$, nempe insensibiliter. Radii ergo Solis centrales sunt ad sensum recti ad basim dicti hemisphærii, consequenter (6.11. Eucl.) invicem paralleli sunt ad sensum. Patet autem propter quadrantes DS , ES , S esse illius hemisphærii polum, & TS axem, in quo semper est Sol, quod erat secundum, & tertium. Constat ergo totum Theorema. Quod erat demonstrandum.

Coroll. I. Quia oculo statuto in S visio fit per eodem radios SA , ST &c. ac Terræ globositas ad tantam distantiam non discernitur, ut non discernimus in Luna licet incomparabiliter propiore; hinc Tellus ex S apparet discus planus $DIEG$, & per eum videtur pergere Lunæ umbra, vel penumbra, cum hæc in Terram incidit. Quare si is Discus habeatur pro Tabellâ perspectivâ, & in eo determinetur optica viæ Lunæ (hujus enim in plano semper est centrum dictæ penumbrae) apparentia, & in

& in hac loca, in quibus hîc, & nunc Luna apparet, item penumbrae amplitudo, nec non situs opticus locorum terrestrium in dicto hemisphærio existentium, cognosci poterit quas regiones terrestres, & quando umbra attingat, tegat, aut deferat, quantum singulae in umbram immergantur, uno verbo, omnes Eclipses phasas. Hæc omnia in sequentibus præstantur. Itaque cum dico *Discum Terræ*, aut absolutè *Discum*, eam basin intelligo.

Coroll. 2. Quia omnes circuli maximi Cælestes transeunt per *ST* faciunt cum globo Terrestri communes sectiones [1. & 6. 1. Theod.] circulos maximos in eodem plano, & concentricos cum cælestibus; illi pro his ad metiendos angulos ad *T* substitui possunt.

Coroll. 3. Quia iidem circuli transeunt per *S* Hemisphærii nempe per polum basis *DIBG*, sunt ad hanc perpendiculares [15. 1. Theod.] Hinc radii ex *S* Centro solis in singulorum perimetrum incidentes à propriis cujuscumque planis non divergunt: cadunt ergo omnes in uniuscujusque cum Disco Terræ communem sectionem, hæc autem est Disci, & circuli secantis diameter. Et cum circulorum apparentiæ in Disco per eosdem radios determinantur, singuli illi circuli in Disco sunt quique singulae diametri. Itaque nomine talium circulorum in Disco ejusmodi diametros indico.

PROPOSITIO II. THEOR. II.

Circuli Longitudinis, & Ascensionis rectæ Solis in Disco Terræ faciunt angulum æqualem complemento anguli Eclipticæ cum eodem circulo Ascensionis rectæ, tam Sphærici in Sphæra, quàm rectilinei in Disco.

Esto Discus Terræ *ADBF*, super quo hemisphærium illuminatum *ASB*, cujus polus *S*, ubi Sol
A 2 [hoc

Tab. I. Fig. 2.

[hoc est cui perpendiculariter imminet in recta TS jun-
gente centra Solis, ac Terræ]. ASB transiens per mun-
di polos, & S Solem, esto circulus ascensionis rectæ So-
lis, ESC Ecliptica, & LSO circulus Longitudinis,
qui ambo transeunt per centra Solis, ac Terræ, & hinc
per S , consequenter tam hi, quàm ASB [15. 1. Theod.]
ad Discum Terræ recti sunt; & in hoc [coroll. 3. præ-
ced.] erunt AB circulus Ascensionis rectæ, EC Ecli-
ptica, LO circulus longitudinis. Agatur per T recta
 FTD normalis ad AB .

Demonstratio. Tam Discus, quàm Ecliptica recti
sunt ad circumulum Longitudinis [15. 1. Theod.] trans-
euntem per utriusque Polos; quare illorum communis
sectio CE ad circumulum LSO , & rectam LO [3. defin.,
& 19. prop. 11. Eucl.] recta est. Sunt ergo arcus CO ,
 OE quadrantes. Sed etiam FB , DB facti sunt qua-
drantes, ideoque prioribus æquales: ablato ergo com-
muni CB , seu DO , remanent OB , FC , seu ED .
æquales; consequenter anguli FTC , BTO , ETD
æquales. Est autem FTC complementum CTB acuti
anguli Eclipticæ CE in Disco, cum circulo Ascensionis
rectæ AB , DTE complementum obtusi CTB : con-
stat ergo 2. pars Theor: Sed iidem arcus ED , OB , FC
sunt mensura angulorum sphericorum singulis insisten-
tium in polo S [coroll. post 21. 2. Theod.]. Constat er-
go, & prior pars, ac Theorema totum. Quod erat &c.

Coroll. I. Quoniam Æquator rectus est ad omnem
circulum Ascensionis rectæ, omnes enim per ejus polos
transeunt, ex factâ demonstratione constat communem
sectionem disci cum Æquatore semper esse in T norma-
lem ad AB : est ergo recta FTD .

II. Circulus quilibet Ascensionis rectæ Solis est
unus è Meridianis, qui cum in eo Sol est, successivè est
Meridianus, seu congruit cum Meridiano omnium lo-
corum, quibus successivè Sol meridiem facit. Hinc AB
est meridiana, in qua posito B pro plaga boreali, erit A
australis. Et quia propter motum diurnum Solis, hemi-
sphæ-

sphærium Telluris illuminatum, & consequenter ejus basis perpetuò mutatur, ita tamen, ut circulus Ascensionis rectæ Solis sit ei basi semper perpendicularis; hinc fit circulum ASB esse tanquam Meridianum, & AB Meridianam universales, cum Sole quidem mobiles, ac translatos ab ortu in occasum, sed in Disco, qui hic, & nunc est illuminatus eundem semper situm tenentes. Tamen specialiter in constructione Eclipsium exhibet Meridianum locorum in quibus vera Syzygia fit in ipso momento meridiei, si de novilunio; aut mediæ noctis, si de plenilunio res sit. Ita pariter punctum T exhibet punctum quodvis terrestre, cui Sol hic & nunc est verticalis, & specialiter illud in quo vera Syzygia contingit in vertice.

III. Quia axis Æquatoris jacet in planis omnium Meridianorum, & axis Eclipticæ in planis omnium circulorum longitudinis; patet axem Æquatoris in Disco apparere semper in recta AB , & Eclipticæ in LO . Hinc perinde est Circulorum Longitudinis, & Ascensionis rectæ, ac Æquatoris, & Eclipticæ axium angulum in Disco Terræ exhibere.

IV. Sole in Solstitiis versante circulus Longitudinis, & Ascensionis rectæ est idem unus Colurus Solstitiorum; ipse enim per Solis centrum, & per polos tam Eclipticæ, quàm Æquatoris incedit. Cum ergo is Colurus sit consequenter rectus ad Eclipticam; angulus Eclipticæ cum circulo Ascensionis rectæ, seu Meridiano, tunc est Gr. 90, cujus complementum est 0. Ergo tunc Æquatoris, & Eclipticæ axium nullus est angulus, sed uterque axis apparet in eadem linea AB .

V. Sol in Æquinoctiis constitutus circulum Ascensionis rectæ habet Colurum Æquinoctiorum, qui cum Ecliptica facit Angulum Gr. 66 30', cujus complementum est Gr. 23 30'. Quare tunc Axium Æquatoris, & Eclipticæ angulus est Gr. 23 30, & omnium maximus: Itaque hujusmodi angulus in maxima a Solstitiis distantia, nempe initio Y & Δ maximus est, in

in ipsis Solstitiis minimus omnium est, nempe nullus.

VI. Quia circuli Longitudinis transeunt per polos Eclipticæ, qui ab hac utrinque quadrante distant, & SL , SO sunt quadrantes, L & O sunt poli Eclipticæ; consequenter Discus per eos tranliens est unus è circulis longitudinis, nempe ille, qui rectus est ad circulum Longitudinis Solis, & simul Ascensionis rectæ. Hinc initio Y & Δ , cum Sol est in Coluro Æquinoctiorum, qui tunc est Ascensio recta, estque ad Colurum Solstitiorum rectus; hic autem tunc etiam rectus est ad circulum longitudinis Solis, qui cum transeat per puncta Eclipticæ Æquinoctialia distat à Coluro Solstitiorum per quadrantem Eclipticæ; patet tunc Discum Terræ convenire cum plano Coluri Solstitiorum. Cum ergo tam Colurus Solstitiorum, quàm circulus Ascensionis rectæ Solis transeant per Mundi polos, patet tunc hos esse in A , & B . Per hos polos tranliens etiam circulus horæ 6 rectus est ad meridianum, nempe in eo casu, ad Colurum Æquinoctiorum: Ergo tunc etiam Circulus horæ 6 congruit cum Disco Terræ.

PROPOSITIO III. PROBL. I.

*Quantitatem anguli axium æquatoris, &
Eclipticæ in Disco Terræ pro datâ
Solis longitudine determinare.*

Tab. I. Fig. 3.

I. **S**I Sol sit in initiis Y , Δ , \varnothing \mathbb{F} angulus quæsitus habetur ex Coroll. 4, & 5. præced.

II. Si Sol sit alibi, addantur logarithmus sinûs datæ distantiae Solis à proximo Solstitio, & logarithmus tangentis maximæ obliquitatis Eclipticæ, nempe Gr. 23 30' (alii volunt 23 29'). Summa, deleta 1. sinistima, est logarithmus tangentis anguli quæsitî. Ex. gr. In conjunctione Eclipticâ Maji anni 1734, quæ Pekini juxta Tabulas Hirii contingit die 3. hora 6. 0' à meridie tempore vero, reperitur vera Solis Longitudo $S. 1 12^{\circ}$

39'

39' 46" ab Y. Diflat ergo Sol à proximo Solstitio S. 17° 20' 14", hoc est Gr. 47° 20' 14". Sic ergo stabit calculus.

Demonstratio. Est $\triangle AEC$ meridianus, seu ascensio recta Solis, $\triangle AEC$

Sin. Gr. 47° 20' 14" —	Logar. p. 8664970
23° 30' — Tangilog. —	9.6181019
Ang. quæf. Gr. 17° 43' 12"	Tan. l. 19.1047989

quator, cujus cum meridiano angulus $\angle AEB$ rectus: EC Ecliptica, cujus cum \triangle Equatore angulus $\angle EYE$ gr. 23° 30'. In triangulo $\triangle EYE$ præter angulum rectum ad E , notus est obliquus ad Y, & hypotenusa YE distantia Solis à proximo \triangle Equinoctio Gr. 42° 39' 46"; ideoque ejus complementum 47° 20' 14", distantia à proximo Solstitio. Patet ergo ex Trigonometria Spharicâ per datam praxim inveniri complementum anguli $\angle YEAE$ Eclipticæ cum meridiano, qui (per præced.) est quæsitus. Quod erat &c.

Coroll. Hinc facillè paratur Tabula horum Angulorum, ad singulos gradus, semigradus &c. Eclipticæ: addendo nempe Tangil. Gr. 23° 30' cum Logarithmo sinus singulorum graduum &c. distantia à Solstitio: Tabula autem pro uno Eclipticæ quadrante est pro omnibus, ut patet. Tabulam hanc addo in fine ad dena Eclipticæ minuta, unâ cum sequentis à præcedenti differentiâ, cujus usus similis omninò est ac Tabulæ declinationis Solis, de quo in propositione 15^a. 1^a. Gnomonices.

PROPOSITIO IV. PROBL. II.

Æquatorem, necnon Meridianum, & circulum Longitudinis, hoc est axes Æquatoris, & Eclipticæ in Disco Terræ exhibere pro data Solis verâ longitudine.

Centro quovis T describatur circulus (pro Eclipsibus Tab. I. Fig. 4. radius quo major eò aptior), qui diametris in T

nor;

normaliter concurrentibus secetur quadrifariam. Assumpta AB pro Meridiano, & (Coroll. 3. post 2. huj.) axe Æquatoris , erit $\text{Æ} \text{Q}$ (Coroll. 1. ib.) Æquator . Ad partes B abscindatur arcus BO æqualis angulo axium Æquatoris , & Eclipticæ ex Tabula, vel per præceden. reposito; ut in proposito exemplo (hoc semper utor in sequentibus, nili aliter notem) Gr. $17\ 44'$, ex B quidem ad partes occidentales Æ , si Sol sit in semicirculo Eclipticæ ab initio I ad finem II , ut in exemplo; ad oppositas, si in reliquo. Jungantur OTL eritque circulus longitudinis, & simul Axis Eclipticæ . Omnia patent ex demonstratis: unicè ostendendum, cur in priore casu ad partes boreales B axis Eclipticæ fiat occidentalior, in posteriore orientior axe Æquatoris . In figura 2. patet rectam TO ad partes boreales cadere intra crura anguli Eclipticæ cum meridiano obtusi ETB : constat autem ex Sphærâ talem angulum ad partes boreales in priore casu esse à Meridiano in Occidentem, in posteriore ad Orientem. Ad partes autem A australes propter angulos ad verticem, in T æquales, oppositum faciendum per se patet. Constat ergo ratio totius constructionis. Quod erat &c.

Coroll. Quoniam Ecliptica ad suum axem recta est: Si per Tagatur normalis ad LO , erit ea Ecliptica . Hac tamen linea absolutè non egemus, licèt usum aliquem habere possit.

PROPOSITIO V. THEOR. III.

Centro Solis posito in Æquatore, hic in Disco est Disci Q Æquatoris diameter ad Meridianam AB recta. Æquatoris autem Paralleli sunt item lineæ rectæ, eorum diametri ad Meridianam AB Normales, nempe chordæ Disci per gr. distantia Parallelorum in Disco ab Æquatore numeratos.

Tab. I. Fig. 5.

IN Disco Terræ $AFBD$ Esto meridiana AB , cujus circulus $ASB\text{Æ}$, Sol in S , per quod ex suppositione

Æquinoctiis, facillimè exhiberi in Disco Æquatorem, aut ejus quoscumque alios Parallelos.

PROPOSITIO VI. THEOR. IV.

Centro Solis extra Æquatorem versante, Æquator, & ejus Paralleli in Disco Terræ sunt Ellipses, quarum diameter maxima equalis diametro propriæ, cujusque Paralleli, & ad Meridianam recta; minima verò est portio ipsius Meridianæ inter duas chordas distantes utrinque à latitudine Paralleli arcu declinationis Solis in data longitudine: centrum denique in ejus portionis medio.

Tab. I. Fig. 6.

IN Disco Terræ *AFBD* esto *AB* meridiana, *FD* Æquatoris diameter, *STN* radius per centra Solis, ac Terræ, Sol in *S*. Fiant *Fæ*, *Fu*, *Dx*, *Dq* singuli æquales datæ declinationi, & jungantur chordæ *æx*, *uq* secantes *AB* in *a*, & *b*.

Dico I. Æquatorem in Disco esse Ellipsim, cujus diameter minima *ab*, maxima *FD* diameter Æquatoris, ac centrum in *T* medio inter *a*, & *b*. Meridianus sit *ASBN*, Fiant in eo arcus *SÆ*, *SV*, *NX*, *NQ* singuli Æquales datæ declinationi Solis; quæ ponatur borealis. Patet punctum *Æ*, eique oppositum *Q* pertinere ad Æquatorem: est ergo *ÆQ* communis Meridiani, & Æquatoris sectio. Jungantur chordæ *ÆX*, *VQ*, quæ utpote parallelæ radio *NS* [45°. Horograph. nostræ], cum quo arcus æquales utrinque intercipiunt, rectæ sunt ad Discum, ideoque congruunt cum radiis Solis centralibus per *Æ*, & *Q*: & quia æqualiter distant à centro *T*, atque chordæ *Fæ*, *Fu*, necessariò secant diametrum *AB* in punctis iisdem *a*, & *b*.

Demonstratio. Æquator in hypothesi obliquus est

ra-

radiis Solis centralibus; ideoque hi in illius perimetrum incidentes formant cylindrum scalenum, quem Discus Terræ secat obliquè ad basim, nec subcontrariè, cum Discus sit ad latera, seu axem cylindri rectus, basis autem, nempe Æquator, obliqua. Sectio ergo [13. 1. Sere-ni] est Ellipsis: cum ergo ea sectio sit in Disco Æquatoris apparentia, Æquator in Disco est Ellipsis. Præterea puncta a , & b sunt apparentiæ punctorum \mathcal{A} , & \mathcal{Q} Æquatoris; sunt ergo in perimetro prædicti cylindri; & cum sint in Disco, erunt in prædicta Ellipsi. In eadem sunt Puncta F , & D , quæ sunt in communi sectione Æquatoris cum Disco. Item FD secatur bifariam in T , ut etiam ab , cum aT , Tb sint sinus arcuum æqualium: Ergo FD , ab sunt Ellipsis diametri, ac centrum est in T . Sunt autem illæ diametri [coroll. 1. post 2. huj.] invicem normales: ergo [3. defin. 2. Conicor. Des Chales] sunt axes Ellipsis, & [prop. 13. ibid.] FD major est diameter maxima, ab minor est diameter minima: Quod est propositum.

II. Proponatur Parallelus alter, puta, latitud. Bor. G. 40. Retenta priori constructione fiant FG , DK gr. 40. datæ latitudinis; item gc , gb , ki , ke singuli æquales datæ declinationi Solis, & jungantur chordæ ci , be , quæ secant AB in d , & n . Secta dn bifariam in o , per o agatur sy recta ad dn , fiantque os , oy singulæ æquales dati paralleli radio. Dico apparentiam dati Paralleli in Disco esse Ellipsim, cujus diameter maxima, sy minima dn , centrum o . In Meridiano fiant arcus SG , NK æquales singuli dati paralleli latitudini, item GC , GN , KI , KE singuli datæ declinationi Solis. Jungantur chordæ CI , HE , quæ parallelæ sunt ipsi SN , consequenter [29. 1. Eucl.] ad AB , & [8. 11. ejusd.] ad Discum normales; ideoque sunt radii Solis centrales per puncta C & E , transeuntque per puncta d , & n : nam Fg , FG facti sunt æquales; ut etiam gc , GC , gb , GH & c: ergo SC , FC æquales; itemque SH , Fb , consequenter eorum sinus æquales; nempe Td sinus arcus Fc est

etiam sinus arcus SC , & Tn sinus arcus Fh est etiam sinus arcus SH . Jungantur CE , ac tandem facto BP æquali datæ Solis declinationi, jungatur radius TP .

Demonstratio. SAE , GC facti sunt æquales, utpote uterque data Solis declinatio: addito ergo utrinque SC erit $ÆC$ æqualis SG . Similiter ostenditur QE æqualis NK , æqualis $ÆC$. Cum ergo EQ [per casum 1.] sit $Æquator$, recta CE , propter æquales arcus $ÆC$, QE datæ latitudinis parallela ipsi $ÆQ$ est diameter dati Paralleli, qui obliquus erit ad Discum, perinde ac $Æquator$, consequenter ad radios Solis centrales: quare ut in primo casu, ostendetur ejus in Disco apparentia esse Ellipsis. Jam puncta d , & n sunt apparentiæ in Disco punctorum C & E dati paralleli: sunt ergo puncta d , & n in ea Ellipsi, & dn una applicatarum in eâ. Præterea BP , SE facti sunt æquales, addito ergo utrinque SP , erunt SB , $ÆP$ æquales; consequenter $ÆP$ quadrans, ut SB : est ergo P polus $Æquatoris$, & TP ejus axis, qui cum transeat per centra omnium Parallelorum $Æquatoris$, punctum m , ubi TP secat CE est centrum propositi paralleli, consequenter mC , mE æquales. Per m esto radius Solis centralis mZ ; hunc dico transire per o medium ipsius dn . Nam ducta per m recta rmf parallela ipsi dn inter duas chordas Cd , HN , quæ pariter sunt parallelae & sibi invicem, & radio mZ , erunt [33. 1. Eucl.] rf , dn æquales, & rm æqualis erit do segmento dn inter rectas Cd , mZ , ut mf segmento ejusdem dn inter n , & mZ : quare mZ secat rf , dn similiter. Secat autem rf bifariam: nam in triangulis mCr , mEn , mC , mE ostensæ sunt æquales, item anguli in m ad verticem, ut & alterni mCr , mEn : ergo [26. 1. Eucl.] rm , mf æquales sunt. Ergo radius mZ secat etiam dn bifariam: cum ergo hanc secuerimus bifariam in o , patet radium mZ transire per o , & punctum o esse apparentiam in Disco centri dati Paralleli. Tandem per m intelligatur alia diameter paralleli dati recta ad planum meridiani (datur autem hujusmodi diameter, cum Paralle-

rallelus. rectus sit ad meridianum]. & per illius extrema
 radii Solis centrales; hos dico cadere in puncta s , & y
 rectæ per o ad $d n$ normalis, & fieri os , oy singulas aqua-
 les radio dati Paralleli: Nam illi duo radii sunt in super-
 ficie cylindri radiorum. Jam si per eos, & dictam dia-
 metrum in m ad meridianum normalem intelligatur pla-
 num, hoc [18. 11. Eucl.] tam ad meridianum, quam ad
 Discum rectum est: quare radius $m Z$ in eo est, conse-
 quenter planum illud per o transit; estque mo plani illius
 cum meridiano communis sectio; & quia plani illius, &
 Disci communis sectio [19. 11. Eucl.] ad meridianum, &
 AB , seu $d n$ recta est, ea communis Sectio est recta soy ,
 quæ [8. 11. Eucl.] illi diametro per m parallela est: &
 portiones Solis radiorum inter eam diametrum, & Dis-
 cum sunt parallelae, & aequales sunt tum inter se, tum
 ipsi mo , utpote omnes perpendiculara inter easdem pa-
 rallelas: ergo rectæ, quæ eas jungunt, nempe per m se-
 midiametri Paralleli dati utrinque à meridiano, & seg-
 menta os utrinque ab o [33. 1. Euclid.] aequalia sunt. Ta-
 les autem factæ sunt os , oy : ergo prædicti radii cadunt
 in s , & y ; quæ puncta propterea erunt in superficie cy-
 lindri, ideoque, ut in primo casu, in Ellipfi: est ergo
 sy altera applicatarum in Ellipfi Sy , $d n$ bifariam secta,
 mutuo in o , sy , $d n$ sunt Ellipsis diametri, & quia ad in-
 vicem normales, etiam sunt axes: quare ut prius, sy
 major est diameter maxima, $d n$ minor est minima, &
 centrum Ellipsis. Quod erat alterum. Centro ergo Solis
 &c., quod erat &c.

S C H O L I U M.

In exemplo proposito, declinatio Solis posita fuit
 ad polum conspicuum. Si detur ad non conspicuum, ea-
 dem erit constructio in Disco Terræ, ut & pro demon-
 stratione in Meridiano, excepto quòd Æquator erit VX
 Polus p infra B , axis Mundi TP , ac tandem IH datus
 Pa-

Parallelus, cujus centrum z . Tunc similiter omnia demonstrantur.

*Confer simul
Tab. I. Fig. 7.*

Coroll. I. Hinc patet data Solis declinatione [non refert ad quam plagam], abscissis in Disco ab F , & D utrinque arcubus datæ declinationis, ductisque chordis occultis ex , ug , inveniri puncta a , & b terminos diametri minimæ Ellipsis æquatoris, cujus diameter maxima FD item datur. Pro cæteris Parallelis abscissis FG , DK arcubus datæ latitudinis, & utrinque à g , & k arcubus gc , gh , Ki , Ke arcubus datæ declinationis, regula per c , & i dabit punctum d , & per b , & e punctum n terminos semidiametri minimæ, quæ secta bisariam in o per normalem Sy , factisque os , oy æqualibus singulatim radio dati Paralleli, nempe semichordæ datæ latitudinis, erit Sy diameter maxima. His habitis describi poterit Ellipsis quæsitæ. Descriptionis proximè expeditissimam docet nona hujus.

II. Ex facta demonstratione patet in disco Terræ quemcumque circulum sive maximum, sive non, si sit ad discum obliquus, esse Ellipsim.

III. Si in Disco abscindantur Bp , BP singuli æquales datæ declinationi Solis, patet chordam Pp in u , ubi secat AB , determinare Polum in facie quidem Disci, si declinet Sol ad Polum conspicuum; in dorso, si ad non conspicuum: nam similiter ostendetur chordam Pp transire per n .

IV. Quoniam diameter Paralleli secat Discum in t , etiam Paralleli cum Disco communis sectio transit per t ; & quia uterque ad meridianum rectus est, illa communis Sectio [19. 11. Eucl.] ad meridianum, & rectam AB recta erit: erit ergo $2t3$. Discus utpotè basis hemisphærii illuminati separat partem Terræ obscuram ab illuminata, consequenter partem paralleli dati in parte illuminata existentem, hoc est arcum ejus diurnum a parte in hemisphærio obscuro, nempe arcum nocturnum. Et in Æquatore quidem uterque semper est semicirculus, cum tam Æquator, quam Discus sint circuli maximi, se secantes

cantes per commune centrum T . In aliis Parallelis, cùm Sol est in Æquatore idem contingit; quia tunc Discus idem cum Coluro [Coroll. 6. post 2. huj.] Solstitiorum, ideoque per polos Mundi A , & B [fig. 5] transiens, omnes etiam Æquatoris Parallelos bifariam secat. Hinc sub Æquatore perpetuum est Æquinoctium. In Parallelis tunc tantum, cùm Sol est in Æquatore initio nempe Y , & Δ . At Sole hinc, aut inde extra Æquatorem versante, dies noctibus inæquales sunt. Nam CE bifariam secatur in m , & IH in z . Quare utraque in t secatur inæqualiter; & arcus cujus sagitta tC , nempe diurnus Paralleli CE major arcu nocturno, cujus sagitta tE minor quàm tC . Pariter arcus diurnus Paralleli IH , cujus sagitta pars diametri minor tH , minor est nocturno, cujus sagitta tI major, quàm tH . Sicut autem Parallelus, ita & ejus Ellipsis in Disco similiter dividitur in arcus diurnum, & nocturnum per rectam gK , & illa pars Ellipsis erit arcus diurnus, quæ est apparentia arcus diurni in Parallelo, eritque in facie Disci: reliqua pars Ellipsis, utpote apparentia arcus nocturni, tanquam in Disci facie aversâ cogitanda. Itaque si inveniatur punctum t , & per t agatur 2 t 3 normalis ad AB , hæc secabit Ellipsim, ut dictum est; & puncta 2 & 3 in perimetro Disci ad dictum Parallelum, simul horas ortus, & occasus secabunt. Porro punctum t facilè invenitur ductâ in Disco chordâ transversali ce [seu ib perinde est]. Dico hanc transire per t . Jungantur in Disco ct , & ctB , & in meridiano jungantur EB , CB . Per demonstrata SC , æqualis est Fc , ergo & complementa CB , cB æqualia sunt; ideoque [29. 3. Eucl.] chordæ CB , cB æquales, & angulus CBA , angulo cBA æqualis: est autem tB latus commune utrinque triangulo CtB , ctB : ergo [4. 1. Eucl.] Ct , ct , & anguli CtB , ctB æquales. Similiter ostenditur Et æqualis et , & EtB æqualis etB . Ergo anguli ctB , etB simul æquales sunt angulis CtB , EtB simul. Sed hi [13. 1. Eucl.] æquantur duobus rectis: Ergo & illi: ergo [14. 1. Eucl.] ct , et sunt una linea recta;

eta; hoc est chorda ce , quæ propterea transit per quæsitum punctum t .

V. Quoniam angulus CtB externus æqualis est interno, & opposito $\angle ETB$, & ctB ostensus est æqualis ipsi CtB , erit etiam æqualis angulo $\angle ETB$: ablatis ergo utrinque rectis angulis $2tB$, STB erit reliquus $ct2$ æqualis reliquo $\angle ETS$, nempe angulo datæ declinationis. Hinc dato quovis puncto 2 in Disci perimetro inveniri poterit ad quem Parallelum spectet. Nam ducta $2t$ ad TB normali, fiat angulus $2tc$ æqualis datæ declinationi Solis, cujus latus tc productum secatur perimetrum Disci in c , & e . Fiat Fb æqualis De , & Di æqualis Fc : secetur bifariam in g arcus cb , vel ie in K . Arcus Fg , vel æqualis Dk est latitudo paralleli quæsitæ. Ratio patet: nam ex ostensis, puncta c , & e distant à latitudine Paralleli, ad quem spectat punctum 2 , arcu datæ declinationis Solis prius citra, posterius ultra, & chorda ejus Paralleli transversalis ce facit cum $2t$ angulum item æqualem datæ declinationi Solis: ergo factæ arcu Fb æquali ipsi De , vel Di ipsi Fc , latitudo quæsitæ Paralleli est in medio arcuum cb , & ie . Sectis ergo bifariam illis arcibus patet satisfieri quæstioni.

VI. Inæqualitas dierum, & noctium extra Æquatorem in eadem Solis declinatione eo major est, quo major dati Paralleli latitudo: & in eodem Parallelo eo major, quo major Solis declinatio. Ostendo primum.

Est FD parallelus minoris latitudinis, quam CE . Axis TP , secet FD in a , CE in m , TB autem Meridiana secet FD in o , CE in t : Cum aF sit $\div FD$, & $MC \div CE$, si mt sit major pars radii me , quam ao radii aD , constat propositum. In triangulis Tao , Tmt , ad a ac m rectangulis, angulus ad T communis est: Sunt ergo [32. 1. Eucl.] æquiangula, & [4. 6. ejusdem], ut Ta ad Tm ; ita ao ad mt : Est autem Ta sinus arcus minoris $\angle EF$ minor quam Tm ; sinus arcus majoris $\angle EC$: ergo ao minor quam mt . Sed aD [15. 3. Eucl.] major quam mE : ergo ao pars minor radii

Tab. II. Fig. 8.

dii majoris aD , multò minor est quàm sit similis pars ejus, quæ est mt major radii minoris mc . Quod est primum.

Ostendo secundum. Esto Solis declinatio $Sæ$ major quàm $SÆ$, eritque $æq$ Æquator. Fiat $æc$ æqualis $ÆC$, & qe æqualis QE , item Bp æqualis $Sæ$: eritque ce idem Parallelus ac CE , sed in majori Solis declinatione, & Tp axis Æquatoris secans ce in b centro Paralleli normaliter, Tb , Tm æquales sunt, utpote sinus æqualium arcuum $æc$, $ÆC$: Si ergo centro T per b circulus ducatur, is per m transit. Et quia ce [16.3. Eucl.] tangit circulum illum in b , tota extra circulum cadit, quare pergit ultra m , & secat TB ultra t in n ; ac Tn major est quam Tt . In triangulis Tbn , Tmt ad b , & m re-ctangulis, quadratum Tn [47.1. Eucl.] æquale est quadratis Tb , bn simul, & quadratum Tt quadrantis Tm , mt simul. Est autem quadratum Tn majoris majus quadrato Tt minoris, ergo quadrata Tb , bn simul majora sunt quadratis Tm , mt simul; & ablati utrinque quadratis æqualibus Tb , Tm , est quadratum bn , ideoque ejus latus bn majus quadrato, & respectivè latere mt . Additis ergo utrinque æqualibus bc , mC , erit tota cn major totâ Ct , ideoque arcus diurnus Paralleli in declinatione majori $Sæ$ major diurno in declinatione minori $SÆ$: Quod erat alterum. Porro ex his sequitur etiam in Ellipsis Parallelorum in Disco Terræ plures inveniri horas in spectantium ad majorem latitudinem arcu diurno, quàm in spectantium ad minorem, stante eadem Solis declinatione: & in spectantium ad eandem latitudinem, arcu diurno plures in majori declinatione Solis, quàm in minori, modò declinatio sit ad conspicuum polum: Si verò ad non conspicuum, quia contrarium accidit, nempe arcus diurnus brevior est in majori, quàm in minori latitudine stante eadem declinatione, & in eodem Parallelo brevior est in majori declinatione, quàm in minori; ideo in primo casu arcus diurnus Ellipsis spectantis ad minorem latitudinem plures habebit horas, quàm

C

AT-

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 6.

arcus diurnus spectantis ad majorem; & in altero arcus diurnus majoris declinationis pauciores habebit horas, quàm spectantis ad minorem. Nam in *figura 6*, It ostensa est æqualis ipsi Ct , cui similis est Ct in *figura 8*. Cum ergo cn major sit, quàm Ct , & CE , ce æquales, erit Ne minor, quàm tE , hoc est tH in *figura 6*. Et ita de cæteris. In Æquatoris Ellipsi arcus diurnus perpetuò habet hor. 12.

Fig. 6.

VII. Patet item arcum diurnum cujusvis Paralleli æqualem esse nocturno ejusdem in æquali, sed ad partes oppositas, Solis declinatione; & nocturnum diurno. Nam [*fig. 6.*] in triangulis Tmt , Tzt rectangulis ad m , & z etiam anguli ad T æquales sunt propter æquales arcus Bp , Bp : latus Tt commune: ergo [*26. 1. Eucl.*] $t m$, $t z$ æquales sunt: ergo additis $m C$, $z I$ æqualibus, est arcus diurnus $t C$ in declinatione ad Polum conspicuum, æqualis nocturno $t I$ in declinatione æquali; & ex $m E$, $Z H$ ablatis æqualibus $t m$, $t Z$, restat arcus nocturnus $t E$ in declinatione ad polum conspicuum, æqualis $t H$ diurno in declinatione ad non conspicuum. Hinc in oppositis, sed æqualibus declinationibus eadem prodit Paralleli cujusvis Ellipsis, sed quæ pars in una declinatione est diurna, in opposita est nocturna, & vicissim.

VIII. Hactenus dicta de Paralleliis, qui in *figura*, ponuntur Boreales valent etiam de Australibus. Nam si B ponas plagam australem, & A Borealem omnia similiter prodibunt, & ostendentur, ut patet in Paralleliis ductis ad partes A in æquali latitudine, & inclinatione: ubi etiam apparet arcum diurnum Paralleli Borealis æquari nocturno Australis æqualis latitudinis, & contra in eadem Solis declinatione. Horæ si in Disco exhibendæ sint Ellipses binorum Parallelorum æqualis, sed oppositæ latitudinis, eadem fere operâ per praxes inferius tradendas, describi ambæ poterunt.

IX. Quoniam ce ostensa est æqualis CE , ut & ct ipsi Ct , patet ce , CE secari similiter in t , & tam ct , quàm Ct esse arcui diurno dati Paralleli in data declinatione

tione æqualem. Itaque in Disco Terræ ductâ dati Paralleli diametro gK , ductaque [Corol. 4.] transversali chordâ bi , quæ in TP dat punctum t , abscindatur in gk diametro Paralleli, segmentum gm æquale bt : & per m excitetur ei perpendicularis nm . Centro q , ubi TP, gk concurrunt, radio qg circulus Paralleli describatur $gnku$, vel ejus semicirculus gnk . Eritque gn arcus semidiurnus, & nk seminocturnus in declinatione ad polum conspicuum, vel contra i ad non conspicuum. Quibus arcubus mensura repertis in gradibus, & his redactis ad horas [23 1. nostræ Gnomonices] sciatur arcus diurnus totus in horis, & minutis, consequenter hora ortus, & occasus in dato Parallelo, ad quarum priorem spectat punctum 2, ubi recta per t ad TP normalis perimetrum Disci secat ad sinistram ad posteriorem punctum 3, ubi ad dexteram.

Fig. 7.

Ex eadem constructione etiam calcula Trigonometrico rem percommode expediemus. Nam in trigono Tmt ad m rectangulo,posito Tm sinu toto partium 10000, erit quesitum mt tangens declinationis Solis. Tm respectivè ad TP radium Disci est sinus datæ elevationis Poli, seu latitudinis $ÆC$, notus ex Tabulis sinuum: Ergo si fiat ut sinus totus Tm ad sinum datæ elevationis Poli, hoc est eandem Tm , ut partem radii TP , ita mt tangens declinationis ad eandem 4^m, scilicet æqualem, ut partem radii TP ; is exhibebit quesitum mt in partibus, qualium radius Disci TP est 10000, ut in apposito Exemplo. Idem Latus mt est sinus complementi quesiti arcus semidiurni, sed in partibus m Eradii Paralleli datæ la-

Fig. 6.

Declin. Gr. 15 45' 40" Tab. 1. p. 4481942.
Elev. Poli Gr. 40. Sin. 6428, 1. 3. 8080675
mt part. 1804, 1 ————— 3. 2562617

titudinis tanquam sinus totius. Porro mE in trigono TmE ad m rectangulo est sinus complementi datæ elevationis Poli,posito sinu toto radio Disci TE ; ideoque ex tabula sinuum nota est in iisdem partibus, in

quibus notum factum fuit latus $m t$. Itaque si fiat ut sinus complementi datæ elevationis Poli, nempe $m E$ ad eandem $m E$, ut sinum totum, ita $m t$ superius inventum ad 4^m , prodibit numerus partium $m t$ in partibus radii $m E$, qui inter sinus quæsitus in Tabula dabit gradus $t m$ complementi arcus semidiurni quæsitus, cuius summa, cum 90 erit arcus quæsitus in declinatione ad Polum.

$m t$ 1804, 1 l. —————	3. 2562617
Sin. tot. l. —————	10. 0000000
Summa —————	13. 2562617.
Elevat. Poli sin. Comp. subt. l. —	9. 8842540
$m t$ part. 2355 —————	3. 3720077
Qui est sinus $13^{\circ} 37' 19''$ Ergo arcus semid.	
$103^{\circ} 37' 19''$, vel $76^{\circ} 22' 41''$	

conspicuum; in opposita erit illius à 90 differentia, ut in appposito exemplo. Vides autem in utrâque analogiâ eandem summam prodire ex duobus Log., sed in posteriori analogia non demendum Log. sinus totius, sed tantum Log. sin. Comp. datæ elevationis Poli: Unica ergo analogia res expeditur; si nempe duobus Log. prioris analogiæ addas insuper Log. Sec. datæ elevationis Poli, dempto Radio. Tunc enim prodibit immediate, quod petitur in secunda, ut vides in exemplo adjecto. Quia autem recta per t normalis ad Meridianam determinat puncta 2, ac 3, in quibus datus Parallelus secat

Declin. Gr. $15^{\circ} 40' 40''$ G. P. ———	9. 4481942
Elev. Poli Gr. 40. sin. l. —————	3. 8080675
Log. Sec. dempto Rad. —————	. 1157460
Num. 2355, &c. —————	3. 3720077

perimetrum Disci, & est $T t$ sinus arcuum Disci $F 2 D 3$ inter Æquatorem, & ea puncta: sinus is nempe $T t$ calculo item facili invenitur. Nam in triangulo eodem $T m t$, posito $T m$ sinu datæ elevationis Poli pro sinu anguli $m t T$, complementi datæ declinationis, erit $T t$ sinus totus. Si ergo fiat ut sinus complementi declinationis ad sinum totum, ita sinus datæ elevationis Poli ad quartum, prodibit Log. Sinus arcus $F 2, T t, i. e.$
& in-

& inde ex Tabulis quantitas ipsius Tt nota fiet, ut in
 appposito ex-
 emplo. Sunt
 ergo arcus F
 2 , D 3 gr.
 41 53 ; iis er-
 go abscissis ab F , & D Polum versus, habentur eo ipso
 in Disco puncta quæsitæ pro termino utrinque arcus diurni
 Ellipsis datæ Paralleli.

Elev. Poli 40° sin. l.	9.8080675
Decl. Gr. 15 $40'$ $40''$ Sec. l.	0.0164654
Sin. l. gr. 41.53 . (Num. 6676, 3)	9.8245129

X. Item dato arcu semidiurno in datâ Solis declina-
 tione poterit inveniri latitudo, ad quam ille arcus
 spectat, & inde inveniri in perimetro Disci prædictæ
 puncta 2 ac 3, quæ & ad eum Parallelum, & horas
 ibi ortus, & occasus in datâ declinatione simul pertine-
 bunt. Abscindantur in quovis circulo arcus SI , SL
 dati arcus semidiurni [vel seminocturni, perinde est]:
 & jungatur IL , quàm recta per S , ac T circuli cen-
 trum secabit ad rectos angulos in M , ideoque [5. 3.
 Eucl.] bifariam. Nam si ducerentur TI , TL anguli STI ,
 STL insistentes arcubus [per constru.] æqualibus,
 [27. 3 Eucl.] æquales sunt; ideoque & reliqui ITH ,
 LTH , qui cum intercipientur radiis TI , TL æquali-
 bus, ac TH communi duobus triangulis TIH , TLH ,
 etiam anguli [4. 1. Eucl.] ad H deinceps æquales sunt,
 ideoque [13. pri. ejusd.] recti. Agatur per T diame-
 ter ATB , ad SN normalis. Fiat angulus IHC datæ
 declinationis Solis. Latus HC secet TA in C . Junga-
 tur CN . Dico Angulum HNC esse Paralleli quæsitæ
 latitudinem. Nam esto quæsitus Parallelus CE adhuc
 ignotus, in quo mt complementum datæ arcus semi-
 diurni. Junctæ TE , erit angulus ETQ , hoc est ei æqualis
 alternus TEm , latitudo quæsitæ, cui ostendendus æqua-
 lis angulus CNT in Figura 8. Triangula Tmt , CTH
 rectangula in m , & T habent etiam angulos mtT , THC
 æquales, nempe æquales complemento datæ declinatio-
 nis; cum angulus THI ostensus sit rectus. Sunt ergo
 invicem æquiangula: ergo [4. 6. Eucl.] ut Tm ad mt ,
 ita

Fig. 8.

Fig. 8.

ita CT ad TH ; sed ut mt ad mE , ita TH ad TN [cum tam mt , respectu radii mE , quàm TH respectu TN sit sinus complementi ejusdem arcus semidiurni] ergo ex æquo [22 5. Eucl.] ut Tm , ad mE , ita CT ad TN : sunt autem anguli ad m , T recti: ergo [6. 6. Eucl.] anguli TEm , CNT æquales. Quod erat ostendendum. Notâ Paralleli latitudine, poterit per præcedentia duci in Disco ejus diameter, & inveniri punctum t &c. Poderit etiam punctum t immediatè inveniri sic. In CN in latere sinistro [Fig. 8.] producta, si opus sit, abscindatur Cr æqualis radio Disci TE , ducaturque ra parallela ipsi NT , quæ fecet CH in M , erit CM longitudo quæsitæ Tt , ut patet, cum parallela ra faciat triangula $Cr a$, CNT similia, ut etiam CMa , CHT , & CMr , CHN , cui similis est TEt in Fig. 6: consequenter cum Cr , TE factæ sint æquales, etiam Tt , CM æquales erunt. Itaque si inventi Paralleli describenda sit Ellipsis, abscisso (Fig. 7.) Tt æquali invento CM ; agatur per t normalis ad TP recta $2t3$, itemque recta $bt i$ faciens cum $2t3$ in t angulum datæ declinationis. Per puncta b , & i , ubi ea perimetrum secat, ductæ rectæ be , ic ipsi $2t3$ Parallelae, juxta dicta, determinabunt diametrum minimam dn , qua secta bifariam in o , ductaque per o recta soy ad TP normali, frant os , oy æquales radio inventi Paralleli, eritque diameter maxima.

Sed hic etiam calculus trigonometricus expeditissimus est. Nam cum angulus datæ declinationis, quæcumque sit Paralleli latitudo, idem sit, & angulus axis TP cum quovis Parallelo rectus, patet in Fig. 8, trigona Tao , Tmt &c. esse similia, & in unoquoque notos esse ambos angulos obliquos, & simul latus unum sive ao , sive mt , pro dato arcu semidiurno: est enim ao , mt &c. sinus Comp. dati arcus semidiurni, qui proinde in Tabulis sinuum habetur; eritque in partibus, qualium radius quæsitæ Paralleli habet 10000. Porro in trigono Tmt , sumpto mt pro sinu toto, est mT tangens Comp. datæ decli-

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 8.

declinationis: eadem mT in triangulo mTE est tangens quæsitæ latitudinis, sumpto mE pro sinu toto partium 10000. Si ergo mT fiat nota in hujusmodi partibus, innotescet quæsitus angulus mET . Fiat ergo, ut mt tanquam sinus totus, ad mT tanquam tangentem, comp. declinationis, ita mt tanquam sinus complementi dati arcus semidiurni ad quartum, prodibitque quæsitum. Addi ergo debent Log. Tang. Comp. datæ declinationis, & Log. numeri sinus mt dati. È summa abjiciatur Log. numeri 10000, relinquetur Log. tangentis quæsitæ. Et quia Log. 10000 est 4.0000000, qui subtrahi debet; sumatur tangens Comp. datæ declinationis minuta 4. in duabus notis sinistimis, cui sic minuatæ addito Log. prædicto fiet sine alio tangens quæsitæ. Ut quia in Exemplo Tang. Comp. declin. $15^{\circ} 40' 40''$ est

10. 5518057	Dec. $15^{\circ} 40' 40''$ T. co. l min. 4. — 6. 5518058
ablatis 4, ut	L. Numeri mt (sin $13^{\circ} 37' 19''$ — 3.3720077)
dictum est, fiet	Lat. quæsi. gr. 40 T. L. — 2. 2248115
6. 5518057.	

Formam calculi ostendit adjectum Schema.

Invento Angulo E in triangulo TmE , invenitur Tt &c., ut in coroll. præced.

Duo hæc postrema Corollaria usui sunt pro Typo Eclipsis universali, de quo inferius. Licet autem aliam viam eadem obtinendi dem in 26.^a hujus: placuit tamen hanc ex ipsa geometrica constructione in Disco deducere per solam Trigonometriam rectilineam; quod ad hujus rei pleniorē intelligentiam plurimum confert.

XI. Ex omnibus prædictis tandem patet, Discum Terræ esse veluti quemdam horizontem universalem, & mobilem: inde enim omnia determinantur pro toto Orbe [etiam altitudo Solis pro dato quovis momento, supra proprium cujusque loci horizontem, ut ostendam post 9^{am} hujus], quæ ex horizontibus particularibus, ac fixis. Differentia unicè in eo est, quod respectivè ad horizontes particulares Sol oritur, & occidit, cum centrum habet in illis: at respectivè ad Discum Terræ, in

Fig. 6.

in quo centrum Solis nunquam est, oritur Sol in aliqua regione, cum Semiperipheriæ Occidentalis $BF A$ punctum quodpiam attingit eum locum [provehitur enim Discus cum Sole, perpetuò ab ortu in occasum] tunc enim locus incipit esse in hemisphærio illuminato, seu radius e centro Solis tunc primò eum attingit. Occidit verò Sol, cum semiperipheriæ orientalis $BD A$ punctum locus occupat; tunc enim ultimò est in parte illustratâ, nec ullus deinceps radius Solis centralis eum petit. Porro punctum B , Sole declinante ad Austrum, est contactus ad extra Disci cum Parallelo Æquatoris Boreali, qui à Polo boreo distat quantitate datæ declinationis, nempe qui ex p per B duceretur; in quo Parallelo Sol tunc præcisè oritur, & occidit; hoc est centrum Solis ut horizontem ascendendo attingit, statim iterum incipit mergi. Ultra eum Parallelum verò polum p versus, est nox perpetua. Tunc autem punctum extremè oppositum A , & contactus ad intra cum æquali Parallelo circa Polum Australem, in quo eo die Sol non occidit, sed ubi ejus centrum horizontem attigerit descendendo, iterum incipit attolli. Ultra verò eum Parallelum, polum australem versus, est dies perpetuus. Sole autem declinante in Boream in Parallelis Borealibus fit, quod in priore casu dictum est de Australibus, & contra. Cum ergo P , vel p sit polus, & $P B$, $p B$ arcus datæ declinationis, patet limites Borealem, & Australem Disci distare semper à polis arcu datæ declinationis, ultra polum quidem ad quem est declinatio, at citra oppositum. Et quia diebus æquinoctialibus declinatio nulla est, tunc ii limites sunt in ipsis polis, nempe (Coroll. 6. 2^a hujus) Poli sunt in punctis A & B . Reliqua, quæ ex dictis inferri possunt, quæ è re nostra fuerint, inferius suis locis exponuntur.



PRO-

PROPOSITIO VII. PROBL. III.

*Dato vero loco Solis in Ecliptica declinationem
Solis ab æquatore determinare.*

Radio quovis (quo majore, eo aptiore) CA ducatur arcus, in quo abscindatur AB graduum $23^{\circ} 30'$ maximæ declinationis Eclipticæ. Junctis CA , CB , agatur per B normalis ad CA recta BD , quæ erit sinus arcus BA . Centro D , radio DB describatur quadrans BLE , in quo abscindatur EL æqualis distantia dati loci Solis à proximo æquinoctio, in assumpto exemplo Gr. $42^{\circ} 40'$. Per L agatur LG parallela EA , quæ secet arcum AB in G . Dico arcum AG esse quæsitam declinationem. Producatur, si sit opus, GL donec secet CB ; secet in F ; ac ducatur LK ad ED normalis.

Tab.II. Fig.9.

Demonstratio. Concipiatur sector ACB pars plani Coluri Solstitiorum, in quo CA Æquatoris cum illo communis sectio; erit CB Coluri, & Eclipticæ communis sectio, quæ ab æquatore in eo coluro distat gr. $23^{\circ} 30'$, hoc est arcu AB . Cum ergo CB sit Eclipticæ radius subtendit quadrantes illius duos unum hinc, unum inde, & normales ad colurum Solstitiorum per Eclipticæ polos incedentem. Eidem coluro normalis est etiam Æquator, utpote & per hujus polos transeunti; consequenter etiam Æquatoris Paralleli, quorum proinde cum eo coluro communes sectiones (15.1. Theod.) sunt Parallelorum diametri, & ad radium æquatoris CA (16.11. Eucl.) parallela. Est ergo GL communis sectio cum coluro dicto, Paralleli Æquatoris transeuntis per G , cujus proinde declinationem patet esse arcum AG . Ostendendum superest eum esse Parallelum, quem Sol in dato loco in Ecliptica percurrit.

Quoniam GL secat CB in F , & tam Ecliptica, quam Parallelus per G incedens recti sunt ad ejus coluri planum, etiam illorum communis sectio (19.11. Eucl.) insistit perpendicularis plano coluri in F ; ideoque (3. de-
D fin.

fin. ibid.) recta etiam est rectis GF, CB ; & hinc est sinus arcus Eclipticæ, cujus sinus versus est FB , nempe arcus Eclipticæ inter punctum Solstitiale B , & punctum, in quo secatur circulo Paralleli per G : ergo reliquum radii est sinus distantie ejusdem concursus à proximo æquinoctio. Jam in trigono CBD , propter Parallelas CD, FG , seu FH , est (2. 6. Eucl.) ut CF ad CB sinum totum, ita DH , hoc est ei æqualis LK (sunt enim LK, DH Parallelae, utpote ambæ rectæ ad CA) ad DB item sinum totum quadrantis DBE . Sed LK est sinus datæ distantie Solis ab æquinoctio, nempe (per construct.) arcus EL ; ergo pariter CF est sinus similis arcus Eclipticæ inter proximum Æquinoctium, & punctum F . Parallelus ergo transiens per F , & G est qui datur, & consequenter AG quæsitæ declinatio. Quod erat &c.

Coroll. Si ducatur GI ad CA normalis, est ea sinus arcus AG inventæ declinationis, qui propter parallelas GH, ID æqualis est ipsi DH , hoc est KL sinui datæ distantie à proximo æquinoctio respectivè ad DB tanquam radium. Est autem eadem DB sinus arcus AB maximæ declinationis Eclipticæ. Cum ergo sit, ut CF ad CB , ut DH , seu æqualis KL ad DB , & convertendo, ut CB ad CF , ita DB ad KL , seu æqualem GI ; patet ita esse sinum totum ad sinum distantie Solis à proximo æquinoctio, ut sinus maximæ obliquitatis Eclipticæ ad sinum quæsitæ declinationis. Hinc additur Log. datæ distantie à proximo æquinoctio, & maximæ obliquitatis Eclipticæ, deleta-

que è summa 1 sinistima, relinquitur Log. sinus quæsitæ declinationis, ut in adnexo ex-

Dist. à prox. æq. $41^{\circ} 39' 46''$ sin. l. 9. 8310259.	
Gr. 23 30' ————— sin. l. 9. 6006997.	
Declin. quæsitæ $15^{\circ} 40' 40''$ sin. — l. 19. 4317256.	

emplo: & ex praxi geometricâ etiam trigonometrica deducta & ostensa est.

Facile ergo tabula paratur declinationis singulorum graduum, semigraduum &c. Eclipticæ, addendo singulis

lis distantis à proximo æquinoctio Log. Gr. 23 30'. Hujusmodi tabula ad dena minuta habetur in libro primo Horographiæ, & ejus usus in Prop. 16. ejusdem.

S C H O L I U M.

Si proposita figura fiat in materia solida, & quadrans *BE*, sectus exactè sit in 90 gradus, habetur instrumentum universale ad hunc finem. Pro re nostra si radius *CA* fiat æqualis radio constanter assumendo pro Disco Terræ, inventus arcus declinationis usui erit pro determinandis diametris minimis Ellipsis, etiam si ignorentur gradus, & minuta invento arcu contenta: arcum enim quærimus convenientem, quantumcumque ille sit. Poterit tamen etiam in gradibus, & minutis facilè notus fieri, præsertim per instrumentum in 10^a hujus parandum. Hinc non opus est in arcu *AB* gradus dividere. Si tamen dividatur utile & commodum erit pro plurimis summam præcisionem non petentibus, in Gnomonica præsertim.

PROPOSITIO VIII. PROBLEMA IV.

Æquatoris, aut ejus Paralleli cujuslibet apparentias in Disco Terræ, in boras, semiboras, quadrantes &c. dividere.

IN Disco Terræ *B F A D*, esto *AB* Meridiana & axis *Tab.I. Fig.7.*
FD Æquatoris diameter normalis ad *BA*,
g k diameter dati Paralleli; & ponatur 1^o Sol in Æquatore. Secetur perimetro Disci in 24 partes æquales pro 24 horis, initio factò ab alterutra diametrorum, pro semihoris in 48 &c. Pariter circa dati Paralleli diameter, cujus centrum *g*, descriptus circulus *g n k u* similiter secetur. Jungantur rectis occultis puncta horarum in perimetro Disci opposita ad easdem partes ab *AB*, &
 D 2 ab

ab hac æquè remota; ac notentur puncta, in quibus hæ rectæ secant Æquatoris diametrum FD . Similiter fiat circa horas, & diametrum dati Paralleli. Dico apparentias Æquatoris & Paralleli sectas esse, ut petitur.

Demonstratio. $FD g k$ (5. huj.) sunt apparentiæ Æquatoris, & Paralleli in Disco. Pariter tam chordæ per horas in perimetro Disci, quàm per horas in Paralleli circulo, sunt ad invicem, & meridianam AB parallelæ, utpote intercipientes utrinque arcus æquales. Concipiatur Æquatoris circulus (is æqualis est circulo Disci, utpote circa æqualem diametrum) ut & circulus Paralleli in situ suo naturali, nempe, in casu posito, normali ad planum Disci; etiam prædictæ chordæ omnes ad planum Disci rectæ erunt. Coincident ergo cum radiis Solis centralibus per eadem puncta horaria transeuntibus; quare hi secant datas diametros $FD, g k$ in iisdem punctis, in quibus ductæ chordæ: ergo chordæ, ut radii determinant puncta horarum &c. Quod erat primum.

II. Sit Sol extra Æquatorem, consequenter (6. huj.) Æquatoris apparentia sit Ellipsis $a F b D$, & Paralleli Ellipsis $d g n k$. Dico chordas, ut in priore casu ductas, dividere perimetrum Ellipsium, nempe Æquatoris, & Paralleli apparentias, ut jubetur.

Demonstratio. Concipiantur Æquator, & Parallelus inclinati ad planum Disci (6. huj.) juxta datam Solis declinationem, & per puncta horarum, opposita puta 13, & 23 æque ab AB distantium intelligantur radii Solis centrales, qui erunt in superficie cylindri radiorum, cum quo Disci communes sectiones sunt datorum Parallelorum apparentiæ: patet ergo illos radios in Ellipsium perimetros cadere, ibique determinare puncta earum horarum. Per eos duos Radios intelligatur planum, quod (18. 11. Euclid.) ad planum Disci rectum erit, & cum à Meridiano distet utrinque arcu $A 23, B 13$, hoc est ejus sinu gr. 15., est eidem Parallelum; consequenter ejus plani cum Disco Terræ communis sectio Meridianæ AB (16. 11. Euclid.) parallela erit, & ab AB distabit

bit in utroque extremo, sinu gr. 15. Hujusmodi autem, [per constr.] est chorda 13,23: ergo hæc refert eam communem sectionem, consequenter determinat in perimetro Ellipsis puncta earum horarum. Eodem discursu concluditur de aliis horis binis, & binis tam in Æquatore, quàm in Parallelo. Neque obstat, quod diameter maxima Ellipseos Paralleli, nempe Sy , non sit eadem linea cum chorda gk per dati Paralleli latitudinem: nam cum [6. huj.] sint Parallela, & æquales, res in idem recidit: plana enim Parallela rectas lineas in se incidentes [17. 11. Euclid.] similiter secant. Quare perinde est sive circulus Paralleli centro q per g , & b , sive centro o per s , & y describatur. Constat ergo totum Problema. Quod erat &c.

S C H O L I U M.

Cujusvis Ellipsis solus arcus diurnus usui est pro Eclipsibus Terræ, & Solis; solus nocturnus pro Lunæ. Quomodo hi arcus definiantur dictum est in Corollariis sextæ hujus, tum Geometricè, tum Trigonometricè. In Æquatoris Ellipsi ea senissis est arcus diurnus, quæa punctis F, D vergit ad polum oppositum ei, ad quem Sol declinat. In Ellipsis Parallelorum pars major est arcus diurnus, Sole declinante ad Polum conspicuum, pars minor in casu opposito. Ordo horarum in declinatione Solis boreali erit ea, quam figura exhibet circa circulos, itemque in arcu Ellipsium inferiori. In australi invertende series, ut factum vides in Ellipsium arcu superiori: nempe in utroque casu AB est meridiana, & horæ ante Meridiem a limbo Disci occidentali, qui [Coroll. 11. sextæ huj.] est quasi horizon ortivus, ad Meridianam, & ab hac ad limbum Orientalem pomeridianæ progredi debent. Ponimus autem meridiem hor. 24, & inde in post. 1. 2. 3. &c. more Astronomorum serie continuatâ.

PRO-

PROPOSITIO IX. PROBL. V.

*Datis Diametris Ellipsis maxima, & minima,
Ellipsim in horas &c. sectam unâ eademque
operâ exhibere.*

Tab. II. Fig. 10.

Ellipsis multipliciter describi potest; quia tamen in Disco Terræ opus est Ellipses in horas &c. dividere, quod hic praxim unicam, quæ in re nostrâ est omnium expeditissima, quippe Ellipsim, & in ea puncta horaria &c. simul exhibet.

Esto AB petita Ellipsis diameter maxima, & minima, se mutuo bifariam, & normaliter secantes in C . Centro C , radio CA , circulus describatur $AEBD$, & alter concentricus $aebd$ radio Cd . Productâ utrinque $e d$ ad E , & D sectus erit quadrifariam uterque circulus. Majoris quadrantes singuli secantur in 6, vel 12 &c. partes æquales. Ductis ex C radiis occultis ad singula puncta horaria circuli majoris, minor etiam similiter sectus prodibit. Per omnia puncta bina, & bina circuli majoris hinc inde ab A , aut B æquè distantia jungantur chordæ occultæ. In his [per præced.] sunt puncta horaria Ellipsis, quæ sic determinantur. Per omnia puncta horaria circuli minoris bina, & bina hinc, & inde æquè remota a punctis d , & e agantur similes chordæ extra circulum minorem, donec concurrant singulæ cum chordis cognominibus circuli majoris, nempe, quæ in ejus peripheria cœunt cum eodem radio, cum quo chordæ minoris in hujus perimetro. Per omnes, & singulos chordarum cum chordis concursus ducatur decenter curva, quæ circulum majorem tangat interius in A , & B , minorem exterius in d , & e . Dico hanc esse petitam Ellipsim, & in chordarum concursibus, per quos ducta est, sectam esse in horas, semihoras &c. Fiant of , & tg perpendiculares ad CB . Chordæ per hor. 11, 10 &c. circuli majoris secant CB in p , b &c.

De-

Demonstratio. Ex doctrina Sinuum patet *of* esse sinum complementi arcus *do*, & *tg* arcus *dt*. Item *11p* est sinus complementi arcus *Dy*, & *10b* arcus *D10*. Sunt autem arcus *D11*, *do* similes, ut etiam *D10*, *dt*: ergo & eorum sinus comp. sunt similes: i.e. ut *11p* ad *10b*, ita *of* ad *tg*. Est autem (13. 6. Euclid.) *11p* media proportionalis inter *Ap*, *pB*, & *10b* inter *Ab*, *bB*: ergo ut quadratum *11p* ad rectangulum *ApB*, ita quadratum *10b* ad rectangulum *AbB*, nempe utrobique quadratum (17. 6. Eucl.) respondententi rectangulo æquale; & quia *of* ad *tg*, ut *11p* ad *10b*, erit etiam quadratum *of* ad rectangulum *ApB*, ut quadratum *tg* ad rectangulum *AbB*; non tamen erunt quadrata æqualia respondententi rectangulo, cum *of* sit minor quam *11p*, & *tg* minor quam *10b*. Per constructionem Parallelae sunt *of*, *mp*, ut etiam *tg*, *nb*; item *om*, *fp*, ut etiam *tn*, *gb*: ergo (34. 1. Euclid.) *of*, *mp* æquales, ut etiam *tg*, *nb*; quare quadratum *mp* æquale quadrato *of*, & quadratum *nb* quadrato *tg*: quare etiam quadratum *mp* (7. 5. Euclid.) ad rectangulum *ApB*, ut quadratum *nb* ad rectangulum *AbB*. Cum ergo rectangulis *ApB*, *AbB* ostensa sint proportionalia tam quadrata rectarum *11p*, *10b*, quæ sunt ordinatim applicatæ ad *AB* diametrum circuli; quam rectarum *mp*, *nb*, quæ sunt ordinatim applicatæ ad maximam petita Ellipsis diametrum *AB*; priora tamen suis correlativis rectangulis æqualia sint, non verò posteriora, patet (definit. Ellipsis 2.^a Conic. Des Charles) puncta *m*, & *n* esse in Ellipsi. Eodem ratiocinio concluditur de quibusvis aliis per datam methodum inventis punctis. Curva ergo ducta per puncta inventa Ellipsis est, & ea, quæ petitur, utpote circa datas diametros. Et quia chordæ per horas circuli circa diametrum maximam secant Ellipsim in punctis inventis; eademque (per præced.) determinant puncta horarum &c. patet in iisdem punctis Ellipsim dividi, ut petitur. Unâ ergo eademque operâ Ellipsim in horas &c. Quod erat faciendum, & demonstrandum.

Co-

Coroll. 1. Quia puncta horaria *Æquatoris*, & *Parallelorum* sunt horum cum circulis horariis concursus; puncta verò horarum in *Ellipsis* sunt punctorum horariorum in circulis *Æquatoris*, & *Parallelorum* apparentiæ; patet puncta horaria in *Ellipsis* esse apparentias dictorum concursuum; consequenter apparentias circulorum horariorum in *Disco* transire per inventa puncta horaria in *Ellipsis*; aut etiam in *Diametris* *Æquatoris*, aut *Parallelorum*, cum hæ sunt apparentiæ in *Disco* suorum circulorum juxta 5. hujus *Circuli* horarii (uno dempto meridiano, & etiam, cum *Sol* est in *Æquatore*, circulo hor. 6, qui tunc (*Coroll. 6. secundæ* hujus) congruit cum plano *Disci*), utpote ad *Discum* inclinatis, projiciuntur (*Coroll. 2. sextæ* hujus) in *Ellipses*. Si itaque delineentur in *Disco* apparentiæ *Parallelorum* ad quinos, aut saltem denos gradus latitudinis, & per singulorum puncta horaria cognomina agantur decenter curvæ, hæ erunt circuli horarii. Sole posito in *Æquatore* coibunt omnes in punctis *Disci* *A* & *B*, ubi tunc sunt *Poli Mundi*; & prodibit *Analemma* commune (de quo *Des Chales lib. 2. de Astrolabiis*) cum hoc unico discrimine, quod quia *Analemma* illud describitur in plano *Meridiani*, oculo statuto in ejus axe ad infinitam distantiam, nostrum verò in *Disco Terræ*, qui in eo casu congruit cum circulo horæ sextæ, oculo statuto ad similem distantiam; in *analemmate* communi *Meridianus* circulus est, hora sexta linea recta, eademque axis *Mundi*, in nostro contrà hora sexta erit circulus, *Meridianus* linea recta, eademque axis *Mundi*. Hinc si *Eclipsis* accidat *Soli* versanti in *Æquatore*, *Analemma* commune, servato prædicto discrimine, erit pro *Disco*; sed casus erit rarissimus. Sole verò declinante, circuli horarii in *Disco Terræ* concurrunt quidem in eo *Polo*, ad quem *Sol* declinat, ac proinde in *Disci* facie extat; at ultra polum, ut & ad alteram plagam carentem polo terminantur in variis peripheriæ *Disci* punctis, nempe spectantibus ad latitudines, in quibus singulæ sunt horæ ortûs,

Fig. 7.

tus, aut occasus; quæ puncta non solum pro horarum, sed & pro declinationis varietate diversa sunt. Determinantur hæc puncta per Coroll. 10. VI. hujus; ut etiam clarius suo loco exponetur, ubi hujusmodi punctorum occurreret necessitas.

II. Quia in quovis loco terrestri ea numeratur hora, in cujus circuli plano est radius Solis centralis ad datum locum pertingens; fiet, ut si in loco quopiam dati Paralleli numeretur hor. ex. gr. 4, cum radius prædictus incidat hora quarta in Ellipsis pro dato Parallelo descriptæ punctum 4, locum illum è Sole apparere in puncto 4. At quia Sol motu diurno continenter pergit ab ortu in occasum circa axem Mundi motu, ad sensum, saltem intra paucas horas, ad Æquatorem Parallelo, cum una horâ post in eodem loco numeretur hor. 5, datus locus apparebit in puncto 5. ejusdem Ellipsis: & perinde erit, siue dicas Solem una cum circulis horariis progressum ab ortu in occasum grad. 15, & punctum 5 pervenisse ad locum, ubi prius erat punctum 4, siue imaginis, Sole & circulis horariis immotis, Terram interea circa suum axem (Mundi nempe) rotatam tantumdem ab occasu in ortum, & locum, qui ante suberat puncto 4, pervenisse ad 5. Hac secunda expressione, quia breviori, & quia ita re ipsa videretur aspicienti Terram è Sole, utar deinceps. Hinc verò clarius adhuc patet, quomodo *AB* sit meridiana universalis; imò tales sint horæ omnes, quia nempe successivè eadem easdem horas exhibent pro aliis, & aliis locis, prout per dictam imaginariam, seu opticam Telluris rotationem, loca alia, atque alia sub ipsis spectantur.

III. Hinc sequitur apparentias Parallelorum in Disco esse vias, quas viderentur percurrere loca in iis Parallelis existentia. At quia semper Sol imminet verticaliter centro Disci *T*, si ex *T* ad quodvis Paralleli in Disco punctum agatur recta, hæc erit sinus distantiae Solis a vertice ejus loci cujuslibet, qui in eo puncto hic, & nunc est. Ponatur punctum 3. Agatur *T* 3, quæ produ-

Fig. eadem.

E

cta

 ta fecet perimetrum Disci in *H*. Fiat *HI* quadrans, & jungatur *TI*, item 3 *L* normalis ad *T* 3, secans quadrantem *HI* in *L*. Jungatur *TL*, & ex *L* ad *TI* normalis *LM*, qu  erit sinus arcus *LI*, seu anguli *LT*. ipsi *LM*  qualis est *T* 3. Nam *MT*, *L* 3 amb  normales ad *T* 3 Parallel  sunt, ut etiam *T* 3, *LM* amb  ad *TI* rect : est ergo *T* 3 sinus arcus *LI*, seu anguli *LT*. Cogitetur quadrans *ITH* super latere *TH* ad Discum, rectus: quia *IT* insidet normaliter Disco in centro *T*, est radius per centra Solis, ac Terr ; & illi Parallelus *L* 3 est radius, per quem locus terrestris   Sole refertur in punctum 3 Paralleli. Locus ergo ille est in *L* superficiei terrestris, consequenter *TL* est linea, qu  produ ta versus *Z* in verticem, seu Zenith loci cadit; arcus autem *ILH* per Solem, & Zenith loci transiens, est verticalis Solis in dato loco. In hoc verticali metimur distantiam Solis   vertice loci, qu  proinde erit *IL*, seu angulus *LT*; nam locus datus habet Zenith in *LZ*, Solem in *LS*; ergo angulus *SLZ*, hoc est ei  qualis internus, & oppositus (29. 1. Euclidis) *LT*, est distantia Solis   vertice loci, cujus ostensus est sinus  qualis rect  *T* 3: h c ergo est sinus distantie Solis   vertice loci: quod est propositum. Quia autem altitudo Solis supra loci horizontem est complementum distantie   vertice, ea erit arcus *LH*, ideoque determinari potest in Disco pro loco quovis, cujus detur in Disco apparentia altitudo Solis pro dato tempore, supra horizontem. Cum autem idem arcus *LH* sit altitudo loci supra Discum, seu basim Hemisph rii illuminati, patet tantundem elevari Solem supra loci cujusvis horizontem, quantum eodem tempore elevatur locus supra basim Hemisph rii illuminati in circulo per Zenith loci, & Solem transeunt : Patet item *T* 3, esse verticalem Solis pro dato loco, ac tempore in Disco Terr .

IV. Ex demonstratione propositionis, patet Ellipses, earumque puncta horaria determinari singula, si ex chordis circuli circa Diametrum maximam, distantibus

bus utrinque à Meridiana sinu arcûs distantia binarum, & binarum horarum à Meridie, sinu, inquam, respectivè ad Semidiametrum maximam, nempe radium circuli circa eam, abscindantur supra, & infra ab eadem diametro maxima sinus complementi similium arcuum, respectivè ad radium circuli minoris, seu Semidiametrum minimam: ostendimus enim $p m$ æqualem of , & $b n$ æqualem tg &c. Ellipsium diameter maxima constans est, utpote (5, & 6. huj.) semper æqualis diametro Parallelorum: minima diameter varia, vel nulla, prout varia, vel nulla fuerit Solis declinatio. Poterit ergo parari instrumentum universale pro solutione expeditissima propositi problematis, & aliis plurimis; & in subiecta materia omnia fere fieri poterant, quibus egemus. Instrumento hoc absolutè carere possumus, si pro uno, aut altero tantùm loco Eclipsium phænomena investiganda sint: at pro typo universali ejus defectus nonnihil labore improbo, aut aliis instrumentis pretii non levis suppleretur. Instrumenti ergo constructionem, usumque hic à me proponi, neminem puto tædebit.

PROPOSITIO X. PROBL. VI.

Instrumentum transportatorium parare.

Videatur Fig. 11. & 12.

Paretur tabella buxea, seu orichalcica &c. rectangula, utrinque probè plana, & lævigata, cujus longitudo saltem paulo ultra palmarem, latitudo non minor subduplâ longitudinis. In ea prope unum latus in longum ducatur recta AB æqualis radio electo pro Disco Terræ: is si palmum adæquet, satis commodus est. Secta AB bifariam in C , ductaque normali $C\theta$, centro C , radio CA , super AB semicirculus describatur, quem radius $C\theta$ in duos quadrantes dispartiet. Hi singuli dividantur exactè in 90 Gr., quorum ordo, ut in Schemate. Ductis utrinque radiis $C\theta$, jungantur item utrinque

Tab. III. Fig. 11.

que chordæ 60, 0; factusque erit Rhombus ex duobus trigonis æquilateris (ut patet ex definitione Circuli, & 15. 4. Euclid.) quorum latus commune Co. Applicata Regula ad gradus quinos (aut si placeat etiam singulos) utrinque ab o cognomines notentur intersectiones Regulæ cum radio Co, quæ circino transferantur in utraque singillatim latera C60; & utriusque lateris puncta jungantur lineis rectis cum cognominibus punctis notatis in Co. Hæ rectæ erunt radii Parallelorum, quorum latitudo æqualis gradibus, per quos notatum fuit singulorum punctum in Co, sectique erunt singuli bifariam in radio Co; sicut chordæ 60, 0, 60 exhibent radium Æquatoris similiter sectum: deinde ascendendo radius latitudinis Gr. 10 20 &c. juxta numeros singulis in figura adscriptos. Latus C60 ad sinistram tribuatur horis 24 meridiei, ac 12 mediæ noctis: ad dexteram horis 6, & 18 à Meridie. Et quia Sinus Gr. 30 æqualis semiradio, radius Co spectabit ad horas, 2, 10, 14, 22, quæ duabus horis, seu 30 grad. distant à Meridie, vel Media nocte. Accipiat jam in Semicirculo chorda Gr. 30, cui in basi sinistra Rhombi abscindatur à 60 æqualis 0, 1. Sumpta deinde chorda integri quadrantis, abscindatur in semicirculi diametro æquale Segmentum A3. Excessui C3 supra radium AC abscindatur in basi Rhombi ad dexteram æquale Segmentum à radio Co usque ad punctum 3. Idem fiat de chordis graduum 120, ac 150, quibus abscissis æqualibus A4, A5, transferantur Segmenta C4, C5 à radio Co in basim Rhombi dexteram, ut habeantur ibi puncta 4, & 5. His peractis, sectus erit radius Æquatoris in sinus omnium horarum integrarum. Sicut autem per chordas tricenûm graduum determinantur sinus horarum integrarum, ita eodem artificio per chordas quindenûm graduum determinentur sinus semihorarum, per chordas gr. $7\frac{1}{2}$ sinus quadrantum per chordas grad. $2\frac{1}{2}$ sinus quinûm minutorum, ac tandem per chordas graduum, $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, &c. sinus singulorum minutorum. Sed satis sunt sinus quinûm minutorum; nam cæteri æstimatione fa-

facile accipi possunt, cum opus fuerit, sine errore sensibili. Tandem ex centro C rectæ ducantur ad inventa puncta singula horarum, semihorarum, & quadrantum, quæ cæterorum Parallelorum radios omnes in similes sinus dividunt, & absoluta erit instrumenti facies.

II. In dorso ejusdem Tabellæ agatur prope latus unum in longum recta DE æqualis semicirculi diametro AB , & similiter secetur bifariam in F , ductis FH , EL ad DE normalibus, & æqualibus ipsis DF , FE , compleatur rectangulum DL constans duobus quadratis DH , FL , quorum latera æqualia radio Semicirculi. Quadrati DH latera singula secentur in 10 partes æquales, ut etiam latus EL . Puncta laterum DG , EL æquè remota à D , & E jungantur rectis, quæ erunt invicem parallelæ, & perducantur nonnihil ultra latus EL , ut FE ultra E . Item in quadrato DH à puncto D ducatur recta ad primum punctum post G in latere GH ; a primo post D ad secundum post G , & ita porro donec perveniatur ad punctum H . Hæ obliquæ pariter invicem Parallelæ erunt & æquales. Numeri describantur circa quadrati DH latera, ut figura ostendit. Singulæ decimæ partes in lateribus DG , FH secentur in 5 partes æquales, & puncta utriusque æquè remota à D , & F jungantur rectis, quarum tamen non appareant nisi puncta in dictis lateribus, & in singulis obliquis ad vitandam confusionem. Præterea lateris EL , ut & FH , vel alterius ei paralleli prope ipsum occultè ducti singulæ partes decimæ subsecutur trifariam, junganturque in quadrato FL puncta æquè remota ab F , & E rectis punctatis. Item è semicirculo in alterâ facie Tabellæ accipiat chorda arcus Gr. 30, cujus ab F abscindatur dupla $F30$ in latere FE nonnihil producto, & jungatur $L30$, in qua terminentur omnes parallelæ quadrati FL . Jam sumantur chordæ grad. 2, 4, 6 &c. numerorum parium usque ad 28 inclusivè, quibus singulis à puncto F versus E abscindantur duplæ in latere FE . Similiter in latere HL à puncto H versus L abscindantur duplæ chordarum grad. 1, 3, 5 &c.

nu-

Tab. IV. Fig. 12.

numerorum imparium usque ad 29 inclusivè, Punctis adscribantur numeri suorum graduum. Jungantur diligenter oblique ab F ad 1, à 2 ad 3, & ita porro usque ad rectam L 30. Parallelis lineis per decimas lateris FH transeuntibus adscribantur numeri primæ infra F , 6, sequenti 12, inde 18', 24', 30', 36': 42', 48', 54'. Similiter fiat iisdem parallelis ad latus L 30, sed ordine inverso, nempe primæ supra L 6, inde 12', 18' &c. absolutumque erit instrumentum ad plurima utile & percommodum, & in re nostra aptissimum.

Demonstratio. Hic ad nostrum finem tribus opus est. Primò sinibus omnium horarum in radiis Parallelorum: per eos enim transeunt chordæ, quibus & Ellipses, & horæ in his determinantur. Secundò imperatos arcus Disci Terræ abscindere, aut datos metiri, seu, quod in idem recidit, imperatos angulos constituere, aut datorum quantitatem notam facere. Tertiò imperatas partes radii Disci Terræ ab eo, vel aliis lineis abscindere, aut datas in partibus radii Disci Terræ notas facere. His enim tribus absolvuntur omnia, quæ in re hac geometricè præstanda peti possunt. Porro tria hæc facilè, & expeditè suppeditat constructum instrumentum.

Ostendo primum. Rhombi latera (14 4^a Euclid.) æqualia sunt radio semicirculi: ergo duo simul 600, 0. 60 æquantur diametro semicirculi, cui ponimus æqualem radium Disci describendi; ideoque, & Æquatoris. In hoc Æquatoris radio duplo radii semicirculi abscindimus chordas duplùm graduum cujusque horæ &c., quæ respectivè ad radium Disci erunt sinus semissis graduum, nempe horis, semihoris &c. convenientium. Nam, quia radius Æquatoris duplus est radii semicirculi, & sinus sunt, ut radii, sinûs gr. 15. in radio Disci, seu Æquatoris duplus est sinus similis in radio semicirculi. Sed in hoc chorda Gr. 30 dupla est sinus Gr. 15 (defin. sinûs). Ergo chorda arcus semicirculi gr. 30 æqualis est sinui Gr. 15 in radio Disci; & ita de cæteris. Porro in basi Rhombi à radio C ad dexteram tantum excessus supra AC notan-

tantur; nam in latere 60 , 0 ad dexteram habetur jam-
 recta æqualis ipsi AC , quæ simul cum illo excessu inte-
 grant convenientes sinus, ut patet. Habemus ergo in
 Æquatore sinus petitos. Præterea radii Parallelorum,
 Æquatoris (ex doctrina sinuum) sunt sinus complementi
 latitudinis Parallelorum. In hujusmodi sinus secum
 radium Co ; nam regula applicita ad gr. ex gr. 10 utrin-
 que ab 0 exhibet rectum ad Co perpendicularem, & a Co
 in puncto 10 bifariam sectam, cujus propterea semissis est
 sinus Gr. 10 , & Segmentum $C10$ radii Co est sinus gr. 80
 complementi latitudinis Paralleli per gr. 10 utrinque ab
 Æquatore: & ita de reliquis. Hos eosdem sinus abscin-
 dimus in utroque latere $C60$: ergo rectæ per eorum ex-
 tremia ad puncta cognomina in Co efficiunt intra Rhom-
 bum totidem trigona æquicrura, & propter angulos ver-
 ticales graduum 60 omnibus communes, etiam æquila-
 tera, ideoque bases cruribus, hoc est prædictis sinubus
 respectivè æquales: ergo si binæ, & binæ æquales acci-
 piantur pro una linea, erunt radii Parallelorum in Di-
 sco, similiter ac dictum est de radio Æquatoris. Sunt
 autem hæ bases omnes Parallela, propter omnes angu-
 los æquales: ergo rectæ ex C ad sinus Æquatoris (10.6 .
 Euclid.) secant in similes sinus omnes radios Parallelo-
 rum ductos, & alios per quoscumque gradus latitudinis
 ducendos, cum opus fuerit. Habemus ergo in diametro
 maxima cujusvis Ellipsis in Disco sinus petitos. Quod est
 primum. In eodem Rhombo haberi possunt etiam sinus
 complementi cujusvis horæ relatæ ad semidiametrum mi-
 nimam; si nempe in radiis $C60$ utrisque, & in Co ab-
 scindatur semissis datæ semidiametri minimæ, & tria pun-
 cta rectis jungantur. Nam in his sinus hor. 1 , & 11 erit
 sinus complementi hor. 7 , & 5 , & contra, & ita porro.
 Sed quia Semidiametri minimæ inconstantes sunt, ut
 Solis declinatio, & sæpius nimis parvæ, multò magis
 earum semissis, res nec ita commoda, nec tuta admo-
 dum esset. Dicam igitur in Schol. sequente, quid pro
 his aptius sit.

Offen-

Ostendo secundum: In quadrilatero FL in dorso instrumenti habentur chordæ singulorum graduum ab 1 usque ad 30, respectivè ad perimetrum Disci; abscindimus enim eas duplas similium chordarum semicirculi, cujus radius subduplus: sed arcus circulorum imperati applicatione chordarum abscinduntur; ut etiam notâ chordâ alicujus arcus, etiam arcus innotescit: ergo ope ejus quadrilateri dati arcus aut anguli mensurari, aut imperati abscindi, & respectivè constitui, ni superent gr. 30, statim possunt. Quod si superent 30, applicitâ chordâ gr. 30 quoties potest, mensurando reliquum, totus arcus angulusque fiet, aut notus erit in gradibus. Porro 30 Parallelæ (4. 6. Euclid.) secantur proportionaliter rectis obliquis, & cum æqualiter mutuò distent, earum incrementa inter obliquas æqualiter fiunt. Teste autem canone sinuum, sinus ideoque & chordæ per bina minuta à gradu ad gradum differentias habent ad sensum æquales: ergo dictæ interceptæ exhibent chordas ad bina minuta: & quia intermedias oculus exactè discernit, habeantur chordæ ad singula minuta usque ad Gr. 30, quæ juxta dictâ sufficiunt, maximè, quod arcus quadrantis aperturâ sui radii ex utroque extremo in gradus tricenos nullo labore dividatur: ergo scala hæc ad omnes arcus abscindendos, & metiendos, ut & angulos constituendos, aut notos faciendos apta est, & sufficit. Quod est secundum.

Ostendo tertium. In quadrato DH habetur communis Scala Geometrica, in qua obliquæ (4. 6. Euclid.) similiter secant interceptas parallelas. Sectis ergo lateribus DG, FH in 50 partes æquales, productis per singulas rectis Parallelis, habetur linea DF secta æquivalenter in partes 500, & per alias in binarum medio faciliè æstimabiles, in 1000. Patet autem satis esse ducere Parallelas reipsa per partes decimas laterum DG, FH , & reliquarum notare puncta, ut dictum est. In hac ergo Scalâ sumi possunt imperatæ partes 1000.^{mz} lateris DF , quæ duplicatæ erunt totidem partes radii Disci dupli ipsius

fuis *DF*. Cum ergo ad rem nostram geometricè expediendam satis sit supponere radium Disci partium 1000 (minutiores enim circinus non discriminat, nisi radius sumatur longissimus), & idem radius semper notus esse debeat in minutis, & secundis, ut inferius patebit; datis cujuscvis lineæ rectæ minutis, per regulam auream, sciri potest quot partibus millesimis radii Disci respondeant. Nam si minuta tam radii Disci, quàm data in ea vel alia linea, resolvantur in minuta secunda, si hæc tam radii, quàm datorum quantitati adhæreant, ut plerumque, & minorum secundorum datæ lineæ numerum auctum tribus 0 divides per numerum secundorum totius radii, quotus erit numerus quæsitus. Cum ergo partes inventæ accipi possint à Scala, ac duplicatæ abscindi in rectis in Disco datis, patet propositum. Similiter si detur in Disco linea ignota, & ejus semissis applicetur Scalæ, sciatur quot partes millesimas radii Disci contineat. Quæ omnia Geometriæ non ignaris perspectiora sunt, quàm ut possant hic ulterius declarari. Patet ergo finis & utilitas totius instrumenti. Quod erat &c.

Coroll. Quoniam pro angulorum, seu mensurâ, seu constructione perinde est, quo radio arcus describatur; per hoc instrumentum quicumque, in quovis genere anguli mensurari itemque arcus possunt; & quidem exactiùs, quàm per quadrantes manuales, quorum communior est usus.

S C H O L I U M.

Pro sinubus respectivè ad diametros minimas Ellipsis, aptius erit pro re natâ delineare in chartâ triangulum æquilaterum, quod facillimè ita fit.

Ductis utcumque normalibus *AB*, *CD* radio quovis non minore sinu datæ Solis declinationis, describatur semicirculus *ADB*, qui in 24 partes æquales secetur pro 24 semihoris. Puncta *A*, & *B* tribuantur horis 6, & 18, punctum *D* horis 24, & 12; & agantur chordæ per puncta

F

Et

Tab. V. Fig. 13.

Et utrinque à D æquè remota, quarum notentur concurfus cum radio CD . Super CD perficiatur triangulum æquilaterum $C4D$, & ex vertice 4 agantur rectæ ad singula puncta notata in CD . In CD habentur, ut patet, sinus complementi horarum: absolutumque est instrumentum. Usus is erit in lateribus 4 $C, 4D$ ex puncto 4 abscindatur semidiameter minima petita Ellipsis, puta 4 $e, 4f$ pro Æquatore figuræ septimæ, æquales semidiametro minimæ Ta , vel Tb : 4 $g, 4h$ semidiameter minima Paralleli gk æqualis on , seu od . Junctæ ef, gh erunt prædictæ Semidiametri minimæ sectæ in sinus petitos, quod similiter ostenditur, ac supra in Rhombo. Poterit etiam hujusmodi triangulum fieri in uno è vacuis præcedentis instrumenti, ut figura ostendit, cujus basis sit chorda in semicirculo Grad. saltem 23 30'; aut etiam 30 grad., & usui esse poterit semper, modò rectæ ef &c. hic & nunc necessariæ, ducantur debiles.

Usus instrumenti ex ostensis satis patet: præcipuè pro describendis Ellipsis; E radio dati Paralleli intra Rhombum (ducendo nisi extet) transferantur intervalla, e semiradio ad sinistram, in diametrum maximam Ellipsis petiti Paralleli, utrinque ab ejus centro; intervalla verò Semiradii in alterâ parte transferantur, ac notentur è punctis jam notatis horarum 2, & 22, versus diametri extrema. Eadem intervalla transferantur etiam simul in aliquam parallelam dictæ diametro maximæ. Per puncta cognomina utriusque parallelæ applicita Regula exhibebit chordas Paralleli. In his utrinque à diametro maxima, abscindantur sinus complementi horarum, ad quas chorda pertinet, qui sinus habentur in semidiametro minima ducta in præcedenti triangulo, quod fiet, si posito circino in concursu Regulæ cum Diametro maxima, aperitur sinûs complementi notetur punctum ponè Regulam ad partes arcûs diurni Ellipsis. Sufficit tamen ad delineandam exactè Eliipsim puncta sic determinare in horis, & semihoris singulis. Descripta Ellipsi, Regula applicita similiter per sinus quadrantum &c. dabit eo ipso

co-

eorum puncta in arcu Ellipsis. Reliqui usus patebunt per partes inferiùs.

Plerique non Rhombo utuntur, sed trigono æquilatelo super latere æquali radio Disci, intellectis horis duplici opposita serie. Res eodem recidit, sed longiore circino, majorique hujus diductione pro usu opus est, ut & pro constructione, & insuper instrumenti moles ferè dupla erit. Quare saltem propter commodum, praxim propositionis præhabeo. Utramlibet præoptes, utriusque constructionem, & usum habes hic.

PROPOSITIO XI. THEOR. V.

Apparentia axis Orbitæ Lunaræ in Disco Terræ est linea recta normalis ad communem Disci cum Orbita sectionem, facitque cum axe Eclipticæ angulum æqualem angulo Eclipticæ & Orbitæ in Plano Disci.

ESTO Discus Terræ $LAOB$, qui extensus usque ad Cælum Lunæ faciat planum circuli maximi $LEOF$. Circulus longitudinis Solis esto LSO , & Sol in S : nempe radio centrali ST Eclipticam rectam ad circumlum longitudinis exhibeat recta SE . Sit primò Sol in nodo, seu communi concursu Eclipticæ cum Orbita; patet Orbitam transire per S . Ea ergo sit $CS D$, quæ ad Discum recta erit, cum transeat per polum ejus S . Cum verò Orbita ad Eclipticam inclinata sit, illius communis sectio cum Disco, non erit eadem ac FE communis Eclipticæ cum Disco sectio. Sit ergo Orbitæ, & Disci communis sectio CD . Agatur in Disco recta pTr ad CD normalis.

Demonstratio. Quoniam tam Ecliptica, quam Orbita transeunt per S , earum communis sectio est ST ad Discum [19. 11. Euclid.] normalis; ideoque etiam ad pTr . Sed pTr facta est normalis ad CD : ergo

normalis est [4. 11. Euclidis] ad planum Orbitæ, in quo sunt $S T$, CD : cum ergo transeat per T Orbitæ centrum; est $p r$ axis Orbitæ jacens in ipso Disci plano in casu hoc. Est autem $L T O$ [2. huj.] axis Eclipticæ, & anguli $A T O$, $D T r$ ambo recti: ergo ablato communi $D T o$, remanent $a T D$ angulus Eclipticæ cum Orbita, & $O T r$ angulus axium Eclipticæ, & Orbitæ æquales. Quod est primum.

II. Sit Sol extra nodum, qui sit in Ω , quare non transibit Orbita per S , sed alibi secabit circulum $L S O$. Secet in Δ , sitque communis sectio Orbitæ cum Disco recta $C T D$, & cum circulo $L S O$ recta ΔT . Esto axis Orbitæ $a T X$, qui non jacebit in plano Disci, cum angulus $\Delta T a$ rectus sit, angulus autem rectæ ΔT obliquæ ad Discum, cum Disci plano sit obliquus, nempe ad partes a major recta quantitate latitudinis Orbitæ, nempe $S \Delta$, ad alias partes eadem quantitate minor. Intelligatur per $a X$, $S T$ planum, quod [18. 11. Euclid.] tam ad Discum, quàm ad Orbitam rectum erit. Agatur in Disco recta $p T r$ ad CD normalis.

Demonstratio. Planum per $a X$, $S T$ parallelum est radiis Solis centralibus; ergo ejus consequenter, & axis Orbitæ in eo jacens, apparentia in Plano Disci est linea recta transiens per T . Quoniam autem tam Discus, quàm Orbita normales sunt ad illud planum, Disci, & Orbitæ communis sectio $C D$ [19. 11. Eucl.] ad illud planum, & ad hujus cum Disco communem sectionem recta erit. Quare $p r$ per constructionem recta ad CD , in T erit plani illius cum Disco communis sectio, ideoque axis Orbitæ apparentia, &, ut in primo casu, angulus axium $o T r$ angulo $F T D$ Eclipticæ cum Orbita in Disco æqualis. Quod erat alterum. Apparentia ergo axis Orbitæ &c. Quod erat &c.

Coroll. Sequitur hinc, quòd sicut in 2^a. hujus ostendimus de axibus Æquatoris, & Eclipticæ, quod angulum habeant maximum in Disco, hoc est æqualem inclinationi

nationi Eclipticæ ad Æquatorem, cum Sol est in punctis Æquinoctialibus, qui dici possunt nodi Æquatoris, & Eclipticæ, minimum verò, hoc est nullum, cum Sol est in Solstitiis, quæ sunt limites Eclipticæ, eo quod circulus longitudinis transeat per polos tam Æquatoris, quàm Eclipticæ, ideoque utrumque axem habeat in suo plano, ideoque uterque in Disco appareat in eadem rectâ, in qua ipse circulus longitudinis; ita hîc similiter angulus axium Orbitæ, & Eclipticæ tunc maximus est in Disco, nempe æqualis inclinationi Orbitæ ad Eclipticam tam in Disco, quàm in Sphæra [arcus enim FD in primo casu propositionis, tam rectilineum FTD , quàm sphericum FSD metitur] cum Sol est in ipsis nodis; minimus verò, hoc est nullus, cum Sol est in circulo longitudinis transeunte per limites Orbitæ. Cum enim circulus talis longitudinis distat a nodis quadrante Eclipticæ, in illis nodus habet suos polos, & cum eos transeat etiam Orbita, habet polos etiam in Orbita: Ergo [Coroll. 15 1. Theod.] circulus ille longitudinis vicissim transit per polos Eclipticæ & Orbitæ, consequenter utrumque axem habet in suo plano, qui ambo proinde in eadem linea LO in Disco apparebunt. Ex quo patet eorum axium angulum eo majorem esse in Disco, quo Sol propius a nodis distat, & eo minorem, quo longius. Quia autem in Eclipsibus Sol aut in nodo est, aut parùm inde abest; hinc tunc ille angulus, aut maximus est, aut non multo minor. Quando autem axis Orbitæ orientior in Disco sit axe Eclipticæ, aut occidentior, dicetur in Coroll. post 16. hujus.

S C H O L I U M.

In Eclipsibus ad majorem facilitatem supponi solet Sol quasi toto Eclipsis tempore fixus in eodem Cæli puncto, nempe perinde, ac si motu proprio careret, Luna

na autem ab eo moveri, vel ad eum, motu differentiae, inter motum Solis proprium, & Lunæ item proprium, ut reipsa appareret aspicienti Lunam è Sole. Hinc fit tam angulum FTD , seu æqualem CTE , quàm oTr paulo majores apparere. Enimverò facta demonstratio à nullâ determinatâ quantitate anguli CTE pendet: quare id veritati Theorematis, ejusque Demonstrationi nil detrahit.

PROPOSITIO XII. PROBL. VII.

In Syzygiis dato vero loco Solis in Ecliptica, loco nodi proximi, & angulo inclinationis constantis Orbitæ veræ ad Eclipticam, angulum verum axium Ecliptica, & Orbita querere.

Fig. ead.

I. **S**int Sol, & Luna in ipso nodo. Facta constructione, ut in propositione præcedenti, SE , SC sunt quadrantes: ergo arcus CE est mensura anguli CSE sphaerici Eclipticæ cum Orbita; idem autem CE metitur angulum rectilineum CTE , cui ostendimus æqualem [præced.] angulum oTr : ergo in hoc casu quæsitus angulus axium dato angulo inclinationis est æqualis.

II. Esto nodus in \mathcal{U} , Sol in S , Luna in C . Quoniam Solis & \mathcal{U} loca dantur, notus est arcus $S\mathcal{U}$, ejusque complementum $\mathcal{U}E$; datur etiam angulus $C\mathcal{U}E$ inclinationis Orbitæ ad Eclipticam; & angulus ad E rectus: ergo per trigonometriam reperietur CE mensura anguli CTE , hoc est æqualis oTr quæsitæ; si fiat, ut sinus totus ad sinum arcus $\mathcal{U}E$, ita tangens anguli obliqui dati $C\mathcal{U}E$ ad tangentem arcus CE . Ex. gr. *Hirius* statuit angulum ad \mathcal{U} constanter Gr. $5^{\circ} 1' 30''$. In exemplo in superioribus proposito, locus verus Solis est $S. 112^{\circ} 39' 46''$; locus $\Omega S. 713^{\circ} 17' 33''$: ergo locus $\mathcal{U}S. 113^{\circ} 17' 33''$; ex quo subtracto loco Solis, inven-

S C H O L I U M.

Extra Syzygias, propter variationes, quæ sese immiscunt, latitudo simplex hoc modo reperta, corrigenda adhuc est. De quo vide apud Astronomos. Cæterum problema solvi poterat etiam per data in Propositione præcedenti. Nam si Log. tangentis anguli dati ab \mathcal{U} addas separatim Log. sinûs arcûs $\mathcal{U}E$; & Log. $\mathcal{U}S$ datorum, summa prior, abjectâ 1 sinistima dabit angulum axium, ut in propositione præcedenti: posterior similiter mûltata, erit T. log. latitudinis quæritæ $S\mathcal{C}$.

PROPOSITIO XIV. THEOR. VI.

In Eclipsibus latitudo centri umbræ, seu penumbrae lunaris in Disco Terræ æqualis ad sensum est latitudini veræ Lunæ.

Fig. ead.

SI latitudo Lunæ nulla sit, ejus centrum erit in linea ST , ideoque umbræ centrum cadet in T centrum Disci, nullamque similiter habebit latitudinem.

Esto Luna in \mathcal{C} , in latitudine $S\mathcal{C}$. Per Lunæ centrum sit radius è centro Solis $\mathcal{C}G$; qui cum sit in plano circuli longitudinis $L\mathcal{C}O$, necessario incidet in axem Eclipticæ LO , sive intra Discum, sive extra, si latitudo Lunæ major fuerit radio Disci. Incidat in G .

Demonstratio. ST , $\mathcal{C}G$ ambæ ad Discum rectæ sunt [6. 11. Euclid.] parallelæ; & [29. 1. ejusd.] anguli alterni $ST\mathcal{C}$, $G\mathcal{C}T$ æquales: ergo latitudo $S\mathcal{C}$, quæ in Eclipsibus Terræ vix pertinet ad $93'$, differt à TG quantum a suo sinu, nempe insensibiliter. Nam chorda gr. 1. $34'$, seu $94'$. major est sinu ejusdem arcûs $\frac{25}{1000000}$, hoc est $\frac{1}{40000}$ sinûs totius. Ergo arcus ille sua chorda insensibiliter major paulo plus excedit suum sinum. In latitudine autem minori, excessus ille semper minor est: ergo pro æqualibus haberi possunt. Quod erat &c.

Coroll.

INTEGRÆ CONSTR. ASTRON. PROP. XIV. 49

Coroll. Quoniam arcus totus $S\text{C}$ non differt sensibiliter a totâ TG , multò minus different sensibiliter amborum partes similes. Sinum ergo latitudinis C in Disco tutò licet in tot partes æquales dividere, aut divisum supponere, quot minuta, aut secunda habet latitudinis arcus $S\text{C}$. Eadem ratione radius Disci secari potest in tot partes æquales, quot habet minuta Parallaxis C horizontalis, vix excedens $62'$: ei enim æqualis supponi debet radius Disci; cùm tantus è Luna appareat, consequenter relativè ad Lunam tantus sit. Similiter eâdem de causâ dividi possunt aliæ rectæ quæcumque in Disco Terræ.

PROPOSITIO XV. THEOREMA VII.

*Apparentia Orbitæ Lunaræ in Disco Terræ
est linea recta vel verè, vel saltem
ad sensum, & ad axem Orbitæ
perpendicularis.*

I. **S**Yzygia contingat in ipso nodo. Orbita CSD in Disco (11. huj.) est CTD ad axem pr normalis, & (Coroll. 3. primæ huj.) linea recta. *Fig. ead.*

II. Syzygia non fiat in nodo; sed Orbita sit $C\text{C}D$; apparentia Orbitæ in Disco (Coroll. 2. sextæ huj.) erit Ellipsis CGD , utique acutissima, cum ejus diameter maxima sit diameter Cæli Lunaræ CD , minima verò dupla rectæ Te adhuc minor quam duplum latitudinis, quæ in latitudine in Eclipsibus maxima vix est $\frac{1}{10}$ diametri Cæli Lunaræ. Itaque Ellipsis illius Segmentum circa medium, quod apparet in Disco Terræ, non differt sensibiliter à lineâ rectâ; cum neque differat arcus similis Ellipsis Æquatioræ in Disco Terræ, cujus diameter maxima circiter $\frac{1}{10}$ Diametri Cæli lunaræ, si declinatio non superet tres, aut quatuor gradus. Quo major autem est proportio Diametri minimæ ad maximam, eo magis Ellipsis circa medium

G

dium

dium deflectit à lineâ rectâ, & eo minus, quo minor. Potest ergo Segmentum dictum illius Ellipsis tutò pro rectâ ad sensum haberi; & quia utrinque ad axem Orbitæ, qui & Ellipsis axis minor est, æquabiliter se habet, angulos utrinque æquales facit, ideoque ad sensum rectos. Quod erat ostendendum.

Coroll. I. Quia *Tr* in Disco est axis Orbitæ, *TG* latitudo Lunæ, seu umbræ &c., si in axe Eclipticæ abscindatur *TG* sinus datæ latitudinis in partibus radii Disci, & per *G* ad *Tr* agatur linea ad rectos angulos, hæc erit apparentia Orbitæ in Disco. Si latitudo nulla sit, ea normalis transibit per *T*, erit nempe, ut in primo casu, recta *CTD*.

II. Quia in trigono *TeG* ad *e* rectangulo, hypothenusa *TG* (18, & 32. 1. Euclid.) major est *Te*, summa autem Eclipsis Terræ sit, cum minima est distantia centrorum Disci, & penumbrae, patet summam Eclipsim tunc solum convenire in idem momentum cum vera Syzygia, cum *G* est in *T*, hoc est Syzygia fit in ipso nodo: aliàs summa Eclipsis præcedet, aut subsequetur, prout axis Orbitæ occidentior fuerit, aut orientior axe Eclipticæ.

III. Quia centrum Lunæ semper est in sua Orbita, & centrum penumbrae in recta è centro Solis per centrum Lunæ; patet centrum penumbrae in Disco non recedere ab apparentia Orbitæ, & in ea pari passu procedere ab occasu in ortum, quo Luna à Sole in sua Orbita. Hinc in Disco *Via Lunæ*, *via penumbrae*, *Orbita Lunæ* sunt Synonyma. Quod si hæc via secetur in minuta motus horarii Lunæ à Sole, sciri poterit pro quovis momento dato intra tempus Eclipsis, ubinam fuerit, sit, aut futurum sit centrum penumbrae &c.

PROPOSITIO XVI. PROBLEMA IX.

In Syzygia datis veris motibus Solis, & Lunæ, hujus vera latitudine, cum angulo in Disco inclinationis Eclipticæ, & Orbitæ, inclinationem ap-

apparentem Eclipticæ, & Orbitæ, hoc est axium earum, nec non motum horarium Lunæ à Sole æquabilem in Orbita apparenti determinare.

ESto SN portio Eclipticæ in Disco, SL ejus axis; in momento veræ Syzygiæ Sol sit in S , Luna in L , latitudo SL , nodus proximus in N , eritque LN apparentia Orbitæ veræ. LH sit verus motus horarius Lunæ in Orbita circa Syzygiam, Ss sit similis motus Solis in Ecliptica. Jungatur sH , & per H agatur Ha parallela ipsi NS . Fiat Hb æqualis sS , & jungantur bS , Lb , quæ producta, si sit opus, secet SN in n . Angulus N est inclinatio Orbitæ veræ ad Eclipticam in Disco per 10 hujus reperta. Huic æqualis est externus LHb , propter parallelas NS , Ha : & quia Hb , sS parallelæ sunt, & æquales etiam (33. 1. Euclid.) Hs , bS parallelæ sunt, & æquales. Quoniam una hora ante, vel post Syzygiam Sol est in s , Luna in H , amborum distantia tunc est sH . Quia verò spectans Lunam è Sole, se, & Solem haberet tanquam fixum in S , & Lunam videret quasi motam motu differentie inter LH , Ss ; patet cum Luna est in H distans à Sole s recta Hs , videri perinde ac in eadem distantia ab S , nempe in b . Itaque via visa Lunæ est Lb , & videbitur percurrere bL , dum percurrit HL , & similiter cum est in nodo N videbitur esse in n . Motus ergo horarius visus est Lb , & nodus apparens est n : hinc angulus inclinationis Orbitæ visæ ad Eclipticam est LnS major (16. 1. Euclid.) angulo N . In triangulis LSN , LnS ad S rectangulis, reliqui duo simul anguli in singulis (32. 1. Euclid.) æquant unum rectum: ergo angulus LnS tantò major est angulo N , quanto nLS minor angulo NLS , nempe quantitate anguli HLb , qui additus angulo noto N dabit quæsitum angulum LnS inclinationem apparentem Orbitæ ad Eclipticam, hoc est (11. hujus) axis illius ad axem hujus.

Resolutio. In triangulo LHb dantur LH , Hb motus horarii veri Lunæ, & Solis, & angulus interjacent

Tab. V. Fig. 15.

æqualis angulo noto N : ergo per trigonometriam repetitur angulus HLb , & latus Lb motus æquabilis Lunæ à Sole, quæ duo petuntur. Omnia patent ex constructione, ejusque declaratione. Adjicio formam calculi in consueto exemplo.

LH motus horarius verus $\text{C } 37^{\circ} 36''$	2256
Hb mot. hor. verus Solis	2 25. 145
Summa	40 1. 2401
Differentia	35 11. 2111
$LHb. G.$	5 1' 28"
Summa cæter. $G. 174^{\circ} 58' 32''$	
Semifumma	87 29 16.
Semifum. angulorum $Gr. 87^{\circ} 29' 16''$ T. l. 11. 3577862	
Differ. motuum	2111" l. 3. 3244881
Summa ll.	14. 6822744
Sum. mot. 2401" l. subtr.	3. 3802922
Semidifferentiæ — $Gr. 87^{\circ} 29' 35''$ T. l. 11. 3019822	
Subtr. ex semifum.	87 29 16.
Ang. HLb	0 20 41.
Adde ang. N	5 1' 28.
Ang. LnS	5 22 9. axium Eclip. & Orb.
Item $LHb Gr.$ 5 1' 28" — Sin. l. 8. 9424086	
$LH,$	2256" — l. 3. 3533391
Sum. LL.	12. 2957477
Subtr. $LbH. Gr. 174^{\circ} 37' 51''$ — l. 89711484	
Lb 2221" 32" — l. 3. 3245923	
hoc est 35' 11" 32" .	

Cognitis angulis LHb , & HLb , eorum summa, nempe LnS , dempta ex 180° , relinquit angulum LbH graduum $174^{\circ} 37' 51''$, quo cognito per secundam analogiam, reperitur Lb ut in exemplo. Quod erat &c.

Coroll. Orbitæ cum Ecliptica, & eorum axium inclinationes (11. huj.) sunt æquales. Si fiat angulus LSM æqualis invento LnS , erit SM axis Orbitæ in Disco Terræ rectus ad Orbitam apparentem.

$Ln.$

$L n$. Nam angulus LSM factus est æqualis angulo $L n S$, angulus MLS utrique triangulo communis est: ergo reliquus LMS reliquo $L n S$ recto æqualis. Cum ergo MLS sit acutus, M verò rectus, SL , & alia quævis recta ab S ad $L n$, utrinque ab SM (18 ac 32. 1. Euclid.) major est, quàm SM : hæc ergo est minima centrorum penumbra, & Disci distantia, ideoque in M fit summa Eclipsis: Quia autem SM necessario [17. 1. Euclid.] cadet ad partes anguli acuti rectæ SL cum $L n$, qui angulus semper est ad partes nodi proximi, ad quas Ecliptica, & Orbita convergunt; hinc si Luna in vera Syzygia sit prætergressa nodum, hoc est si nodus sit Lunæ occidentalior, nempe major sit longitudo vera Lunæ, quàm nodi [movetur enim Luna motu proprio ab occasu in ortum] axis Orbitæ in Disco occidentalior erit axis Eclipticæ in Disci semicirculo boreali, si nodus proximus sit Ω , in Australi si γ . Sed si Luna nondum nodum attingit, nempe longitudinem habeat minorem longitudine nodi, contrarium fiet, ex eadem ratione. Jam si totum Lb feces in 60 partes æquales, quot harum habebit Segmentum LM , tot minutis temporis summa, seu media Eclipsis antevertet, aut sequetur momentum veræ Syzygiæ: hinc ex noto veræ Syzygiæ momento per solam additionem, aut respectivè subtractionem patefiet momentum summae, seu mediæ Eclipsis. Inveniri etiam potest LM quantitas per scalam geometricam in nostro instrumento: nam si queras quot particulas nullissimas radii Disci habeat tota Lb , & quot LM , si fiat ut particulae totius Lb ad particulas LM , ita 60 ad 4.^m: hic erit, quod quæritur. Verùm cum latitudo Lunæ modica est, ut in proposito exemplo, præstat trigonometricè resolvere trigonum LMS , in quo præter angulum rectum ad M , notus est angulus ad S cum hypothenusa SL , cujus resolutionis exemplum extat in 20. hujus sequente.

SCHO-

S C H O L I U M.

Angulus HLb nunquam pervenit ad $30'$, quare Lb vix differt ab LH dempto motu Solis, nempe Hb , ut patet ex secunda analogia propositi exempli. Hinc *Hirius* utitur motu vero Lunæ à Sole, quod citra errorem sensibilem fit, saltem in latitudine Lunæ non magna.

Dicta in Corollariis hujus, & præcedentis de summâ Eclipsi, intellige de Eclipsi Terræ [aut etiam Lunæ, cui servatis servandis eadem methodus inservit, ut suo loco patebit]. At si sermo sit de occultatione Solis post Lunam, cum hæc absoluta non sit, & universalis, sed respectiva, ac diversis in locis terrestribus diversa, aut etiam nulla, cum alibi est summa &c; pro statuendo momento summæ occultationis non attendenda est distantia vera, & absoluta minima centrorum Solis, & Lunæ; sed respectiva, & optica, hoc est quæ in his, vel illis locis apparet. Hæc tamen ipsa ex Typo Eclipsi Terrestris in 18^a sequenti, juxta datam doctrinam, describendo, nullo negotio per praxes inferius dandas determinabitur.

PROPOSITIO XVII. PROBL. X.

Præparanda ad Typi Ecliptici descriptionem.

I. **M**ethodo communi determinetur momentum veræ Syzygiæ tempore vero pro dato loco Terrestris determinato; & pro eodem momento loca veræ Solis, & Lunæ, argumentum verum latitudinis, & [13. hujus] Lunæ vera latitudo. Syzygia pro Eclipsi Terræ est novilunium, pro Lunæ plenilunium.

II. Methodo item communi determinentur motus horarii veri Solis, & Lunæ, & (per præced.) angulus apparens Axium Orbitæ, & Eclipticæ, & eorum plaga; nec non motus horarius æquabilis Lunæ à Sole in Orbita apparenti.

III. Determinetur (3. hujus) angulus axium Eclipticæ,

ptica, & Æquatoris, & (4. huj.) eorum plaga, & (7. huj.) Solis declinatio.

IV. Determinentur item methodo communi Semidiametri apparentes Solis, & Lunæ, Semidiameter penumbrae correctæ, Parallaxis Lunæ horizontalis, cui supponitur æqualis radius Disci. His paratis, facillè Typus describitur, pro quo ad majorem claritatem pono hic duo exempla realia.

An. 1734. Nubilunium Eclipticum contingit die tertia Maji, & juxta Tabulas *Hirii* Pekini accidit h. 5. 59' 56" à Mer. tempore vero. Argumentum latitudinis invenitur S. 5. 39° 21' 57". Necessario ergo est Eclipsis, quæ contingit Luna descendente ad 28 in latitudine initio boreali decrefcente; ac post transgressum novum transibit in australem crescentem; sed id fiet post verum Novilunium. Itaque præparatio erit, ut sequitur.

E X E M P L U M I.

An. 1734. Pekini ☿ verum Maji d. 3. h. 5. 59' 56" seu h. 6. à M. tempore vero.

Loca vera Solis, & Lunæ S. 12° 39' 46" ☿ 12° 39' 46".

Declinatio Solis Borealis G. 15 40' 40".

Argumentum latitudinis S. 5 29° 21' 57".

Latitudo ☾ bur. decrefc.

3 20. — 200"

Motus horarius ☾ verus

37 36. — 2256

Horarius Solis verus

2 25. — 145

Horarius verus ☾ à Sole

35 17. — 2118

Idem in Orbita apparente

35 11 32" — 2111. 32"

Angulus axium Eclip. & Orbitæ Gr. 5 22' 9" Axis Orbitæ ad bor. Orientalior.

Angulus axium Æquin. & Eclip. Gr. 17. 43. 52. Axis Eclip. ad bor. Occidentalior.

Diameter Solis apparens.

31 51. — 1911"

Diameter Lunæ apparens.

33 11.

Summa Diametrorum

65' 2"

Semisum. radius penumbrae.

32 31.

Radius penumbrae correctus.

32 1 — 1921"

Parallaxis Lunæ horizontalis)

60 53. — 3658

radius Disci)

An.

An. 1735. fiet ☿ die 15. Octobris, quod Pekini incidet in horum 22. 19' 2" à Met. tempore vero hoc est civiliter, die 16. hor. 10. 9' 2" à *M. N.* Argumentum latitudinis S. 0 7° 3' 41": erit ergo Eclipsis necessand, quæ continger Lunâ prætergressâ ♄, ideoque in latitudine Boreali crescente. En præparationem.

E X E M P L U M II.

An. 1735. Pekini ☿ ver. tempore vero Octobris 15 22' 19' 2" à Met. seu d. 16 10h 19' 2" à *M. N.*

Loca vera Solis, & ☾ S. 6 22° 14' 29" ♄ G. 22 14' 29".

Declinatio Solis Australis Gr. 8 40' 52"

Argumentum Latitudinis S. 0 7° 3' 43"

Latitudo Lunæ boreal. cresc. 37 10. — 2221"

Motus horarius ☾ verus. 35 13.

Horarius verus Solis. 2 29.

Horarius verus ☾ à Sole 32 44. — 1964" haberi potest pro æquabili. Angulus axium Equatoris & Eclipticæ G. 22 55' 17" Axis Eclipticæ Orientalior.

Angulus axium Eclipticæ & Orbitæ G. 5 23' 33". Axis Orbitæ Occidentalior.

Diameter Solis 32 17. — 1937"

Diameter Lunæ 32 9.

Summa Diametrorum 64 26.

Semisumma radius penumbræ 32 13.

Correctus 31 45. — 1903"

Parallaxis ☾ horizontalis radius Disci 58 58' — 3538"

PROPOSITIO XVIII. PROBL. XI.

Typum Eclipsis Terrestris delineare.

Tab. V. Fig. 16.

Tab. VI. Fig. 17.

DUctis rectis ad invicem normalibus *B A*, oo, *T* puncto concursus, ut centro, radio assumpto ex instrumento propositionis decimæ, describatur pro Disco Terræ circulus, in quo *B A* sit meridiana, oo diameter Equatoris. Ducatur (4. huj.) *TE* axis Eclipticæ, qui in figura decimasexta, quæ est pro primo exemplo erit
ab

ab *TB* ad occidentalem plagam, in figura decimaseptima pro secundo erit ad orientalem. Chordam arcus *BE* prædictum instrumentum suppeditat, quod nota pro similibus. Agatur item axis *TO* orbitæ apparentis in primo exemplo orientalis, in secundo occidentalior *TE* axe Eclipticæ. In partibus radii Disci millesimis quærantur quot earum convenient minutis latitudinis Lunæ; ut in primo exemplo fiat, ut 3653" parallaxis horizontalis ad 1000 radium Disci, ita latitudo Lunæ 200" ad quartum: inveniuntur partes 54, 75. In secundo exemplo, ut 3538 ad 1000, ita 2221 ad quartum: inveniuntur partes 627, 76. prope. Inventarum partium duplum, (si non excedet 1000, ut in primo exemplo sunt partes 109 $\frac{1}{2}$) accipiatur Scalâ geometricâ, & abscindatur à *T* versus *E* in axe Eclipticæ, quoniam latitudo datur Borealis, (infra *T* abscindendum esset in *TE* producta, si daretur australis) & habebitur punctum *L* latitudo centri penumbrae in momento veri novilunii. In secundo exemplo acceptis e Scalâ inventis particulis, fiat *TL* earum dupla; & habebitur similiter punctum *L*. Per *L* demittatur ad *TO* axem orbitæ perpendicularis *NLQ*, eritque Orbita Lunæ apparens utrinque extra Discum producenda; & punctum, ubi ea secat *TO*, est punctum, in quo fit summa Eclipsis Terrestris.

Præterea, similiter, ac supra pro latitudine, quærantur partes millesimæ radii convenientes motui horario dato Lunæ à Sole. In primo exemplo inveniuntur partes 578, in secundo 555. Quia radius Disci duplus est lateris scalæ, hæ particulae è scala excerptæ erunt motus $\frac{1}{2}$ horæ. Si σ verum incidat exactè in horam integram, aut semihoram, ut in primo exemplo in hor. 6, intervallo partium inventarum (scilicet hic 578) abscindantur utrinque ab *L* in Orbita 5 aut 6 intervalla æqualia, quorum singula erunt spatium, quod centrum penumbrae intra semihoram percurrit. Semihoris bifariam sectis habentur quadrantes; his trifariam sectis, habentur quina minuta, quorum singulis intervallis sectis in

H

quin-

quinque partes æquales, secta erit Orbita in singula minuta motus horarii apparentis Lunæ in Orbita; seu centri penumbræ. Puncto *L* adscribatur hora veri Novilunii, in exemplo h. 6, cæteris ordine suo, nempe ab *L* ad sinistram 5, 4, 3, &c. Ad dexteram 7, 8, &c. si hora ϕ veri non sit hora, aut semihora integra, aut etiam quadrans, ut in secundo exemplo h. 22 19', quia defunt ad h. 22 30' minuta 11; fiat, ut 30' ad 555, ita 11 ad quartum: inveniuntur partes 203 $\frac{1}{2}$ convenientes 11 minutis motûs, quæ abscindantur ab *L* ad dexteram, quoniam h. 22 30' posterior est h. 22 19'. Ex harum termino, qui, ut patet, spectat ad horam 22 30', perficiatur divisio, ut in priori casu.

Tandem quarantur similiter partes millesimæ convenientes radio correcto penumbræ. In primo exemplo sunt 526 ferè, in secundo 538 ferè. Earum duplum accipiatur è scala, tum radio composito ex iis partibus, ut dictum est duplicatis, & radio Disci, ex centro *T* secetur Orbita in punctis *N*, & *Q*; perfectusque erit Typus, cujus constructio ex demonstratis plenè patet; usus mox patebunt.

S C H O L I U M.

Sunt, qui radium Disci secant in tot partes æquales, quot habet minuta Parallaxis horizontalis; & in eâ sic divisa accipiunt minuta latitudinis, motus horarii &c. Sed res minus exacta est, & molestior præsertim si data Parallaxis habeat adnexa secunda non admodum pauca ultra, aut citra minuta prima, aut si minutorum numerus sit primus, ut in secundo exemplo est m'. 59'. Per Scalam autem geometricam res exactissimè, & facillimè expeditur.

PROPOSITIO XIX. PROBL. XII.

*Phases Eclipsis Terrestris ex Typo
per circinum determinare.*

I. **S**ummæ Eclipsis momentum dat punctum M con-
cursus Orbitæ cum suo axe (16. hujus) quod ex
Orbita in horas divisa notum est. Si centro M radio pe-
numbrae circulus describatur, is erit phasis summæ Ecli-
psis. Si is circulus totus cadit intra Discum, ut in figura
16, contingit totalis immersio; sin minus ut in figura
17, non contingit. Pariter si punctum M est intra Dis-
cum, cum nempe latitudo Lunæ non superat radium
Disci; centrum penumbrae Terram ingreditur, & ali-
cubi Sol centraliter occultabitur: contra si M sit extra.
Momenta initii, & finis Eclipsis Terræ dant puncta N ,
& Q , nempe N initium, Q finem, ambo nota ex ho-
ris Orbitæ: & Tempus ab initio ad finem usque dat to-
tam durationem. Si omnia diligenter descripta sint,
necessariò NM æqualis est MQ : nam ductis TN , TQ ,
ex constructione æqualibus, anguli TNM , TQM
(5. 1. Euclid.) æquales sunt; item anguli ad M recti æ-
quales: ergo (26. 1. Euclid.) MN , MQ æquales.
Hinc momentum mediæ, & summæ Eclipsis idem est. Si-
militer si petantur momenta totalis immersionis, & initii
emersionis, abscindatur in radio Disci radius penum-
brae: intervallo residui ex centro T notentur in Orbita pun-
cta CD , eritque C momentum totalis immersionis, D
initium emersionis, CD tempus moræ umbræ totalis in
Terra, quod similiter patet dividi bifariam in M . Pun-
cta, ubi Orbita utrinque secat perimetrum Disci, sunt
momenta, quibus centrum penumbrae ad plagam Occi-
dentalem Terram intrat, ad Orientalem deferit. Puncta
 I , & F , ubi rectæ TN , TQ eundem perimetrum secant,
sunt loca, in quibus penumbra primò Terram mordet in
 I , ultimò deferit in F , nempe in I primò videtur Ecli-
psis, in F ultimo videri desinit.

Figura eadem.

Quantitas summæ Eclipsis habetur, si axis Orbitæ secetur in partes æquales, qualium radius penumbrae habet 6 inchoando à puncto *O*, si ipsum versùs sit Lunæ latitudo, aliàs ab opposito. Hæc divisio continuanda, donec totam penumbrae in terra diametrum transcendat. Limes penumbrae centro *T* propinquior ostendet Eclipsis summæ digitos. In primo habentur dig. 16 & 44' circiter; in secundo dig. 10 7' circiter. Si radium totum *TN* minuas successivè digito 1, 2, 3 &c., quandiu residuum non fiat minus quàm *TM*; & intervallo residui notentur ex *T* utrinque puncta in Orbita, sciatur quo tempore Eclipsis sit 1, 2, 3 &c. digitorum.

An intra penumbram umbra pura terram attingat, sciatur ex datis diametro Solis, & radio penumbrae. Si radius penumbrae major sit diametro Solis, datur umbra pura, cujus latitudo in Terra dupla est excessus ejus radii supra diametrum Solis: ut in primo exemplo excessus est 10"; ergo umbra pura habet 20" decem hinc, decem inde ab Orbita. Si dicta diameter, & radius sint æquales, umbra pura erit unicum punctum, cujus via est ipsa Orbita. Sed si radius penumbrae minor sit diametro Solis, ut in secundo exemplo, non erit in Terra umbra pura. Itaque si ex punctis, in quibus circulus penumbrae in summa Eclipsi secat axem Orbitæ, abscindatur orbitam versùs diameter Solis in partibus millesimis radii Disci accepta; & per extrema segmentorum utrinque ab Orbitæ linea ducantur duæ parallelæ ipsi Orbitæ, Zona his Parallelis inclusa erit in primo casu spatium totum terrestre, quod umbra pura attingit. In secundo casu, ut dictum est, umbra pura est in sola Orbita. In tertio casu alium habet usum ea Zona, ut inferiùs dicetur. Tandem per concursus intra Discum penumbrae cum axe Orbitæ in summa Eclipsi, si ducantur tangentes circulum penumbrae (hæc unica erit, cum umbra non tota immergitur) hæc tangentes determinabunt totum Telluris spatium, quod patitur Eclipsim. In primo exemplo spatium hoc duabus tangentibus clauditur in secundo unica, & peri-

metro Disci ex altera parte. Extra has nihil Eclipsis occurrentis conspici poterit.

Prædicta omnia ex demonstratis satis patent; quia tamen sunt sequentium fundamentum, adhuc breviter ostendo singula. Summam Eclipsim fieri, cum penumbræ centrum est in M , ostensum est in 16. hujus. Quoad initium, & finem patet Eclipsim tunc incipere, cum primò, & absolvi, cum ultimò penumbra Terræ ad extra tangit. Hoc primò fit, cum centrum penumbræ est in I ad partes Occidentales (penumbra enim, & Luna ab Occasu in ortum progreditur) & ultimò, cum in Q ad partes Orientis. Nam TN , TQ sunt summa radiorum Disci, hoc est Terræ, & penumbræ: sunt autem TI , TF radii Terræ: ergo $INFQ$ sunt radii penumbræ; quare circulus penumbræ habens centrum in N , transit per I , & habens in Q transit per F ; ibique (12. 3. Euclid.) Terram tangit ad extra. Similiter TC , TD sunt differentię radii Terræ, & penumbræ, hic CH , DG sunt radii penumbræ; ergo hujus centro appulso ad C , ejus circulus transit per H ; & cum est in D transit per G ; ibique (11. 3. Euclid.) Terram tangunt ad intra. Centro ergo penumbræ posito in C fit totalis immerfio, & cum est in D incipit emerfio. Pariter pro aliis phasibus, cum puncta Orbitæ notentur radio TN multato 1 digito, nempe $\frac{1}{11}$ diametri penumbræ, aut 2, aut 3. &c. patet si è notatis punctis, ut centris circuli penumbræ ducantur, diametri eorum tantam portionem cadere intra Discum, quanta minutus fuit radius TN . Tandem cum centrum penumbræ motu suo constanter in Orbita describat lineam rectam ad axem, Orbitæ normalem; ita puncta extrema diametri illius ad eum axem Parallelæ describunt similes lineas parallelas Orbitæ, ideoque ad axem normales, quales sunt (18. 3. Euclid.) tangentes quas duximus: consequenter sunt partis Terræ Eclipsim patientis termini, cum (17. 3. Euclid.) circulus penumbræ totus intra illas maneat. Rectè ergo omnia determinantur. Quod erat &c.

Om-

Omnia prædicta, paucis exceptis Eclipsi Terræ propriis, etiam Eclipsibus Lunæ sunt communia, ut in 29. hujus declarabitur.

PROPOSITIO XX. PROBL. XIII.

Eclipsis Terrestris phases calculo investigare.

Figura eadem.

Licet prædicta omnia circino satis exactè determinentur, præsertim si typus satis amplius sit, & exactè descriptus, quod arduum non est; tamen calculi trigonometrici methodum hîc omittendam non cenfeo, ex quo clariùs adhuc patebit methodi geometricæ consensio. Breviter tamen expediam, cum in nullo differat à methodo communiter in Lunæ Eclipsibus usurpata.

Itaque in triangulo TLM ad M rectangulo nota est hypotenusa TL nempe data Lunæ latitudo; in primo exemplo $3' 20''$, hoc est $200''$; item notus angulus MTL axium Orbitæ, & Eclipticæ, & inde ejus complementum TLM ; quare inveniri potest LM distantia inter \odot verum, & summam Eclipsim, nec non TM distantia minima centrorum. Forma calculi patet ex adjecto exemplo.

Inventa LM ; fiat, ut motus horarius Lunę in Orbita apparenti $2111''$, $32'''$ ad $60'$, seu $3600'$ unius horę, ita LM $18'' 43'''$ ad quartum. Invenies $32''$ temporis addenda momento \odot veri (in exemplo) ut fiat tempus summæ Eclipsis.

$LT M$	Gr. $5.22' 9''$	sin. $1.8.9711484$
TL	$200''$	— $1.2.3010300$
LM	Quæst. $18 43'''$	$1.2.721784$
Item $LT M$ — sin. comp. $1.9.9980883$		
TL	$200''$	— $1.2.3070100$
TM	$199 12'''$	$1.2.2991183$

Cognito TM , late-
re communi trigonorum
 TNM , TQM , TCM ,
 $TD M$, cum etiam in sin-
gulis notæ sint hypothe-
nusæ TN , TQ , TC , TD ,
invenientur MN , & ei
æqualis MQ , item MC ,
& ei æqualis MD , ut in
apposito exemplo pro in-
veniendi TN . Inventa
autem MN in min. sec.

Rad. Disci	—	3653"
R. Penumb.	—	1941
Summa TN	—	5574
TM	—	199
Summa	—	5773 — 1. 3.7614016
Differ.	—	5375 — 1. 3.73°3785
Summa Log.	—	7.4917801
Semisum. MN	5570' $\frac{1}{2}$	3.7458901

fiat, ut supra, ut motus hor. $21\ 11''\ 32''$, ad $60'$, seu 3600 ,
ita MN ad quartum inveniuntur $9590''$ temporis, quæ
divisa per $3600''$ dant horas $2\ 38'\ 20''$ auferendas à mo-
mento summæ Eclipsis, ut habeatur initii tempus, ad-
dendas pro fine. Earum duplum est tota Eclipsis Terre-
stris duratio hor. $5\ 16'\ 40''$. Similiter procedendum pro
aliis phasibus unicè cavendo, ut loco TN summæ radio-
rum Disci, & penumbæ, assumatur TC eorum diffe-
rentia, vel TN muletata 1 digito, 2 &c. pro phasi, de
qua fit quæstio. In primo exemplo summa Eclipsis in-
venitur h. $6\ 0'\ 32''$, initium h. $3\ 22'\ 12''$, finis h. $8\ 38\ 52''$.
In secundo exemplo LM invenitur $6'\ 22'' \frac{1}{2}$ tem-
poris subtractivi: ergo summa Eclipsis h. $22\ 12'\ 39'' \frac{1}{2}$,
initium h. $19\ 41'\ 8''$, finis h. $24\ 44'\ 11''$, hoc est h. $0\ 44\ 11''$
à merid.. Duratio tota h. $5\ 3'\ 3''$. In propo-
sitis figuris licet satis parvis circino ferè idem invenies,
modo in figura 16, horis Orbitæ addas $\frac{1}{2}$ horam; horæ
enim ibi notatæ sunt pro loco occidentaliore quàm Pe-
kinum Gr. $7\ 30'$, pro inferius faciendis.

Tandem è summa diametrorum Disci, & penumbæ
auferatur TM distantia centrorum. Differentia compa-
retur cum digitis penumbæ: hoc est fiat, ut radius pe-
numbæ in minutis secundis ad 6 digitos, ita dicta diffe-
rentia ad quartum. Is erit quantitas summæ Eclipsis. In
primo exemplo invenitur dig. $16\ 47'$ in figura apparent

16 40' paulò plus . In secundo invenitur dig. 10 9', in figura, licet parva, idem habetur . Ex quibus patet, si Discus amplius fiat, radii scilicet saltem palmaris, & exactè delineetur, nec non mensuræ exactè accipiantur; rarò inventum iri inter calculum, & mensuras discrepantiam, quæ pauca superet secunda, hoc est ullius momenti.

PROPOSITIO XXI. THEOR. VIII.

Si in Cælo Lunæ intelligatur planum secans cylindrum, seu conum potiùs radiorum Solis centralium ad Discum Terræ, huic Disco parallelum, similes in eo, ac in ipso Disco basi hemisphærii illuminati, ideoque, & ejus cylindri, seu cono, projectiones superiùs expositæ fient.

Tab. I. Fig. 18.

Esto Sol S in radio ST per centrum disci $AVBP$. In hoc AB sit axis Æquatoris, TE Eclipticæ, TL latitudo Lunæ, VP Orbita &c. Intelligantur radii Solis centrales ad perimetrum Disci, qui conum rectum efficiant, cujus axis ST . Coni hujus segmentum à Terra ad Coelum Lunæ, quæ distantia comparativè ad Solis distantiam modica admodum est, à cylindro recto (1. huj.) non differt sensibiliter. Secet axis ST planum prædictum in t . Quoniam sectio plani Paralleli ad basim cono, aut cylindri, cum cono aut cylindro circulus est (4. 1. Apoll. vel 1. Sereni) ejus centrum est t .

Demonstratio. Triangulum ASB per axem, ideoque per T , t transiens secat utrumque circulum bifariam; sicut ergo AB est diameter, ita & ab ; sunt autem (16. 11. Euclid.) ad invicem parallelæ, & in eodem plano; ergo cum AB sit in plano meridiani, & B ad boream, A ad Austrum pertineat; ita etiam ab , in qua b & a eodem respectivè spectant. Præterea trigonum STE secat

at circulum superiorem in recta te , quæ proinde ibi est
 apparentia TE axis Eclipticæ, & huic (16. 11. Euclid.)
 parallelæ; cum ergo etiam TB , tb ostensæ sint parallelæ,
 anguli etb , ETB [10. 11. Euclid.] æquales sunt, & proje-
 ctiones axium Æquatoris, & Eclipticæ similes in utroque
 plano. Insuper in triangulo STL propter parallelas
 TL , tl , est (4. 6. Euclid.) ut ST ad TL , ita St ad
 tl , & alternando ut ST ad St , ita TL ad tl : sed ut
 ST , ad St ita TE ad te : ergo (22. 5. Euclid.) ut
 TL ad tl , ita TE ad te , & alternando ut TL ad TE ,
 ita tl ad te : ergo sicut TL est latitudo Lunæ in radio
 TE , ita tl in te . Ad hæc trigonum SVP secatur circu-
 lum superiorem in recta up parallela ipsi VP Orbitæ in
 Disco; consequenter up est apparentia Orbitæ in circu-
 lo superiori, ac necessariò transit per tl . Nam quia pa-
 rallelæ sunt VP , TB ipsis up , tb , anguli VCT , uct
 sunt æquales. Similiter æquales ostensi sunt anguli CTE ,
 cte : ergo TL pars radii TE , latus oppositum angulo
 TCL in triangulo, quem Orbita facit cum axibus TB ,
 TE , (4. 6. Euclid.) similis est parti axis tl , cum quo
 & axe tb orbita up æquiangulum priori facit trian-
 gulum. Ostensa autem est ipsi TL similis tl : ergo up
 per l transit, & quia cum prædictis axibus æquales angu-
 los facit, ac Vp in Disco, Vp , up sunt similiter positæ.
 Eadem viâ concluditur de quibuscvis aliis lineis rectis,
 earumque segmentis, punctis horariis Orbitæ &c. Et
 quia Ellipses per lineas rectas sinuum determinantur,
 etiam de Ellipsis demonstratio concludit. Quod erat
 &c.

Coroll. I. Patet hinc perinde esse, siue concipiantur
 radii Solis centrales ad Terram efformare cylindrum,
 siue conum, qualis reverà est. In utraque enim hypo-
 thesi projectiones similes sunt, & omnia proportionalia;
 consequenter in utroque Disco partium similium mensuræ
 eundem numerum dant.

II. Patet eandem exhiberi speciem spectanti faciem
 Disci Terræ, si descriptæ projectiones essent visibiles, è

Coelo Lunæ, ac spectanti faciem inferiorem prædicti plani in Coelo Lunæ è Terra, & perinde, ac si descripti typi supra oculos elati spectes adversam superficiem. Unicè interest, quod prior spectator videt per Discum ferri penumbram, & hujus centrum per Orbitæ lineam *VP*, loca autem terrestria per Ellipses suæ latitudinis; ac posterior videt per Orbitam *up* ferri centrum ipsius Lunæ, & Solem per Ellipsim latitudinis, in qua ipse Spectator est: Patet enim per easdem lineas videri Solem è Terra, per quas Terra è Sole. Hinc cum centrum penumbræ est in *L*, & locus terrestris, puta in *E*; è Terra apparet centrum Lunæ in *l*, & Sol in *e*: ita de reliquis. Porro ex hoc consequens est ex descripto Terrestris Eclipsis typo, etiam defectus Solaris phases colligi posse, quod mox præstabimus.

III. Patet cur radius Disci, hoc est Terræ, ponatur æqualis parallaxi Lunæ horizontali, quia nempe tantus è Luna apparet, consequenter est Terræ magnitudo respectiva ad Lunam, & penumbram in datâ Solis, & Lunæ à Terra distantia. Et quia minuta quaquaversum, sunt æqualia; ideo cæteræ mensuræ omnes ad partes radii Disci revocandæ, prout æqualis datæ pro tempore parallaxi Lunæ horizontali.

PROPOSITIO XXII. PROBL. XIV.

E Typo Eclipsis Terræ defectus Solaris tempus, & phases omnes pro dato loco terrestris determinare.

*Tab.V., & VI.
Figur.16.17.*

IN Typis propositis, delineatur præterea (8, & 9. hujus) arcus diurnus apparentiæ Paralleli latitudinis dati loci, quæ vel erit (5. hujus) Paralleli Diameter, vel (6. hujus) Ellipsis. Ut in propositis figuris descriptus est arcus diurnus Ellipsis spectantis ad latitudinem Pekinensem, nempe borealem Gr.40. Quia figuræ amplæ non sunt, Ellipses habent sectas tantum in semihoras, ut pro

pro exemplo satis est. In hujusmodi Ellipsi (Coroll. 3.9. hujus) scitur pro quovis dato tempore, ubi sit datus locus Terrestris; & in Orbitâ sectâ in horas &c. scitur ex dictis, item pro dato tempore, locus centri penumbræ: quare sumpto jam Disco pro plano circulari illi parallelo in Cœlo Lunæ, scitur (Coroll. 2. præced.) ubi Solis, ubi Lunæ centrum appareat; hinc sicut in Disco centrorum Terræ, & penumbræ distantiam metiri licet, ita in eodem sub aliâ consideratione distantiam centrorum Solis, & Lunæ, consequenter initium, finem, phases denique omnes, earumque tempus nota facere licere consequens est. Quod ita præstabitur.

I. Deducto circino ad intervallum radii penumbræ *NI*, positaque una cuspide in puncto *M*, aut *L*, invenitur, in figurâ 16, cuspis altera non pervenire ad punctum temporis in Ellipsi cognomen ejus, quod in Orbita spectat ad puncta *M*, aut *L*: ergo in momento σ veri, vel summæ Eclipsis Terræ penumbra nondum attingit datum locum, nempe in exemplo, Pekinum. Dico nondum attingit, nam tempus in Ellipsi cognomen ei, ad quod spectat *M*, aut *L*, est ab his punctis ad plagam orientalem; præteriisset, si esset ad Occidentalem, ut in secundo exemplo. Quare in priore casu defectus Solis Pekini nondum cœpit, in posteriore finitus jam est. Itaque promoveatur circinus in Orbitâ ad partes dati loci, donec inveniatur distantia centri penumbræ à dato loco æqualis radio penumbræ nempe ubi circini cuspide unâ stante in aliqua horâ Orbitæ, altera præcisè attingit cognominem in Ellipsi. In primo exemplo promovendo circinum in Orbitâ usque ad horam 6 54' 30", quâ Pekini in datâ Solis declinatione Sol occidit, distantia illa invenitur semper major radio penumbræ. Ergo Occidente Sole penumbra Pekinum nondum attingit; consequenter ea Eclipsis Pekini est inconspicua. Hinc nota in propositâ figurâ numeros horarum Orbitæ adscriptos non esse earum, quæ Pekino conveniunt, sed loco occidentaliori Gr. 7 30'; propter rationem, de

Fig. 16.

qua mox. Itaque pro iis, quæ dixi horas illas mente auge 30', hoc est in h.V. 30" intellige h.VI. In VI. intellige VI. 30' &c. Proponatur jam locus Pekino occidentalius Gr. 7 30', in quo nempe in momento σ veri, quo Pekini numeratur h.VI. numeretur h.5. $\frac{1}{2}$; & pro hoc sunt horæ adscriptæ Orbitæ in figurâ. Pro hoc loco invenitur dicta distantia in hor. 6 28': horâ ergo 6 28' Sol ibi incipit deficere, nempe apparet Lunæ cum Sole contactus. Promoveatur ulterius circinus in eadem Orbita, donec iterum inveniatur distantia centri penumbrae à dato loco æqualis radio penumbrae; & scietur momentum, quo penumbra eum locum deserit, nempe deliqui Solaris finis. Tandem inter puncta initii, & finis inventa, quærat circino quænam puncta temporis cognomina in Orbitâ, & Ellipsi minimè omnium à se invicem distent & ipsa erunt momentum summæ Eclipsis, sive defectus Solaris in dato loco, quod rarè admodum idem erit cum momento mediæ Eclipsis; hoc est tempus ab initio defectus usque ad momentum summi, plerumque temporì à summo ad finem non erit æquale. Cum enim Orbita non se habeat æquabiliter ad Parallelorum apparentias; ita accessus, & recessus centri penumbrae ab illis, hoc est Lunæ à Sole, vix uniformis esse poterit. Ita in figura 17, initium defectus Solis Pekini fit Oct. d. 15, h. 19 44' 0" a meridie. Summa Eclipsis h. 21 1' 0" finis hor. 22 11' 0". Hinc Duratio tota hor. 2. 27', & semiduratio hor. 1 13' 30", quæ addita initio dat mediam Eclipsim hor. 20. 57' 30". Præcedit ergo Eclipsis media summam 3' 30" temporis: & ab initio ad summam sunt hor. 1 17. à summa ad finem hor. 1 10.

Fig. 17.

Fig. 16.

At in figura 17, cum post horam 6 28', usque ad 6. 54' 30", quo in posito loco Sol occidit, uempe in puncto S, distantia semper inveniatur minor radio penumbrae, indicio est, ibi finem Eclipsis contingere post Solis occasum, ideoque inconspicuum, & Solem occidere cum defectu. An autem occasus Solis contingat ante an post summam Eclipsim, hoc est an occidat Sol in emer-

emersione an in immersione ita scietur. Demittatur ex *S* puncto occasus Solis ad Orbitam normalis *Se*. Hæc si incidat in momentum occasus in Orbita, Sol occidit ipso momento summæ Eclipsæ (præscindendo a refractione); si cadat in punctum temporis ante occasum, summa Eclipsæ fiet supra horizontem, & Sol occidit in emersione; si in tempus post occasum, ut in exemplo cadit in hor. 6. 59' circiter, post occasum Solis 4' $\frac{1}{2}$ circiter, Sol occidit in immersione ante summam Eclipsim. Hæc proportionaliter intelligenda de Sole oriente cum defectu; nempe oriatur deficiens in immersione, si oriatur ante summam Eclipsim, in emersione, si post.

Quantitas summi defectus, ut etiam ejus, cum quo Sol oritur, aut occidit in Eclipsi horizontali, sic invenitur. Distantia centri penumbrae a dato loco in datâ phasi abscindatur è radio penumbrae: residui quantitas nota fiat in partibus radii Disci millesimis; quod fiet statim per scalam geometricam. In iisdem partibus fiat similiter nota Solis diameter apparens: tum fiat, ut diameter Solis in hujusmodi partibus ad 12 digitos, velut semissis earum partium, nempe Solis radius ad digitos 6, ita partes prædicti residui ad quartum; is erit quantitas quæsitæ defectus; eritque is Australis, si datus locus sit in Typo Borealiore centro penumbrae, aut contra, quod plerumque ipsa Typi inspectio suggeret. Porro quantitas in ortu, vel occasu, sic reperta ea est, quæ apparet seclusâ refractione: at quia hæc ortum accelerat, occasum retardat, in occasu apparebit nonnihil major in immersione, minor in emersione; e contrario in ortu. Quanquam eadem refractione plerumque prohibet ne phasæ horizontales exactè observari possint.

Simili artificio inveniuntur phasæ aliæ quæcumque, ut pro singulis quadrantibus horarum &c. Quod si libet etiam prænotare, quando deliquium futurum sit datæ quantitatis infra summam, puta 1, 2, 3 &c. digitorum tam in immersione, quam in emersione; se-

ce-

cetur tota Solis diameter in 12 partes æquales, tum radio penumbrae multato $\frac{1}{11}$ diametri Solaris quarantur, ut supra, duo puncta in Orbita post initium Eclipsis Solaris unum, alterum ante finem, inter quæ & momentum respectivè cognomen in Parallelo, hoc est datum locum, intercedat ea distantia exactè; & in iis punctis defectus erit 1 digiti. Radio penumbrae multato $\frac{2}{11}$ diametri Solaris, invenes tempus defectus 2 digitorum, & ita in reliquis: poteritque inventarum phasium, earumque temporis digeri catalogus. Cæterum phasis cujusque quantitas etiam sine calculo haberi satis exactè potest. Nam notata Solis diametro in axe Orbitæ a puncto, ubi cum fecat penumbra summæ Eclipsis Terrestris ad partes Paralleli dati loci, ac divisa in 12 partes æquales nempe 12 digitos serie orbitam versus procedente, & horum singulis in 6, aut 10 partes æquales subjectis, si e puncto Ellipsis, ubi apparet datus locus in datâ phasi ducatur linea occulta Parallela Orbitæ, vel distantia centri penumbrae à dato loco, applicetur diametro Solis in axe Orbitæ, posito circino in puncto *M*, illa parallela vel cuspis circini altera ostendet defectus quæsitus digitos, & minuta dena vel sena: intermedia autem, si occurrant, facilè æstimari poterunt absque errore alicujus momenti. Circa summam Eclipsim illud præterea notandum: si occurrat centrum penumbrae, ac datum locum in idem punctum coire, nempe si punctum concursus Orbitæ cum Parallelo loci, utrobique pertineat ad idem momentum in dato loco, ibi summam Eclipsim centralem esse, & quidem totalem cum morâ, si penumbrae radius major sit, quam Solis diameter; sine morâ, si æqualis; at si minor, Eclipsis erit centralis annularis. In totali cum morâ, summus defectus paulo major 12 digitis; in totali sine mora, præcisè 12 digitorum. In annularibus, cum nullibi Sol totus tegatur, reipsa ubique minor est 12 digitis: haberi tamen potest pro 12 digitis in limitibus Zonæ utrinque ab Orbitâ, de qua in 19. hujus: ubi nem-

nempe apparet contactus ad intra Lunæ, & Solis, borealis quidem in limite boreali, australis in australi; & tunc digiti æstinantur ex parte contactui diametraliter oppositâ. Locis omnibus extra eam Zonam, sicut extra Zonam umbræ puræ defectus est partialis minor 12 digitis. In totali cum morâ, quantitas moræ definitur ex tempore summae Eclipsis, & eo, quo distantia centri penumbræ à dato loco ante, & post summum defectum, invenitur æqualis differentia radii penumbræ à diametro Solis; Similiterque definitur quamdiu defectus spectandus sit annularis &c.

Prædicta omnia ex demonstratis clara sunt: pauca ergo addo pro demonstratione.

I. Cum radius penumbræ attingit primò, & ultimò aliquem locum Terrestrem, incidit in hunc radius per apparentem contactum exteriorem Solis & Lunæ; quippe hujusmodi radii circumscribunt totam penumbram; ergo cum ex dato loco per eundem radium, videantur limbi convergentes Solis, & Lunæ; clarum est ibi tunc videri eum contactum; consequenter est initium, aut finis defectûs. Porro ille radius tunc in locum incidit, cum à centro penumbræ distat hujus radio: nam in majori distantia umbra ad eum non pervenit, in minori locus intra penumbram est, non in ipso limite. Est autem radius penumbræ æqualis radiis apparentibus Solis, & Lunæ simul; consequenter in Disco per Cælum Lunare tunc distantia centrorum Solis & Lunæ apparet æqualis, seu similis radio penumbræ: Ergo utravis utaris in Disco, initium & finem Eclipsium ritè determinabis.

II. Penumbra in Disco Terræ pari, vel proportionali passu procedit (21. huj.) ac Luna in plano Parallelo Disco Terræ in Cœlo Lunari: quantum ergo penumbræ in datum locum immergitur, tantumdem Luna in Solem videbitur immergi. Pars ergo Solis tecta proportionalis est parti penumbræ immerse. Sed pars tecta subducta è summa radiorum Solis, & Lunæ relinquit distantiam

stantiam visam centrorum, & pars penumbrae immersa subducta è radio penumbrae relinquit distantiam centri penumbrae à dato loco proportionalem distantiae visae centrorum; ergo utramlibet distantiam subtrahas è Solis diametro, semper relinquitur pars Solis tecta, nempe phasis quantitas. Cum ergo partes (15.5. Euclid.) sint ut tota, si fiat ut tota diameter Solis ad 12, vel semidiameter ad 6, ita data pars ad quartum, patet hunc esse defectus quantitatem.

III. Summa Eclipsis Solis tum est in loco quopiam, cum ibi minima apparet dictorum centrorum Solis, & Lunae distantia: sed horum distantia similis est distantiae centri penumbrae à dato loco: ergo praxis quoad omnia rectè procedit. Quod erat ostendendum.

Coroll. I. Ex dictis patet cur, & quomodo fiat defectum Solis alicubi contingere integrè ante, vel post momentum ϕ veri. Nam radius penumbrae semper multo minor est radio Disci. Quare cum centrum penumbrae est in *L* saepius remanent utrinque partes Terrae tam occidentales, quas penumbra jam reliquit, quam orientales, quas nondum attingit, attinget autem postea: quod inspectione propositorum Typorum patet.

II. Patet, licet dati loci Parallelus sit intra partem Disci obumbrandam non inde certò colligi in dato loco spectatum iri defectum Solis: fieri enim potest, ut sit in primo Exemplo, loco Pekinensi, distantiam centri penumbrae a dato loco, quamdiu est in arcu diurno Paralleli, semper esse majorem ejus radio: sed spectari poterit in locis sub eodem Parallelo occidentalioribus. Pariter si locus sit in parte ejus Paralleli occidentali extra limites penumbrae, & quando ad limitem pervenit centrum penumbrae, ab eo puncto jam recessit ultra ejus radium, Eclipsis erit inconspicua: licet enim Eclipsis tota sit supra horizontem ejus loci; tamen Parallaxis Lunae ejus conspectum eripit.

III. Patet cur defectuum horizontalium duratio, ceteris paribus, sit omnium brevissima, in meridie lon-

longissima, intermediæ eo prolixiores; quo propius absunt a meridie. Nam apparentiæ horarum (9. huj.) in Parallelis distant à meridiano quantitate Sinus graduum in quovis Parallelo convenientis datis horis; consequenter distant ab invicem talium sinuum differentiâ. At differentiæ sinuum (ut patet ex eorum canone) eo minores sunt, quo majores sunt arcus, quorum sinus comparantur. Hinc horæ in Disco eo minus invicem distant, quò remotiores à meridie. Itaque locus juxta eas horas optice promotus ab occasu in ortum eo lentius promovetur, quo remotior apparet à meridiano: Penumbra verò æquabili motu eodem tendit: hinc celerius relinquit locum segnius, quam ocyus sequentem. Dixi *cæteris paribus*: Nam Eclipsis circa meridiem, valde modica brevior esse poterit Eclipsi horizontali satis magnâ.

IV. Patet, motum penumbrae, licet in Disco appareat æquabilis, in superficie sphericâ tamen telluris esse inæqualem, non solum secundum totam, sed etiam diversimodè in diversis suis partibus, prout obliquius, aut rectius tota, aut hæc vel illa pars globum Terrestrum ferit. Hinc circa medium lentius incedit, quam circa limites Disci. Imò in eâ superficie neque exactè circularis est; necesse enim est partes obliquius incedentes magis extendi, & variè deformari, licet respectu Disci perfectus circulus appareat; ut patet de umbrâ Terræ in Lunæ Eclipsibus. Sic vides in *figura 17*, semissem penumbrae non multum infra Æquatorem (si duceretur hujus Ellipsis) protendi, & centrum esse circiter in Parallelo latitudinis Gr. 30; ad partes verò oppositas, usque ad limitem Disci obumbrare fere 60 gradus, & adhuc superabundare extra Terram 2 circiter penumbrae digitos.

Fig. 17.

V. Intelligitur quo modo parallaxes immutent optice Lunæ tum longitudinem, tum latitudinem. Nam cum vera Luminarium conjunctio fiat in *L*, nihilominus in assumpto loco pro primo exemplo, videretur fieri in *e*,
 K hora

74. SCIENT. ECLIPS. PARS I.

hora ferè 1 cum 30' post veram. In secundo exemplo videtur fieri hora 21 1', nempe hora 1 18' ante veram. Pariter si ducatur Ecliptica normalis ad *TE* per *T*, in primo exemplo invenietur Ω in hora 6 45' ferè; ideoque hora 7. latitudo Lunæ Australis vix erit 1'; apparet tamen æqualis ferè rectæ *Se* circiter 26'. In secundo exemplo latitudo Lunæ borealis in summo defectu, hoc est ϕ viso, æqualis est rectæ à puncto Orbitæ hor. 21 1' ad Eclipticæ diametrum, apparet autem æqualis minime distantia centri penumbrae a Pekino, quæ est multo minor. Hinc per regressum Parallaxes longitudinis, & latitudinis patefieri possunt..

S C H O L I U M.

In propositione, majoris facilitatis gratiâ, assumptus est radius penumbrae quasi constans toto Eclipsis tempore. At reverà talis non est, eo quod diameter Lunæ: apparens nonnihil augeatur prout magis, ac magis supra horizontem assurgit, quippe sit successivè propior oculo spectatoris posito in superficie Terræ sphericâ, non in plano Disci: habet autem Radius Terræ rationem sensibilem ad distantiam Lunæ. Hinc fieri potest defectum circa medium Hemisphærii illuminati spectari totalem, qui aliàs futurus esset annularis; & cum morâ, qui sine morâ. Discrimen tamen magnum esse non potest. Si rigidissimè lubet procedere, ejus variationis ratio habeatur. Tabulas invenies apud Astronomos, vel ex te ipso quæras.

Cæterum per se patet, ad præstanda quæ in propositione dicta sunt pro uno, aut altero loco, opus non esse integrum Typum describere, sed satis esse eam partem, quæ ex circumstantiis præterpropter judicatur necessaria, quod usus facillè ostendet. Ita in figura 16; Sector *ETF* cum parte Ellipsis ab hora 6 usque ad occasum, in figura 20 Sector *ETI* cum parte Ellipsis ab ortu Solis usque ad horam 23, sufficiunt.

Et.

Fig. 16.

Fig. 17.

Et ita in eodem folio poterit major assumi Radius Disci, ex quo defectus phases distinctiores apparebunt, & subtilius determinari poterunt.

PROPOSITIO XXIII. PROBL. XV.

Defectus Solaris phases quasumque ex eodem Typo in schemate exhibere.

DUcatur utcumque recta DE . Sumantur è scalâ geometricâ quotcumque partes, pro schematis petita amplitudine, puta 600, quæ supponantur pro radio penumbrae, illisque abscindatur æquale segmentum DF . Sumantur in eadem ratione particulae convenientes semidiametro Solis, nempe fiat, ut Radius penumbrae in minutis secundis ad 600: ita Semidiameter Solis item in minutis secundis ad quartum. Is erit numerus partium ex eadem scalâ sumendus. Cum æquali abscissa DS , centro S , radio DS Discus Solis describatur. SF erit Radius apparens Lunæ; $DS E$ exhibet verticalem Solis. In Typo [fig. 16.] ducantur rectæ è centro T ad puncta Paralleli, in quibus è dato loco spectantur phases exhibendæ, ut in primo exemplo ad punctum Cinitii Eclipsis, & S punctum occasus Solis. Item agatur ea ad centrum penumbrae initio Eclipsis, & S ☾ ad horam occasus in Orbita, nempe idem centrum in Solis occasu. In centro Disci Solis S fiat a verticali DF ad sinistram ad partes Radii Solis angulus ESL æqualis angulo Tca in Disco Terræ; fiatque SL æqualis radio penumbrae DF . Centro L radio Lunæ SF describatur circulus, qui tanget, ut patet, Discum Solis, & descripta erit phasis initii Eclipsis. Ad easdem partes fiat angulus ESD æqualis angulo TSC in Disco Terræ: fiatque, ut ea in Disco Terræ ad SC in eodem, ita DF in schemate ad quartum; cui abscindatur æqualis $S\text{☾}$ in schemate. Centro Lunæ, eodem

Tab. VI. Fig. 19.

Fig. 16.

Fig. 16.

dem radio SF circulus, vel ejus arcus quantus cadit intra Discum Solis. Commune utriusque circuli segmentum est phasis quæsitæ, qualis in oculos incurret. In Disco Terræ [figura 16.] centro S . Radio Solis in partibus radii Disci describatur Discus Solis, & centro C Radio Lunæ hujus circulus. Quoniam SC minor est radio penumbrae, hoc est summâ Radiorum Solis, & Lunæ, necessariò se ii circuli secabunt: ut etiam in schemate, quoniam SC minor est, quàm SL Radius penumbrae.

Demonstratio. Sol occidens in Disco in Lunæ Cœlo, è dato loco [21. huj.] apparet in S , & Luna in C . Item [Coroll. 4. 9. hujus] TS est verticalis Solis occidentis in dato loco, ideoque Nadir Solis ad partes T , & angulus verticalis TS cum recta SC per centra Solis, & Lunæ vergit ad partes Nadir Solis a verticali TS ad finistram, ut patebit, si typum elevatum supra oculos & adversâ facie spectes: Ergo Luminaria apparent juxta hanc speciem in Disco Terræ exhibitam. Sed hoc ipsum est, quod expressimus in schemate, ut patet: exhibuimus ergo datum phasim. Similis est praxis, & demonstratio pro cæteris. Quod erat &c.

Coroll. Quoniam DE verticalis est Solis occidentis, HSO ad eum normalis est loci horizon: Ergo pars Solis eclipsata priùs occidit, quàm centrum Solis: nempe Luna priùs horizontem subit, quàm Sol. Et hinc etiam patet Solem occidere ante summam Eclipsim in eo loco, nempe ante \odot visum: nam post hoc Luna apparens Sole orientior occideret post Solem.

S: C H: O L I U M.

Tab. VI. Fig. 20. Mensuras pro hoc schemate ex ipso Typo desumi posse patet absque ullo calculo. Quia tamen necesse non est, & fortè quandoque minùs commodum esse posset, universaliorẽ praxim schemati, prout libuerit amplo, aut parvo idoneam describendo proponendam censui.

Figu-

Figura 20. exhibet phases secundi exempli ad singulos quadrantes horarum ab initio ad finem Eclipsis Pekini; quæ spectant ad emerfionem arcubus punctatis notantur. In eo schemate mirum videri potest lineam per centrum Lunæ in singulis phasibus non rectam sed curvam admodum prodire, cum tamen ostenderimus in 21. hujus, viam Lunæ etiam in Disco in Cælo Lunari esse rectam lineam saltem ad fensum. Verum datur ratio disparitatis: Nam aliud in descriptione Typi agimus, aliud in schematis. In his enim à projectionibus circulorum in Disco præcindimus & solum Lunam cum Sole compositam exhibemus, qualis intuentibus è dato Terræ loco hîc, & nunc apparebunt. Hinc unicam lineam pro quocumque verticali posui, nec abs re. Cum enim phasès non simul omnes, sed successivè singulæ conspiciantur in eo situ, quem habent respectivè ad verticalem, in quo hîc, & nunc Sol est, quicumque tandem ille sit, cum omnes similiter sint ad horizontem recti; si semel statuatur illa linea in situ verticali, unico intuitu scitur situs cujusque phasis respectivè ad verticalem, in quo continget. Verticalem autem, utpote homini stanti parallelum, oculus etiam non visum discernit, & per suspensum filum cum perpendiculo exactissimè quisque habere potest. At Sol reipsa motu diurno raptus verticales alios, & alios successivè occupat; & cum Eclipticæ, Orbitæque apparentiæ in Disco fixæ sint & constantes, diversos angulos cum diversis verticalibus faciunt. Hinc via Lunæ, quæ in Schemate prodit, non est una simplex ejus positio, sed composita ex plurimis positionibus Orbitæ relativè ad diversos verticales utiqueque diversis. Non ergo mirum, si in flexuosam degeneret.

Est & alia ratio. Sol in Disco Cæli Lunæ aspicienti è Terra non apparet in centro Disci, aut in communi sectione Disci cum Eclipticâ, nisi oculo constituto in axe Disci, aut plano Eclipticæ: & ibi apparet in Ellipsi latitudinis Loci, ut ostendimus in 21. hujus [Corol. 2.] & per

& per eam videtur pergere. Neque enim Sol est in ipso Disci plano, sed ab eo remotissimus est, consequenter ad eum diversas à diversis locis parallaxes patitur, ratione quarum eodem momento in diversissima Disci puncta à diversis spectatoribus refertur, contra quam accidat Lunæ, quæ ei Disco inhaerens, undecumque spectetur, ibi apparet, ubi reipsa est. Motus ergo Solis opticus in Disco est flexuosus, nempe Ellipticus. In schemate unicè Lunam cum Sole comparantes, ponimus Solem tanquam optice immotum; talis enim apparet relativè ad Lunam, cujus motus in consequentia, multo velocior. Hinc flexuositas motus optici Solis in viam Lunæ à Sole opticam refunditur. Hinc etiam fit, ut si in descriptione schematis habeatur ratio mutationis verticalium, hoc est pro singulis phasibus singuli verticales ducantur facientes invicem angulos, quos in Typo, ut factum est in *Figura 21.*, quæ est ejusdem Eclipsis schema, via Lunæ adhuc prodibit curva; multo tamen minùs, sublatà nimirum alterà, eaque potissima flexuositatis causâ. At in hujusmodi schemate, ut habeatur cujusque phasis verus situs, pro singulis statuendus verticaliter proprius verticalis; quo facto singulæ singillatim phases eundem situm habebunt, quem simul, & semel habent in priori schemate. Itaque cum utraque methodus idem præstet, sed prior facilitatem descriptionis, usûsque expeditionem, necnon claritatem majorem habeat, eam alteri præfero.

Ex his autem patet, viam visam Lunæ à Sole non rectam, sed curvam esse, quæ diversos subinde angulos cum Eclipticâ facit. Hoc tamen Typi Ecliptici descriptionem propositam non infirmat, imò confirmat; inde enim illa ipsa visa flexuositas veluti sponte suâ, ac naturaliter se prodit, quæ aliâ viâ ægrè deprehendetur. Hinc in deliquiorum solarium schematis minùs aptè pinguntur Ecliptica, & Orbita Lunæ tanquam lineæ rectæ; cum via visa Lunæ non recta sit, nec in eodem constanter cum Eclipticâ angulo appareat. Hinc etiam fieri

Tab. I. Fig. 21.

fieri cenſeo, quod in calculo ſolarium deſectuum methodo veterum, poſt ſtatutum tandem aliquando permoſto, ac pluries iterato calculo momentum ſummæ Eclipſeos, hoc eſt viſi ☿; dum deinde ex eo quaeritur initium, & finis calculo ſimili ei, quem pro Eclipſi Terræ ſuperius expoſui vix unquam res conſentiat, ſed iterato examine, hoc eſt, moroſi calculi unâ, aut altera repetitione opus ſit; quod non ſolum inde fieri puto, quod tempore ante, & poſt ſumman Eclipſim æqualia plerumque non ſint; ſed potiſſimam ex eo, quod via viſa Lunæ à Sole ut recta aſſumatur in conſtanti ad Eclipticam angulo; quod fallit ..

Nec tamen novæ huic methodo, ut egregiæ, & in hac re meo iudicio percommodæ, plus quis tribuat, quàm par eſt; hinc non omittendum; licet hætenus demonſtrata certa ſint, contingere nihilominus poſſe, & reipſâ non rarò contingere, occurrentem Eclipſim, nec temporî, nec phaſibus præſtitutis reſpondere ad amiſſim, imò quandoque notabiliter admodum aberrare, quaſcumque tandem Aſtronomorum Tabulas adhibeas. Hoc mirum videri non debet: Nam Typi deſcriptio tota pendet ex præſuppoſitis in præparatione, quam in 17 huius præmiſimus .. Iis ſtantibus, Eclipſis, ejuſque phaſes non poſſunt ſenſibiliter ſaltem, aliter accidere, ac è Typo aptè deſcripto eruantur, ut conſtat ex datis demonſtrationibus. Tamen ea præſuppoſita ſunt ex communibus elementis, in quibus plura eſſe hætenus non plenè explorata, nemo Aſtronomorum non fatetur, præcipuè circa Lunam, quam idcirco ſunt qui *Sidus exlex*, & *contumax* appellant. Hinc provenit prænuntiatur Eclipſis à reali abluiſo. Deſectus huiusmodi ex ipſis obſervationum cum calculo diſſonantiis perpetuò conati ſunt, & conantur corrigere celebriores Aſtronomi, mirâ indiſtriâ, & ſagacitate, ac labore perutili illo quidem, & nunquam ſatis laudando; attamen, ut ego cenſeo, etiam numquam exhauriendo. Stat enim illud Eccleſiaſtæ 3. *Mundum tradidit diſputationi eorum,*

rum, ut non inveniatur homo opus Dei à principio usque ad finem.

PROPOSITIO XXIV. PROBL. XVI.

*Defectus Solaris Phases è Typo, seu Disco
Terra per calculum eruere.*

Tab. VI. Fig. 21.

PRaxis vigesimæ secundæ hujus, si accuratè in omnibus procedatur, ita exacta est, ut exactius (quid nî & æquè exactum?) intricatiori licèt, & longiori per parallaxium calculum circuitu ab ulla Veterum methodo non liceat expectare. Nihilominus ad complementum, & confirmationem expositæ doctrinæ praxim trigonometricam non cenſeo reticendam. In propositione 22, in loco cujus longitudo minor Pekinenſi Grad. 7 30', invenimus initium defectus Solaris hor. 6 28' à meridie. Propositum ſit examinare, an juxta præſuppoſita ita reverà ſit; hoc eſt an recta ea æqualis reverà ſit radio penumbrae, nempe ſummæ radiorum Solis, & Lunæ. Jungantur *Ta*, *Te*, *ca*. In 20. hujus inventa fuit *TM* 199", & in partibus milleſimis Radii Diſci invenitur 54 4' 7" 3" rotundè 54. 5' punctum *M* ſpectare invenimus ad horas 5 30' 32", quæ ſubducta ex hor. 6 28', relinquunt 57' 28" hoc eſt 3448": ſi fiat ut hora 1, nempe 3600", ad 578. 1' motum horarium in Orbita in partibus milleſimis Radii Diſci, ita 3448" ad quartum, invenitur *MA* ſimilium partium 553. 7'. Itaque in triangulo *MaT* ad *M* rectangulo nota ſunt duo latera *TM*, *Ma*; pateſieri ergo poteſt angulus *MTa*, & hypothenuſa *Ta*, ut in adjecto exemplo numero primo.

Invento angulo *MTa*, hoc eſt *OTa*, addere vel ſubtrahere angulum *OTB*, ut notus fiat angulus *BTa*. Ipſe Typus oſtendit addendus, demendusne ſit. In exemplo, quia *OTa* major eſt *BTa*, ſubtrahendus eſt, addendus eſſet in caſu oppoſito. Angulus

au-

autem OTB ex præparatione notus est; est enim vel summa, vel differentia anguli axium Æquatoris , & Eclipticæ cum angulo axium Eclipticæ , & Orbitæ ; quod item ex ipsa Typi inspectione patet. Quærendus jam angulus BTe , quem *Hi-*

rius vocat *angulum parallacticum*, nempe dati loci à Sole, vilis, consequenter (Coroll. 2. 21. hujus) Solis è dato loco visi respectivé ad Discum in Cælo Lunæ; alii vocant *angulum positionis*, nempe loci, aut Solis,

ut supra. Præterea quærenda Tc : sic enim subtracto BTe , ex BTa , invento numero primo, erunt in triangulo Tca nota duo latera Ta , Tc unâ cum angulo intercepto cTa , ex quibus nota fiet quæsita ca , quam in exemplo oportet æqualem esse Radio datæ penumbrae. Tc est (Coroll. 4. nonæ hujus) sinus distantia Solis à vertice dati loci; quare ex constructione pro demonstratione ejus Corollarii notus fieri potest: inventi enim arcus sinus è canone sinuum eruetur. Pariter productâ Tc usque ad perimetrum Disci metiri possumus per Scalam chordarum arcum Disci inter TB , Tc , hoc est angulum BTe ; ex quibus, ut dictum est, per resolutionem trianguli Tca innotescat Ca . Sed hic volumus praxim integrè trigonometricam. Itaque super TB intelligatur quadrans Meridiani, & super Tc arcus verticalis Solis per C transiens. Hi ambo arcus cum per centrum Solis transeant ad Disci planum recti sunt: quare (Coroll. post 21. 2. Theod.), arcus Disci rectis TB , Tc comprehensus

L

est

I	
Ma 553, 7.	L 2.7432745
$T'M$ 54 47 Comp. ad 10, 0 & c.	N 2638426
MTA . G. 84 22' 54"	$T.L$ 11.0071171
Item Ma —————	L 2.7432745
MTA 84 22' 54" Comp. Sin. ad 10.0 & c.	20913
Ta 556, 37	L 2.7453658
ETB Gr. 17 43' 52"	MTa Gr. 84 22' 54"
ETO subt. 5 22 9	Subt. OTB 12 21 43
OTB Gr. 12 21 43	BTa G. 72 1 11

est mensura anguli illius verticalis cum Meridiano, quæ æqualis est angulo $B T c$, cujus idem arcus Disci est mensura. Polus Mundi in Disco esto P . Arcus Meridiani inter Solem, & Polum est distantia Solis à Polo, nempe complementum datæ declinationis, cujus sinus TP : eritque arcus ille complementum quadrante minus, si declinatio sit ad Polum conspicuum; majus, si ad non conspicuum; tunc enim Polus est ultra B in facie Disci inferiori. Intelligatur ex P polo ad locum c arcus circuli maximi $P c$, qui erit ejus horæ; quæ in c numeratur nempe in exemplo h. 6.

28', consequenter ejus angulus cum Meridiano nempe $TP c$ gr. 97. 0'. Pariter arcus $P c$ notus est, nempe complementum datæ latitudinis loci c in exemplo gr. 50. Itaque in triangulo Sphærico, quod dicti tres arcus formant (specimen ejus intra propositam Figuram decimam sextam exhibitum habes) ex notis lateribus TP , PC , & angulo comprehenso TPC per trigonometriam innotescet tum angulus PTC , tum basis TC , consequenter ex canone sinuum ejus sinus, nempe in Disco recta TC . His habitis notus sit an-

2	
$TP c$. Gr. 97 0' —	sin. co. l. 9.0858945
$P c$. Gr. 50 0' —	t l. 10.0761865
Invent. $L P X$. 8 15' 50" —	t l. 9.1620810
Adde TP . 74 19 20	
TX . Gr. 82 35 10	
$P X$ Gr. 8 15' 50" —	sin. l. 9.1575550
TPC . 97 0' —	t l. 10.9108561
TX 82 35' 10" Comp. sin.	36460
Quæf. $P T c$ 49 43' 54" $\frac{1}{2}$ —	t l. 10.0710571
Item $P c$. Gr. 50. —	sin. l. 9.8842540
$TP c$ Gr. 97. —	sin. l. 9.9967507
$P T c$ Gr. 49 43' 53" $\frac{1}{2}$ Comp. &c.	1174618
$T c$ Quæf. Gr. 85 11' 16" sin. l.	9.9984665
Quorum sinus —	996, 475
Jam	
$B T a$ num. 1. inventus. Gr. 72 1' 11"	
Subtrah. $B T c$. num. 2. inv. 49 43' 53" $\frac{1}{2}$	
Quæf. $c T a$ Grad. —	22 17 17 $\frac{1}{2}$

gu-

INTEGRÆ CONSTR. ASTR. PROP. XXIV. 83

gulus TCa , ut supra dictum est. Progressus calculi totus in exemplo secundo adjecto apparet.

Tandem in triangulo rectilineo Tca notum est ex numeri primi calculo latus Ta , ex numero secundo latus Tc , & angulus interceptus CTa . Itaque juxta calculum numeri tertii invenitur ca in partibus radii Disci 526, 04. Radius penumbrae in iisdem partibus est 525, 86. Differentia est, 18, qua ca superat radium penumbrae, nempe $\frac{18}{52586}$ hoc est $\frac{1}{1191}$ radii penumbrae, qui excessus indicat initium Eclipsis contingere 1", ad summum 2" post horam 6 28', quod patet esse insensibile, & nullius momenti.

Ang. cTa 22° 17' 15" $\frac{1}{2}$	Tc . 996. 475	3
Reliqui	Ta . 556. 37.	
Anguli 157° 42' 42" $\frac{1}{2}$	Sum. 1552. 845 Comp. &c. 6.8088719	
Semif. 78 51 21 $\frac{1}{2}$	Diff. 440. 105 ——— l. 2.6436007	
	Semif. Ang. 78 51 21	l. 10.7055398
	Invent. I. G. 55 12 2	l. 10.1580124
	Subtr. ex 78 51 21	
	Tca 23 59 19	
	Ta . 556 37 ——— l. 2.7453658	
	cTa 22 17 17 — sin. l. 9.5790460	
	Tca ——— Comp. sin. l. 3.966010	
	Ca . 526, 04	2.7210128
	R. penumb. 525, 86	
	Differ. 000. 18	

Eodem progressu supputantur ceteræ Phases. At pro phasibus horizontalibus calculus brevior est; nam recta TS , utpote sinus totus nota jam est; itaque in secundâ formula satis est invenire angulum PTS . Pariter si locus sit in hora sexta, quia tunc angulus TPc rectus, angulus PTc unica analogiâ invenitur, nempe addendo l. sin. lateris TP , & T. l. lateris Pc . Summa multiplicata i sinistima est tl. complementi anguli quæsiti PTc .

L 2

Item

Item additis II. sin. complementorum TP , Pc , nempe LL sin. datarum declinationis Solis, & latitudinis Loci, summa mûltata, ut prius, erit Log. sin. hypotenusæ Tc , è canone excerpendus &c. Quæ omnia ex Trigonometria manifesta sunt.

In proposito exemplo factò calculo pro momento occasus invenitur SC 441. 25, quæ subtracta ex radio penumbrae dat differentiam. Fiat ut diameter Solis 523, 13 ad 12 dig: ita 84, 61. ad quartum. Invenitur defectus Solis occidentis dig. 1. 56' $\frac{1}{4}$. Ex dato ergo Typo &c. Quod erat &c.

Coroll. I. In formulâ tertiâ inventus est angulus Tca , cujus plagam Typus ostendit. Hinc potest delineari phasium schema, ut in propositione præcedenti. Pariter, quia in formulâ secundâ notus factus est arcus, cujus sinus Tc , distantia nempe Solis à vertice loci c ; consequenter scitur ejus complementum, quod est Solis altitudo supra loci horizontem; hinc hæc è Disco pro quavis datâ horâ &c. dati loci calculo inveniri potest. In exemplo est Gr. 448' 44".

II. Quoniam totius calculi progressus ab apparentiis Parallelorum non pendet, ut patet: etiam his non, descriptis in Disco inveniri potest pro datâ horâ loci notæ latitudinis apparentia in Disco, & inde phasis Eclipsis pro eodem tempore. Nam primò quærendus angulus PTc , & sinus Tc , ut in formula secunda; quæ à datis in primâ, quoad hoc, non pendet. Tum in centro Disci T ad partes à meridiana datæ horæ convenientes, fiat angulus PTc , ac Tc æquales inventis; eritque c apparentia dati loci pro dato tempore. His datis invenietur, ut in propositione ca &c. At descripta prius apparentia paralleli; cum phasis circino nota fieri possit aut veræ, aut veræ quàm proxima, rem esse longè expeditiorem, per se manifestum est; siquidem quærat tempus datæ alicujus Phasis, puta summæ Eclipsis, 1, 2 &c. digitorum.

III. Quia prædicta omnia loco peculiari determinato affixa non sunt, & Discus exhibet hemisphærium, quod-

quodvis Terreſtre, quod toto tempore Eclipſis ſucceſſivè illuminatur; conſequens eſt Typum eſſe univerſalem, hoc eſt exhibentem totam Telluris obſcurationem in occurrente Eclipſi: & inde exhiberi poſſe Tabulam Geographicam, in quâ totus penumbrae in Terrâ progreſſus, & inde phaſes Eclipſis Solaris pro quovis loco unico intuitu cognosci poſſint. Hujusmodi tabulas in ſuis accuratiſſimis Ephemeridibus primus (quantùm ſcio) exhibuit vir eximius Cl. *Euſtachius Manfredi*. Descriptionis praxim (ut & uſum) integram in ſequentibus expono, tam geometricam, quàm trigonometricam, ubi utraque locum habet: ut ſi contingat hîc, & nunc non eſſe ad manus neceſſaria ad unam praxim, integrum ſit per alteram expedire propoſitum.

PROPOSITIO XXV. PROBL. XVII.

In Diſco Terræ circulos horarios, & digitos defectus Solaris delineare.

I. **D**Ucantur (8, & 9. hujus) in Diſco Paralleli quinnûm, aut ſaltem denûm grad. latitudinis, quot ſive integrè, ſive partialiter cadunt intra portionem Diſci, ſeu Terræ obumbrandam, quam determinaviſmus in decimanona hujus; qui Paralleli ſecti ſint in horas. Per puncta ſingulorum Parallelorum cognomina ductæ diligenter curvæ (Coroll. 2.9. hujus) erunt in Diſco Circuli horarum. Ad intentum finem ſatis ſunt horæ integræ; patet tamen ſimiliter pingi poſſe ſemihoras quadrantes &c., ſi libeat. Specialis difficultas eſt circa quædam horarum puncta in perimetro Diſci, quæ per ſola puncta Ellipſium exactè plerumque determinari non poſſunt, vel quod illæ horæ Diſci perimetrum obliquiſſimè ſecent, vel quod Ellipſes ultra grad. 70. latitudinis, utpote ſapius anguſtiores non facilè ſit exactiſſimè dividere, cum tamen illæ horæ uſque ad Diſci perimetrum cadentes intra umbram ſint producendæ, ut in *figura* 23. Hujusmodi puncta in perimetro ſpectant ad latitudines,

in

Tab. VII. Fig.

22.

Tab. VIII. Fig.

23.

in quibus Sol in data declinatione illis oritur horis, vel occidit respectivè. Itaque quærendum in data declinatione, in qua latitudine Sol oriatur data horâ, vel occidat; hoc est dato arcu semidiurno, & Solis declinatione, inveniendâ latitudo, cui datus arcus semidiurnus convenit: hac enim cognita, inveniri possunt puncta, in quibus inventæ latitudinis Parallelus Discum fecat, quæ sunt quæsita. Utrique rei (Coroll. 9, & 10 sextæ hujus) satisfaciunt: addam & alteram praxim in propositione sequenti.

II. Abscisso in Orbitæ axe TO utrinque ab Orbita, si hæc intra Discum cadat, vel ad partes T , si extra, Radio dato penumbrae, & ex hujus terminis, vel respectivè termino Orbitam versùs, diametro Solis in partibus radii Disci; secetur diameter tota Solis quadrifariam: singulae partes habebunt ternos digitos. Possunt etiam dividi singuli, sed terai plerumque possunt sufficere. Per singula puncta dividendia agantur rectæ parallelæ ad Orbitam: hæc determinabunt ternos digitos Eclipticos: nam patet earum distantiam ab Orbita esse radium penumbrae vel integram, in limitibus nempe, vel multiplicatam $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ diametri Solis; consequenter loca iis lineis subjecta spectare Solem sub Lunâ latentem, vel $\frac{1}{2}$, vel $\frac{1}{3}$ seu $\frac{1}{4}$ diametri, ex demonstratis in vigesima secunda hujus. Horas ergo, & Digitos &c. Quod erat &c.

PROPOSITIO XXVI. PROBL. XVIII.

Datis declinatione Solis, & arcu semidiurno altitudinem Poli, & inde puncta in perimetro Disci Terræ, ad eam spectantia determinare, & vicissim data Poli altitudine arcum semidiurnum, vel dato puncto in perimetro Disci, ejus latitudinem, & arcum semidiurnum assignare.

Tab. VIII. Fig.
24.

Resolutio Geometrica primæ partis. Ductis utcumque normalibus BD , DE ex D puncto concursus, Ra-

Radio quovis describatur quadrans FB , in quo abscindatur FE differentia dati arcûs semidiurni a quadrante, ideoque in gradus resolvenda, si in horis detur. Jungatur EO parallela ipsi DF , quæ occurrat BD in O . Fiat angulus DB Cæqualis datæ declinationi, & ejus latus BC concurrat cum FD producta in C . Ex C per O jungatur recta CO , dico angulum DCO esse quæsitam Poli altitudinem. Centro C radio CB describatur arcus $\mathcal{A}EBP$, fiatque $P\mathcal{A}$ quadrans, jungaturque $\mathcal{A}C$; patet angulum $\mathcal{A}CP$ rectum esse; ideoque $\mathcal{A}C, BD$ (29. 1. Euclid.) parallelas,

Demonstratio. Ponatur quadrans $\mathcal{A}PC$ esse meridianus, in quo $C\mathcal{A}$ ejus cum Equatore communis sectio: eritque CP ad $\mathcal{A}C$ normalis axis Mundi, & P Polus. Quoniam DBC , hoc est alternus $\mathcal{A}CB$ (29. 1. Euclid.) ei æqualis, est data declinatio, consequenter arcus EB Parallelus datæ declinationis per B transit. Hunc Meridianus secatur (15. 1. Theod.) per diametrum, & (16. 1. 1. Euclidis) parallelam ipsi $\mathcal{A}C$: est ergo BD Radius ejus Paralleli, & ejus centrum D in axe CP ; & arcus FB ejus Paralleli quadrans, qui intelligatur in suo situ ad Meridianum recto super rectum BD , quo facto etiam EO Meridiano in puncto O recta erit. Quoniam FE est complementum arcûs semidiurni (per constructionem) erit reliquus EB vel semidiurnus, vel seminocturnus; consequenter horizon quæsitæ latitudinis transit per E ; & quia tam Parallelus, quàm horizon ad Meridianum recti sunt, etiam eorum communis sectio per E transiens (19. 1. 1. Euclidis) ad eundem Meridianum recta est; eritque EO : ergo horizon per O transit. Transit autem & per C Mundi centrum: ergo CO est communis sectio Meridiani cum quæsito horizonte. Producto CO donec secet Meridiani perimetrum in H , erit HP arcus Meridiani inter Polum, & horizontem, nempe quæsitæ altitudo. Sed HP est mensura anguli HCP , hoc est $OC D$: is angulus ergo est quæsitæ Poli altitudo, Quod erat &c.

Resolutio Trigonometrica ex Geometricâ facillè eruitur.

tur. Nam si à P erigatur ad CP normalis, quæ producta donec concurrat cum CH producta in T ; erit PT tangens arcûs HP quæsitæ Poli altitudinis, cui cum Parallela sit DO : erit (4.6. Euclidis) ut CD ad DO , ita CP ad PT . Est autem CD tangens datæ declinationis posito BD sinu toto, & DO sinus complementi dati arcûs semidiurni, estque ut CD ad DO , ita similis tangens respectu sinus totius CP ad similem sinum: patet ergo ita esse tangentem datæ declinationis Solis ad sinum complementi dati arcûs semidiurni, ut sinus totus ad tangentem quæsitæ elevationis Poli. Itaque si Log. sin. comp. dati arcûs semidiurni addatur complementum arithmeticum tangentis datæ declinationis Solis; summa erit Log. tangentis quæsitæ elevationis Poli, ut in apposita formula; in qua

ponitur arcus semidiurnus h. 7. vel 5, nempe Gr. 105, vel

75. Invenimus ergo rursus altitudinem Poli trigonometricè.

Resolutio Geometrica secundæ partis in Disco fit iuxta praxim in Coroll. quarto, vel nono sextæ hujus: & puncta inventa in Disci perimetro pertinebunt ad inventam latitudinem, & simul ad horam ortûs in dato arcu semidiurno, nempe horam decimanseptimam, vel decimamnonam ad partes Disci Occidentales; ad horas octavus 7, vel 5 ad partes orientales.

Trigonometricè inveniuntur ea puncta, si logarithmus sin. compl. inventæ altitudinis Poli addatur Log. sin.

dati arcûs semidiurni. Summa, abjecta 1 sinistima, erit l. sin. arcûs inter punctum Disci 90; hoc est B , & puncta utrin-

Arc. semid. Gr. 105, vel 75. sin. c. l.	9.4129962
Declin. Gr. 25 40' 40" Comp. — t. l.	55.18058
Alt. P. quæsitæ. G. 42 40' 50" — t. l.	99.648020

Arc. semid. 105, vel 75. sin. l.	9.2842438
Altit. Poli Grad. 42 40' 50" sc. l.	9.8663728
Arc. quæsitæ Grad. 45. 14' 30" sin. l.	9.8512160

utrinque quæſita, ut in appoſito exemplo. Etiam non, inventa antecedenter Poli altitudine prædictus arcus, hoc eſt quæſita puncta invenientur, ſi addantur tl. dati arcus ſemidiurni, & Log. ſin. datæ declinationis Solis.

Arc. ſemid. 105, vel 75. Gr. tl. 10.5719475
Declin. ☉ 15. 40' 40" ſia. l. 9. 4317288
Quæſ. Gr. 45. 14' 30" tl. 10. 0036763

Summa mulctata 1. in notâ ſiniſtimâ eſt tl. quæſiti, ut in appoſitâ formulâ.

Demonſtratur utraque praxis trigonometrica. In figura 22, eſto arcus P VII horæ 7. à meridie. In trigono ſphærico P B VII, angulus ad B Meridiani cum Diſco reſectus eſt; latus P B notum, nempe data declinatio Solis; angulus obliquus B P VII pariter notus, nempe reſiduum ad 180 dati arcus ſemidiurni; nec reſert an ſit quadrante majus, aut minus, cum utriuſque ſit idem, ſinus, tangens &c. Ex his datis patet ex trigonometriâ per praxim poſtერიem inveniri arcum quæſitum B VII. Quod ſi nota ſit Poli altitudo; notum eſt ejus complementum, nempe hypothenuſa P VII; quare ex eadem trigonometria conſtat per praxim priorem inveniri quæſitum B VII. Quod erat alterum. Conſtat ergo totum problema directum: Quod erat &c.

Tab. VII. Fig. 22

Ex datis praxibus facilè converſum etiam reſolvitur, quoad utramque partem. Nam primò *geometricè* data elevatione Poli, & declinatione Solis, ſi fiat quivis quadrans $\triangle ECP$, & in eo abſcindatur PH arcus datæ elevationis Poli, & $\triangle EAB$ datæ declinationis, junganturque CH , & BD parallela ipſi EC , quæ ſe ſecent, puta in O . Centro D radio DB ducto arcu FE , & per O ad C parallela OE , quæ arcum FE ſecet in E , erit FE arcus ſemidiurni quæſiti complementum addendum quadranti, ſi declinatio Solis ſit ad Polum conſpicuum; auferendum, ſi ad non conſpicuum. In caſu priore ſumma, in poſtერიore differentia eſt arcus ſemidiurnus quæſitus. Is arcus etiam ex Diſco Terræ haberi facilè poteſt per

Fig. 24.

M

per

per Coroll. 9. sextæ hujus. Secunda autem conversi problematis pars ex Coroll. 5. & 9. sextæ hujus Geometricè solvitur.

Trigonometricè pars prior ita solvitur.

Quoniam CP ad PT , ut CD ad DO ; patet

si è summa LL tangentium datarum altitudinis P ,

& declinationis Solis deleatur 1 sinistima, relinqui sinum complementi quæsitæ arcus, ut in appposito exemplo.

Fig. 22.

Pro parte altera. Esto in *figura* 22 punctum quodvis *VII*, per quod & P polum intelligatur circulus maximus. Mensuretur ope Scalæ chordarum arcus $B VII$. In trigono Sphærico $PB VII$ rectangulo ad B , nota sunt duo latera PB , data Solis declinatio, & $B VII$ mensura repertum: ergo per trigonometriam non latebit hypotenusa $P VII$ complementum quæsitæ altitudinis Poli, & angulus $BP VII$; cuius residuum ad 180 est arcus semidiurnus quæsitus; quod erat faciendum, & demonstrandum.

Altit. $P. G.$ 42 40' 50" t l.	9.9648020
Declin. $Gr.$ 15 40 40 t l.	9.4181941
Compl. quæsitæ $Gr.$ 15. sin. l.	9.4189962

Declin. $Gr.$ 15 40' 40" sin. co. l.	9.9835345
$B VII.$ $Gr.$ 45 14 30 sin. co. l.	9.8476454
Alt. $P.$ quæsitæ $G.$ 42 40' 50" sin. l.	9.8311799

Declin. $G.$ 15 40' 40" sin. l.	9.4317288
$B VII.$ $Gr.$ 45 14 30 t c l.	9.9963364
Arc. semid. 105. t c l.	9.4280651

SCHOLIUM.

Hujus propositionis praxes, vel ei æquivalentes in Corollariis sextæ hujus, usui sunt, & necessariae ad exhibendas in Tabula Geographica inferius delineanda phasces Eclipsis horizontalis, nempe pro omnibus Locis, in quibus Eclipsis non fit tota supra horizontem, vel saltem initium, aut finis, aut utraque sunt in ipso horizonte.

Por-

Porro arcus inter punctum B, & lineas digitorum, Orbitæ &c. adhuc certius inveniuntur arithmetice, factis notis radio penumbrae, diametro Solis, ac distantia minima centrorum Disci, & penumbrae in partibus sinu totius. Ex quibus nota fient in iisdem partibus segmenta axis Orbitæ inter centrum, & singulas lineas. Hac segmenta sunt sinus complementi arcuum Disci inter punctum O, & lineas digitorum datas, cum hæ lineæ ad axem Orbitæ rectæ sint: ex canone ergo sinuum innotescet eorum arcuum quantitas, ex qua ablato, eique addito arcu inter puncta O, & B noto ex datis trium axium angulis, summa erit arcus inter punctum B, & datam lineam ad partes à B ad O, differentia ad partes oppositas. Declaro rem exemplo.

In figura 16 distantia minima centrorum in partibus sinu totius est 54. 5089. Radius penumbrae in iisdem partibus est 525. 8689. Ad le, & aufer distan-

Tab. V. Fig. 16.

Radius penumbrae	525. 8689		
Distant. min. cent.	54. 5089		
Summa	580. 3778	}	Sin. gr. 35 28' 38"
Differentia	471. 3600		Compl. quadr. min. 54 1' 22"
			Sin. grad. 28 7 21
			Compl. quadr. maj. 151 51 39
Compl. prius	54 31' 22"		
Arcus O B	12 21 43		
Summa	66 53 5	Pro limite boreali	
		Arcus quæsitus ad partes O	
Differentia	42 9 19	Arcus quæsitus ad partes oppositas.	
Complement. posterius	151 52' 19"		
Arcus O B	12 21 43		
Summa	164 14 22	Pro limite Austral.	
		Arcus ad partes O	
Differentia	339 30 16	Arcus ad oppositas.	

tiam minimam centrorum, summa est portio axis Or-
 M 2 bi-

bitæ inter centrum Disci, & limitem penumbrae à centro remotiorem; Differentia portio inter ideum centrum, & limitem propiorem. Prior in canone sinuum invenitur sinus graduum $35\ 28\ 38''$ quorum complementum grad. $54\ 31' 22''$. Posterior sinus grad. $28\ 7' 21''$, quorum complementum quadrante majus (is enim sinus hîc est à centro Disci ad partes oppositas à puncto O) est gr. $151\ 52' 39''$. His complementis addatur, & dematur arcus OB, qui in hoc exemplo est grad. $12\ 21' 43''$. Fient summae, & differentiae quælitæ, quæ dabunt arcus quæsitos, ut ostendit appositum exemplum. Pro reliquis digitis, quia Solis diameter invenitur partium sinus totius 523.1317 per divisionem invenitur quantum singulis, binis, ternis &c. digitis conveniat: puta ternis digitis, qui sunt $\frac{1}{3}$ totius diametri, inveniuntur cedere partes 130.7829 . Hæ ablatæ è sinibus limitum superius inventis, relinquent sinus trium digitorum, utrinque; & ita deinceps. Circa hos sinus similiter procedatur, ac circa limitum sinus. Cum autem accidit seu pro limite alterutro, seu pro digitis subtractionem, seu distantia minimæ centrorum, seu partis aliquotæ diametri Solaris, fieri non posse (quod tum contingit, cum proposita linea cadit inter centrum Disci & Orbitam), subtrahatur minus è majori; eritque differentia sinus complementi quæsitæ semper minoris quadrante. Hæc omnia ex demonstrata Typi constructione clara sunt. Cum autem prædictus calculus non pendeat à digitorum lineis antecederent ductis, inventi arcus si decenter abscondantur in Disci perimetro, Lineæ limitum, & digitorum exactissimè duci poterunt, & inde etiam Tabula Geographica exactior prodibit.

PROPOSITIO XXVII. PROBL. XIX.

Dato quovis puncto in Disco Terræ, & hora, quæ in eo numeratur, ejus latitudinem reperire.

T: b. VII. Fig. 22

Esto in Disco punctum *l* in hora 22, cujus quæritur latitudo. Ex *l* ad *TB* demittatur perpendicularis *lt*,

lt , quæ (9. hujus) erit sinus distantiae hor. 22 à meri-
 die, nempe Gr. 30 in Parallelo, ad quem spectat pun-
 ctum l . Est ergo semissis Radii quæriti Paralleli, in li-
 nea Co instrumenti propositionis decimæ. Ex centro C
 abscindatur segmentum æquale ipsi lt . Per finem seg-
 menti applicetur regula normaliter ad Co , quod fiet, si
 Regula in semicirculo utrinque ab o abscindat arcus æ-
 quales, quod facile discernitur, cum sit in gradus sectus
 semicirculus. Potest etiam applicari norma lineæ Co , ita
 ut latus unum congruat Co , & angulus sit in extremo
 abscissi segmenti. Regula, vel norma indicabit in gra-
 dibus semicirculi, per quos transit, latitudinem quæsi-
 tam, cujus minuta, si qua sunt præter gradus, per sca-
 lam chordarum patebunt. Inventa latitudo erit borealis,
 vel Australis, prout datum punctum in Disco fuerit ab
 apparentia Æquatoris ad Boream, aut Austrum. Totum
 patet ex ostensis de Typi constructione, & prædicti in-
 strumentii.

Si datum punctum sit in horâ, quæ à meridie di-
 stet plus, aut minus, quàm 30 gradus, quærendus se-
 miradius Paralleli quæriti; ut si detur punctum h in hora
 21, aut n in hora 23. Agantur, ut prius, normales bx ,
 nz , eritque bx sin. grad. 45 in Parallelo puncti h , & nz
 sinus grad. 15 in Parallelo puncti n . Ducantur duæ re-
 ctæ ab , ac facientes quemvis angulum a . In una abscin-
 datur ae æqualis semiradio Æquatoris, hoc est Disci.
 In eadem pro puncto n abscindatur sinus grad. 15 ag in
 radio Æquatoris, qui sinus in Rhombo extat; & pro
 puncto h abscindatur eb excessus sinûs grad. 45, supra se-
 miradium, qui excessus in Rhombo instrumenti item ex-
 tat. In altera lineâ abscindantur af æqualis nz , & ae
 æqualis bx , & junguntur fg , cb . Per a agatur ac pa-
 rallela ipsi gf , & aP parallela bc . Dico ae esse semi-
 radium paralleli puncti n , & aP Paralleli puncti h . In-
 ventis semiradiis, cætera, ut in primo casu.

Demonstratio ae , gf sunt parallelæ. Ergo ut ag ad
 ae , ita ae ad af . Sed ag est sinus grad. 15 posito se-
 mi-

Tab. VIII. Fig.
 25.

miradio ae : ergo af est sinus similis posito semiradio ae : est autem af sinus grad. 15 in quaesito Parallelo; ergo in $coae$ est semiradius. Similiter concluditur de aP . Quod erat &c.

Trigonometricè sic proceditur. Producat TI donec secet perimetrum Disci. Secet in y . Per chordarum scalam notus fiat arcus By mensura anguli BTI . Quoniam TI est sinus arcus circuli verticalis inter Solem, & verticem loci in I , qui circulus Disco perpendicularis est; ac TP est arcus, seu sinus arcus meridiani distantiae Solis à Polo: & uterque circulus in Polo Disci concurrunt; patet arcum By esse mensuram anguli, quem illi duo circuli comprehendunt, nempe BTy : Circulus maximus datae horae per P polum, & datum punctum in Disco facit cum illis triangulum sphaericum, cujus notus factus est angulus PTI ; notus est item angulus TPI datae horae cum meridiano, ac latus interjacens TP complementum datae declinationis: ergo per Trigonometriam patebit latus PI distantia dati loci à Polo, cujus complementum est latitudo quaesita. Progressum calculi ostendit adjecta formula.

Pro punctis in horâ Merid: nempe axe Aequatoris, coeuntibus arcubus omnibus in unum Meridianum; neutra datarum praxium

habet locum. Faciliùs tamen res expeditur; & primò Geometricè sic. Per punctum propositum ducatur occulta recta ad axem Aequatoris secans hinc, vel inde Disci perimetrum: reperiatque ope Scalae chordarum, quotus sit arcus eâ rectâ, & diametro Aequatoris interceptus, cujus sinus est portio axis Aequatoris inter centrum, & illam rectam. Si is arcus sit à diametro

Aequa-

T	Gr. 74	19'	10"	S. C. l.	9.4317288
TL	72	18		t	1.10.2892949
Inv. T	62	25'	57"	tc	l. 9.71772217
Subtr.	30			l. S. co.	9.6631869
				PT	t l. 10.5518957
Differ.	32	25	57	C. ar. S. co.	736410
Lat. Quæf.	g. 17	13		tc l.	10.2588376

Æquatoris ad partes, ad quas Sol declinat, nec major sit complemento datæ declinationis, summa illius arcus cum data declinatione erit latitudo quæsitæ versûs polum, ad quem Sol declinat. Si ille arcus sit major complemento declinationis, & ab illius arcus differentia à semicirculo auferatur data declinatio, relinquetur latitudo quæsitæ ad eandem plagam. At si arcus ille sit ad partes oppositas iis, ad quas Sol declinat, & non sit minor data declinatione, hæc ab illo auferatur, restabit latitudo quæsitæ ad partes declinationi Solis oppositas. Si verò arcus ille minor sit declinatione Solis, illius ab hac differentia erit latitudo quæsitæ, sed ad eandem plagam cum declinatione Solis. Ratio pendet ex offensâ typi constructione. Puneta enim in axe Æquatoris spectant ad verticem Parallelorum, si sint infra Polum; ad imum, si supra. Porro ex Typi constructione vertices Parallelorum distant à centro Disci sinu differentiæ, vel summæ latitudinis cum declinatione Solis; imo verò semper sinu summæ. Hinc factâ præceptâ additione, vel subtractione, patet inveniri quæsitæ latitudines.

Pro *praxi trigonometricâ* satis est notam facere portionem axis Æquatoris inter centrum Disci, & punctum propositum, quæ est sinus arcus inter diametrum Æquatoris, & rectam, quam supra in praxi Geometrica duximus: sic enim ex canone sinuum innotescet

Latus dat.	580. 3778.	l. 2. 7637108
Ang. axium	12° 21' 43" C. ar. l. sc.	101879
Quæf. hypoth.	594. 1536	l. 2. 7738987
Quæ est sinus	360 27' 30"	
Adde Declin.	15 40 40	
Latit. quæf.	52 7 48	limitis borei
Latus datum	471. 3600	l. 2. 6733517
Ang. axium	12° 21' 43" C. ar. l. sc.	101879
Quæf. hypoth.	482. 5519.	l. 2. 6835406
Quæ est sinus	28° 51' 7"	
Subtr. declin.	15 40 40	
Lat. quæf.	13 10 27	limitis Austriaci.

ar-

arcus, & factâ additione, vel subtractione, ut supra, ipsa latitudo. Ille autem sinus est hypothenusa trianguli rectanguli, quod axes *Æquatoris*, & *Orbitæ*, unâ cum datis lineis digitorum formant, in quo notum est latus unum (Schol. præcedens), nempe portio axis *Orbitæ* inter centrum *Disci*, & datam lineam in partibus sinus totius; item anguli obliqui, quorum qui ad centrum est angulus axium *Æquatoris*, & *Orbitæ* notus, alter oppositus dato lateri prioris complementum. Si ergo logarithmo numeri dati lateris addatur complementum arithmeticum sin. anguli sibi oppositi, nempe complementi anguli dictorum axium: summa erit logarithmus numeri quæsitæ hypothenusæ; hæc quæsitæ inter sinus ostendet arcum, cui addenda, vel demenda *Solis* declinatio, ut habeatur, ut supra, quæsitæ latitudo, ut ostendunt adjecta exempla pro utroque limite penumbrae in eadem *Figura* 17.

S C H O L I U M.

Arcus Disci, qui est mensura anguli *PTI* ab ea plaga numerandus, ad quam *Sol* declinat, nempe à puncto *B*, si in *Boream*, ab *A*, si in *Austrum*. Quod si arcus ille excedat quadrantem, tunc invento 1. non subtrahitur, sed additur angulus *TPI*, & in secunda analogia pro Log. differentia additur Log. summa. At si inventum 1 sit minus dato angulo *PTI*, semper minor è majori subtrahatur.

Si arcus *B* sit quadrans, brevior est calculus, utpote trianguli rectanguli. Addantur Log. sin. lateris dati *TP*, hoc est Log. datæ declinationis *Solis*, & Log. anguli *TPI* distantia datæ horæ a Meridiano. Summa, abjecta 1 sinistima, est Log. hypothenusæ *PI* idest Log. quæsitæ latitudinis. In praxi Geometricâ sinus *It*, *bx* facillè circino habentur, licet non ducantur: si nempe positum circinum in dato puncto, ita deducas ad partes *TB*, ut si arcus circuli ducatur tangat, sed non secet *TP*.

In

In propofitis figuris, quæ radium habent subduplum ejus, quem in instrumento fupposuimus, finus dati duplicandi funt, ut patet, ut per instrumentum folvatur Problema; quod idem intellige de chordis pro arcuum menfura. Per fe autem patet eodem instrumento uti licere fimili adhibitâ cautione, fi radius pro Difco affumatur in quavis ratione exactè multiplici, vel fubmultiplici ejus, qui in instrumento fupponitur.

PROPOSITIO XXVIII. PROBL. XX.

*Tabulam Geographicam exhibentem occurrentis
Eclipsis phafes pro totâ Tellure, delineare.*

I. **Q**Uærantur (Coroll. 9, & 10 sextæ hujus, vel 26 præced.) latitudines, necnon arcus femidiurnus, hoc eft hora ortûs, & refpectivè occafûs Solis punctorum omnium, in quibus Orbita, & cæteræ digitorum Eclipticorum Parallelae fecant utrinque perimetrum Difci, ut etiam punctorum I, & F, in quorum priore primò incipit, in posteriore ultimò terminatur Eclipsis Terræ, ac tandem puncti O, ubi axis Orbitæ perimetrum Difci fecat, fi quidem fit intra penumbræ limites, ut in *figura 23*. Inventarum latitudinum fiat catalogus adnotata fingulis convenienti horâ ortûs, vel occafûs. Ope hujus catalogi phafes omnes Eclipsis horizontalis tam in ortu, quam in occafu Solis poterunt exhiberi in fuis locis.

Tab. VIII. Fig.

23.

Secundò. Inveniantur (per præced.) latitudines punctorum omnium, in quibus Orbita, & Parallela prædictæ fecant curvas horarum; fiatque fimiliter catalogus adnotatis digitis, & horâ, ad quam fingulae fpectant. His duobus paratis plusquam dimidium facti habes.

Tertiò. Fiat rete Longitudinum, & Latitudinum Geographicarum, femicirculum circiter in longitudinem complectens, in latitudinem autem faltem quantum occupat in Difco Terræ tota pars obumbranda. Rete.

N

hoc

hoc absolutè fieri potest juxta quamlibet projectionem, usitatam globi Terraquei in Tabulis Geographicis; sed ne frustra citra necessitatem labor multum augeatur, præstat per partes æquales procedere, quod dupliciter fieri potest. Primò si longitudines, & latitudines exhibeantur per rectas parallelas, quarum priores orthogonaliter decussent posteriores: ac duæ oppositæ, tam longitudinum, quàm latitudinum in tot partes æquales dividantur, quot gradus longitudinis, aut respectivè latitudinis habere debent; ut factum est in *figura 26*. Secundò:

Tab. IX. Fig. 26.

si latitudines fiant circuli concentrici æquè ab invicem, distiti, quorum uno, sive Æquatore, sive alio, prout hic, & nunc commodum fuerit, in gradus de more facto, Radii è centro exhibebunt longitudines, & centrum Polum Terrestrem. Horum Radiorum unus, puta, qui spectat ad primum Meridianum, ab Æquatore ad Polum usque secetur in 90 partes æquales pro 90 gradibus; quæ divisio continuabitur ultra Æquatorem, vel ultra Polum etiam, si eò penumbra se extendat. Ita factum vides in

Tab. X. Fig. 27.

figura 27. Utra hic & nunc forma aptior sit, ipse Discus Terræ suggeret. Universim dici potest; si Polus, ad quem Sol declinat est intra penumbram, aut parum inde distat, vel si penumbra tangit Discum ad intra in puncto O, aut non multum infra immergitur tota, posterior methodus aptior erit. In aliis casibus aptior erit prior, nisi fortè axis Orbitæ congruat cum axe Æquatoris, aut parum inde divertat (ut contingere potest circa Solstitia), tunc enim posterior forma æquè apta esse potest. Rete hoc totum fiet occultum, exceptis in priore formâ lateribus rectanguli extremis sectis in gradus, in posteriore excepto Æquatore, aut alio Parallelo in gradus diviso, & Radio primi Meridiani, aut alio, similiter in gradus, ut dictum est, latitudinum diviso. Gradibus latitudinum adscribentur numeri convenientes per denos, aut quinos. Similiter fiat gradibus longitudinum postquam determinati erunt quinam numeri inscribendi; quod ita fiet. Ex Tabulis Geographicis recentio-

tioribus, vel ex Tabulis longitudinum, quas Astronomi passim exhibent, cognoscatur longitudo loci (nisi detur) pro quo descriptus fuit Typus. Ex. gr. propositæ figuræ, seu pro Meridiano Pekinenli, qui juxta Tabulas prælaudati Manfredii distat à Bononienſi ad ortum hor. 7 1' 6" nempe grad. 105 16'. Bononia Italiæ ibidem ponitur distare à primo Meridiano, item in ortum hor. 1 54': hoc est Grad. 28 30', quibus si addas 105 16', fiet longitudo Pekinenſis Geographica Grad. 133 46'. Hæc dati loci longitudo notanda: ea enim tanquam radice, seu termino à quo in hoc negotio utendum. Jam ex cognitis (22 hujus) momentis phasium Eclipsis in dato loco, scitur an datus locus in medio Tabulæ Geographicæ, an propius ad limbum orientalem, aut occidentalem aptè statuatur. Ut in priori ex propositis Eclipsibus, quoniam ea Pekini inconspicua, quoniam tota post occasum, statuetur aptè in ipso extremo, vel propè extremum Tabulæ Orientale: hinc poterit ibi inscribi numerus 135, vel 140; deinde retrocedendo 130, 120 &c. & ubi peruentum fuerit ad grad. 0, ibi est primus Meridianus, cui 0, vel 360 adscribi potest, inde ante eum 350, 340 &c. In posteriori Eclipsi, quoniam initium Eclipsis Pekini invenitur hor. 19 44', patet aptè poni in medio circiter inter Meridiem, qui præterpropter erit in medio Tabulæ, & extremum occidentale. Usus melius rem declarabit. Parato reti inscribatur tractus Terrarum conveniens juxta Mappas Geographicas: non tamen ea subtilitate opus erit; sed satis est si Regna, aut Provincie ad summum discernantur; licet loca aliquot insigniora suis in locis notare nec incongruum sit, nec laboriosum. Jam Eclipsis phases ita in paratâ Tabulâ delineabimus.

Quartò. Ex puncto, ubi linea limitis penumbrae infima secat perimetrum Disci occidentalem, ducatur normalis ad Orbitam (facile habetur applicatâ normâ absque eo quod linea ducatur) observa in quod Orbitæ punctum ea cadat. In figura 22 cadit in horam 4 28' 24" a Meridie. Ex catalogo numeri 1 scitur illud Disci punctum,

Tab.VII.Fig.22

spectare ad latitudinem australem grad. $38\ 21'\ 30''$: & Solem ibi oriri hor. $6\ 51'\ 20''$ a media nocte, Astronomicè hora $18\ 51'\ 20''$ à Meridie; quæ propterea numeratur in eo puncto, cum Pekini numeratur hora $4\ 28'\ 24''$ diei sequentis, nempe post meridiem. Subtrahatur ergo $18\ 51'\ 20''$ ex hora Pekinensi, additis 24 , quoniam subtractio fieri nequit, nempe ex $28\ 28'\ 24''$; invenitur differentia longitudinum hor. $9\ 37'\ 4$, & in gradibus $144\ 16'$ subtrahenda à longitudine Pekinensi; cum punctum illud sit occidentalius, utpote habens horas pauciores. Factà subtractione, additis longitudini Pekinensi grad. 360 , quoniam subtractio fieri nequit, restat puncti illius longitudo Grad. $249\ 30'$. Itaque applicetur Regula per inventos longitudinis gradus in oppositis lateribus latitudinum; tum assumptis circino gradibus latitudinis $8\ 21'$, posito circino in concursu Regulæ cum Parallelo latitudinis Australis Grad. 30 , notatur Austrum versus punctum ponè Regulam, eritque in Mappâ locus respondens assumpto Disci puncto, & ad eas partes Eclipsis terminus. Idem omnino similiter fiet circa omnia singulatim puncta tam occidentalia, quàm orientalia in arcu Disci, donec absolvatur catalogus numeri 1. Puncta quæ sita si rete rectilineum sit, ope normæ statim habentur, si ita applicetur, ut latus unum per inventæ longitudinis, alterum per datæ latitudinis gradus in rectanguli lateribus transeat: sic enim Normæ angulus erit in puncto quæsito. Per puncta inventa occidentalia ducatur diligenter linea, item alia per orientalia. Hæ lineæ erunt in diversis casibus variæ, semper tamen decenter curvæ. Loca omnia lineæ occidentali subiecta vident summum defectum Solis in hujus ortu; subiecta orientali, in occasu. Puncta, per quæ illæ lineæ ductæ sunt, indicant loca, in quibus summa Eclipsis oriente Sole est tot digitorum, ad quot singula respectivè pertinent, & in iis terminantur lineæ digitorum Eclipticorum similium inferiùs ducendæ, quare ea puncta singula notanda sunt. Cum penumbra habet intra Discum utrumque limitem,

Au-

Australem, & Borealem, ut in *figura 22*, hæc duæ lineæ Fig. 22.
 ab invicem sunt sejunctæ, & singulæ in limitibus penum-
 bræ utrinque terminantur; ut ostendit *figura 26*. Fig. 26. Alias
 coeunt in unam lineam, nempe conveniunt in unum
 commune punctum, quod semper ad Meridianum per-
 tinet, utpote enatum è puncto Disci *B*. Ita contingit in
figura 27. Fig. 27. In hoc eventu, qui frequentior est; pro iis
 lineis integrè ducendis, plerumque non sufficiunt pun-
 cta in lineis digitorum Eclipticorum, aut etiam cum iis
 punctum respondens Disci puncto *O*. Ut uno labore duas
 ærumnas conficias, ita fiet. Quia in casu hoc horarum
 lineæ ad partes, ad quas penumbra excedit Discum, se-
 cant Disci perimetrum, consequenter pro earum punctis
 in illâ inventæ sunt (24. hujus) latitudines convenien-
 tes, quarum servandus catalogus: eorum punctorum
 quarantur puncta in Tabulâ Geographicâ similiter, ac sit
 pro cæteris. Per hæc puncta continentur dictæ lineæ,
 donec coeant in punctum commune: & in iisdem punctis
 terminabuntur horæ cognomines deinceps in Mappâ du-
 cendæ. Quia autem punctum 90, hoc est *B* (nisi polus ibi
 sit) distat à Polo quantitate declinationis Solis (juxta di-
 cta in Coroll. 6. hujus), & quidem ultra cum declinatio
 est ad eum Polum, citra cum ad oppositum: hinc in po-
 steriore casu, quia penumbra Polum non involvit, is in
 mappâ statui potest prope marginem superiorem, eritque
 centrum Parallelorum in priore ab eo margine removen-
 dum intra Mappam tot gradibus latitudinis, quot habet
 data Solis declinatio, aut paulò plus. Nectamen opus
 est ultra Polum Long. gradus distinguere, cum Latitu-
 dines necessariæ per gradus in opposito Æquatoris semi-
 circulo haberi possint.

Quintò. E singulis punctis intra Discum, in qui-
 bus lineæ limitum penumbrae, item digitorum, & Or-
 bitæ secant singulas curvas horarum demittantur norma-
 les ad Orbitam, & comparando tempus in Orbitâ, in
 quod singulæ incidunt, cum horâ puncti, in quâ sunt
 singula illa puncta, eruatur singulorum longitudo. Ex. gr.

ex

Fig. 22.

ex puncto hor. 19 in limite penumbrae Australi (*Figura 22.*) demissa perpendicularis incidit in punctum Orbitae spectans ad horam Pekinensem 4. 28; hoc est (additis 24) 28 28'. Inde subtractis 19 hora puncti in Disco, unde demissa perpendicularis, restant horae 9. 28'; est ergo differentia longitudinum subtractiva Gr. 142 0'. Subductis his è longitudine Pekinensi, invenitur longitudo puncti assumpti 351 46'. Ex longitudine inventa, & simul latitudine notata ex catalogo numeri secundi, determinetur in Mappa punctum conveniens, ut numero praecedenti. Et ita de reliquis. Puncta haec cum è communibus concursibus horarum, & linearum, Eclipticarum Disci enascantur, tam ad horas, quam ad digitos Eclipticos spectant. Itaque puncta, quae ad easdem partes ab occasu in ortum ad eandem Eclipsin quantitatem pertinent, jungantur diligenter lineis curvis, terminandis utrinque in punctis cognominibus linearum summae Eclipsis numero praecedenti inventis. Harum extremarum curvarum definient totum Telluris tractum, in quo aliquid Eclipsis spectari poterit; extra ipsum verò, nihil omnino: Reliquae lineae definient quantitatem summae Eclipsis in locis quibuscumque sibi subiectis; ut linea Orbitae per puncta propria descripta, deliniet loca omnia, in quibus spectabitur Eclipsis centralis. Pariter puncta eadem, quatenus horaria, ab Austro ad Boream cognomina jungantur lineis: quae plerumque curvae erunt; ac terminantur in limitibus penumbrae ad Boream, & Austrum, cum penumbra intra Discum habet utrumque; iis exceptis, in quibus intra tractum Terrae Eclipticum alicubi Sol oritur, & occidit; haec enim ex ea parte, ad quam sunt supra horizontem terminantur in limitum altero; ad alias partes sistunt in linea summae Eclipsis horizontalis, ubi eam secutur Parallelus, in quo hora illa ortiva sunt, aut occidua, cujus latitudo (26. hujus) quaerenda. Hoc autem accidit horis omnibus, cum penumbra alterutro caret limite, ut ostendit *figura 26.* in horis 18, 6, & 7. Quod si contingat lineam quamvis hu-

Fig. 26.
pro priore casu.

hujusmodi bis incurrere in eundem penumbrae limitem, ita ut cadat tota intra tractum Eclipticum, ibi utrinque sistet, nec ad lineam summæ Eclipsis horizontalis perveniet: nimirum eâ horâ nullibi erit summa Eclipsis oriente, aut occidente Sole. Tam horarum, quàm digitorum lineis sui numeri convenientes adscribantur, ut figuræ ostendunt. Loca omnia sub lineis horarum spectabunt summam Eclipsim eâ horâ, cujus lineæ subjacent, & quantitatis, quam decussantes lineæ digitorum indicant. Horæ, & quantitates in locis intermediis ab hora ad horam, & ab una trium digitorum linea ad aliam æstimatione discerni possunt, quantum satis ad intentum: ut non tanti videatur singulorum digitorum, ut & semihorarum, & quadrantum lineas ducere (licet eodem artificio posse manifestum sit) immensi utique laboris incremento. Hinc etiam pro lineis 12 digitorum, cum ab Orbitâ distinctæ sunt, ut plerumque, satis erit invenire puncta in lineis summæ Eclipsis horizontalis, & in meridie: cum enim ad sensum sint æquidistantes viæ centri penumbrae, hac primò ducta, illæ duæ manu satis bene duci possunt.

Sextò. Diducto circino ad intervallum totius radii Penumbrae è singulis punctis in perimetro Disci, quibus numero quarto usi sumus (exceptis punctis limitum, è quibus ducta perpendicularis ad Orbitam, ei Radio æqualis est) notentur in Orbitâ hinc inde duo puncta, quæ æqualiter distabunt ab eo, in quod cecidit perpendicularis (nam si ducerentur lineæ ex puncto Disci ad hæc puncta, hæc ambæ essent æquales; & cum ea perpendiculari, & Orbitæ portione inclusa facerent duo triangula, quorum ea perpendicularis est latus commune, & anguli ab ea utrinque recti æquales; consequenter (26 1 Euclid.) portiones Orbitæ inter perpendicularem, & singula ea puncta etiam æquales). Horæ Orbitæ, in quæ singula puncta incidunt comparentur cum horâ ortus, aut respectivè occasus in punctis Disci, unde ea puncta notantur, quæ hora ex catalogo numeri primi nota est;

& ut

Fig. 26.

& ut prius, eruatur singulorum longitudo conveniens. Ex hac, & latitudine ex eodem catalogo nota, determinentur, ut prius, puncta in Mappâ. Puncta ad partes occidentales, quæ prodeunt ex punctis notatis in Orbitâ ad partes occidentales in Mappâ cadent à lineâ summæ Eclipsis horizontalis in ortu orientem versus, & contra. Similiter ad partes orientales puncta, quæ oriuntur ex notatis in Orbita ad partes orientales cadent à lineâ summæ Eclipsis in occasu ad partes occidentales, & vicissim. Per inventa puncta dueantur decenter curvæ, nempe una per puncta extra lineam summæ Eclipsis in ortu, altera per puncta intra eam, & similiter ad utraque partes à lineâ summæ Eclipsis in occasu. Priores due coibunt utrinque cum extremis lineæ summæ Eclipsis in ortu, posteriores cum simili in occasu, siquidem penumbra habeat intra Discum, nempe & in Mappâ utrumque limitem austrinum, & boreum, ut in *Figura 26*. Harum linearum, quæ sunt utrinque extremæ sunt limites Eclipsis ab occasu in ortum; hoc est totius tractûs ab occasu in ortum, in quo aliquid Eclipsis spectari poterit; & in locis subjectis lineæ extremæ ad occidentem finitur Eclipsis in ipso Solis ortu, quare tota absolvitur infra horizontem: In locis subjectis oppositæ extremæ incipit Eclipsis in ipso Solis occasu, & reliquum totum infra horizontem peragitur. Linea interior ad occidentem indicat in locis sibi subjectis Eclipsim incipere in ipso ortu, & interior ad Orientem finiri in ipso occasu: quare hæ due lineæ definiunt ab occasu in ortum totum Terræ tractum, in quo Eclipsis ab initio ad finem usque erit spectabilis. Loca verò omnia, quæ lineis initii, & finis Eclipsis in ortu intercluduntur, finem Eclipsis spectare poterunt, sed non initium; contra intercepta similibus lineis in occasu, initium videbunt, sed non finem: quæ verò sunt inter lineam summæ Eclipsis in ortu, & lineam finis, finem tantum, non item summam Eclipsim; contra quæ sunt ad alias partes intra lineam initii in ortu, etiam summam Eclipsim spectant. Similiter loca, à lineâ finis

finis in occasu usque ad lineam summæ Eclipsis, initium, & summam Eclipsim, cætera verò usque ad lineam initii, solum initium spectare poterunt. Cum penumbra alterutro limite Boreali, vel Australi caret, lineæ initii, finisque Eclipsis horizontalis binæ, & binæ in unam coeunt, similiter ac lineæ summæ Eclipsis horizontalis. Hinc si puncta in lineis digitorum non sufficiant, quarantur alia similiter, ac pro lineâ summæ Eclipsis factum fuit. Porro lineâ initii Eclipsis in ortu, quæ est interior lineâ summæ Eclipsis in ortu, coibit cum lineâ initii in occasu, quæ est exterior; & lineâ exterior finis Eclipsis in ortu, cum lineâ interiori finis in occasu; quod diligenter notandum, nè perperam ad eas partes ducantur, & phasæ falsò indicentur. Puncta concursuum binarum quandoque erunt idem punctum, quandoque diversa. Cum idem sunt, idem pariter erunt cum communi concursu linearum summæ Eclipsis horizontalis, ideoque in lineâ horæ meridianæ, in distantia à Polo æquali declinationi Solis. Cum sunt diversa, si ex Polo intervallo datæ declinationis Solis ducatur arcus, is tangere debet tres curvas initii, summæ, & finis Eclipsis in punctis concursuum; nec ulla earum intra spatium eo circulo conclusum excurrat, si exactè ductæ fuerint; arcusque ejus Paralleli erit pro horâ meridiei relativè ad eas phasæ horizontales. Vide Fig. 27. Prædicta concursuum puncta notentur *: inde enim hinc, vel inde diversus est earum linearum usus, ut infra dicam. Quod si contingat (ut potest, licet rariùs) Eclipsim contingere, quidem in ortu Solis, nullibi tamen in occasu, aut contra (quod Typus ipse ostendet; si nempe penumbra solum semicirculum occidentalem Disci nordeat, aut solum orientalem) prædictæ tres lineæ solum ad pligum occidentalem, aut respectivè orientalem habentur, & coibunt si nul in suis utrinque extremis, in quibus indicabitur initium simul, summa, & finis Eclipsis, nempe in locis sub illis punctis solus Luminarium instantaneus contactus apparebit. In casu defectûs alterutrius limitis

Fig. 27.

O

pe-

penumbrae, notari etiam debet in mappâ locus respondens puncto Disci *O*, axis Orbitae; ibi enim fit ad eas partes obscuratio maxima, vel minima. Maxima quidem, cum centrum penumbrae Discum non ingreditur; minima cum ingreditur. Ratio est quia in eo axe minima omnium est distantia centrorum penumbrae, & Disci: quare si centrum penumbrae sit intra Terram, tunc maxima portio penumbrae immergitur, quare punctum *O* ad partes oppositas habet minimam intra umbram immersionem, ac cætera limbi Disci puncta: est ergo obscuratio minima. At cum centrum penumbrae extra Terram est, punctum *O* maximè omnium intra penumbram immergitur, hinc ibi fit maxima obscuratio. Itaque tale punctum semper est in linea summæ Eclipsis horizontalis, quæ cum ducta jam sit, & puncti *O* latitudo habeatur ex catalogo numeri primi, si ducatur occulta portio Paralleli latitudinis puncti *O* secans lineam summæ Eclipsis horizontalis in ortu, si punctum *O* sit in semicirculo Disci occidentali, vel in occasu, si in orientali; ea sectio est punctum quæsitum, cui adscribitur phasis conveniens maxima, aut minima. Similiter, quia ex eodem catalogo scitur latitudo punctorum *I*, & *F*, in quibus primò incipit, nempe in *I*, & ultimò desinit Eclipsis, nempe in *F*, nimirum in *I* fit prima phasis, in *F* ultima, & punctum *I* spectat ad ortum, *F* ad occasum Solis, manifestum est ea puncta esse debere primùm in lineâ initii Eclipsis Sole oriente, alterum in lineâ finis Sole occidente. Cum ergo hæ lineæ jam ductæ sint, ubi Parallelus puncti *I* secat lineam initii Eclipsis in ortu, notabitur prima Phasis, & ultima ubi Parallelus puncti *F* secat lineam finis in occasu. Punctum Disci *T* semper est in lineâ meridianâ, ut patet. Si penumbra illud involvat, notatur ejus punctum in horâ 24, ubi eam secat Parallelus æqualis, & ejusdem speciei, latitudinis cum datâ Solis declinatione. In eo puncto summa Eclipsis fit in vertice, nec unquam centralis, nisi novilunium verum fiat in ipso nodo; quod rarissimum est. Si pun-

Tab. 8. Fig. 23.

punctum *T* penumbram non ingreditur, ut in *Fig. 23. 27.* nullibi contingit Eclipsis in vertice; hinc punctum illud in Mappâ non notatur.

Septimò. Ex factâ hætenus descriptione, liquet lineam, seu lineas digitorum *O* in concursibus cum lineis summæ Eclipsis horizontalis quasi dividi in duas, ambas item digitorum *O*, sed alteram in immersione, alteram in emersione tam in ortu, quam in occasu Solis. Idem contingit lineis aliorum digitorum, quæ ibidem pariter dividi possunt in binas spectantes ad totidem digitos in horizonte, alteram in immersione, alteram in emersione. Harum puncta inveniuntur similiter; utendum tamen Radio penumbræ minuto tribus digitis pro lineis trium digitorum, sex digitis pro lineis 6 digitorum &c. Lineæ ductæ per puncta inventa, quæ sunt extra lineas summæ Eclipsis horizontalis indicabunt totidem digitos Eclipsis orientis in emersione, occidentis in immersione; cæteræ Solis orientis in immersione, occidentis in emersione. Hæ lineæ coibunt binæ, & binæ in lineis summæ Eclipsis horizontalis cum respondentibus lineis digitorum Eclipsis non horizontalis, si utrinque ab Orbitâ habeantur cognomines. Cum alteruter deest, ut in *Figura 27.* linea borealis digit. 3 re ipsa *Fig. 27.* conneſteretur ortiva cum occidua similiter, ac lineæ initii, & finis. At quia in illis angustiis tot lineæ confunderentur, & confunderent, satis est ad eas partes produci, quandiu potest sine confusione. Horæ in Mappâ jam descriptæ nihil habent commune cum lineis his phasium horizontalium, unis exceptis lineis summæ Eclipsis; sed phasæ illæ contingunt in locis subjectis eâ ipsâ horâ, qua ibi Sol oritur, aut occidit. Possunt tamen, etiam horæ phasium horizontalium facile describi; erunt enim portiones Parallelorum à lineâ initii, tam in ortu, quam in occasu, transeuntes per puncta horarum descriptarum in lineâ summæ Eclipsis horizontalis: patet enim eandem horam numerari Sole oriente, aut occidente in eodem Parallelo eodem die saltem ad sensum intra tem-

pus durantis Eclipsis. Hinc portio *Æquatoris* erit h. 6. Similiter duci possunt semihoræ, & quadrantes, inventis (26. hujus) latitudinibus *Parallelorum*, in quibus illi ad ortum, vel occasum *Solis* spectant. Hinc autem clarius intelligitur, cur puncta, in quibus coeunt lineæ initii, & finis Eclipsis in ortu, & occasu *Solis*, licet concursus illi omnes enascantur à puncto meridiano *BD* Disci, non tamen semper sunt in lineâ hor. 24 numero 5 ducta. Nam ea linea spectat ad Eclipsim non horizontalem; at pro phasibus horizontalibus meridiana est portio *Parallelæ*, qui tangit illa puncta concursuum.

Hic autem notandum, prædictarum horarum horizontalium singularum segmenta utrinque à lineâ summæ Eclipsis horizontalis, usque ad lineas initii, & finis esse æqualia. Quod etiam contingit quibusvis aliis *Parallelis* *Æquatoris*, sive per lineas rectas, sive per circulos exhibeantur. Ratio est quia puncta *Orbitæ*, per quæ determinantur in Mappâ puncta linearum initii, & finis distant æqualiter à punctis summæ Eclipsis, ut numero 6 ostendimus: ergo unius longitudo tanto minor est longitudine puncti summæ Eclipsis, quanto alterius major; consequenter utrinque à lineâ summæ Eclipsis in suis *Parallelis* æquales utrinque arcus abscindunt. Hinc unâ, & eadem operâ, non ductis perpendicularibus, inveniri possunt puncta *Orbitæ* spectantia ad summam Eclipsim horizontalem. Nam si fiat summa horarum, ad quas invenitur spectare initium & finis, ac bifariam dividatur; semissis erit hora spectans ad summam Eclipsim, ut patet. Et hoc compendium affert non contemnendum.

Octavo. Tandem sicut lineæ summæ Eclipsis horizontalis habent utrinque duas lineas in utroque, vel altero extremo secum coeuntes, quarum dexterior initium, sinisterior finem in horizonte notat in locis sibi subjectis; ita similiter cæteræ horæ summæ Eclipsis similes lineas utrinque habere possunt, in altero, vel utroque extremo secum coeuntes, quarum sinisterior, hoc est

est occidentalior finem, dexterior orientalior initium
 Eclipsis supra horizontem in locis sibi subiectis indicent.
 Earum describendi ratio eadem est, ac horizontalium;
 si nempe statuto circino in punctis intra Discum ad ho-
 ras digitosque spectantibus, radio penumbrae notentur
 in Orbita hinc inde duo puncta, quae simili ratione osten-
 dentur aequaliter distare à momento summae Eclipsis eâ-
 dem horâ; ac deinde cætera fiant, ut pro phasibus
 horizontalibus. Et hic etiam locum habent, quae dixi-
 mus in notando præcedenti, ac simile compendium.
 Hæ lineæ quando umbra caret alterutro limite, ad eas
 partes non coeunt cum lineâ horæ summae Eclipsis non
 horizontalis cognominis, sed lineæ initii Eclipsis co-
 gnominibus in lineis initii Eclipsis horizontalis, & li-
 neæ finis cum similibus in lineis finis: Quod idem acci-
 dit, ubi penumbra utrumque habet limitem, iis horis;
 quæ alicubi intra spatium Eclipticum ortivæ sunt, vel oc-
 ciduæ. Ut ostendit *Fig. 26*, in quo ejusmodi lineæ per
 puncta ad distinctionem ductæ sunt. In *Fig. 27* non du-
 ximus, quia Mappam longe majorem petunt, ut sine
 confusione delineentur. Patet autem similiter, ac pro
 phasibus horizontalibus fecimus, etiam lineas, quæ in-
 dicent dig. 3 &c. tam in immersione, quàm emersione,
 duci posse. Quod quidem innuo, ut appareat Typi Ecli-
 ptici, de quo agimus, usus amplissimus; non ut in Map-
 pâ universali tantum laboris impendatur sine responden-
 ti utilitate. Præcedentibus peractis Tabulæ Geographi-
 cæ petita descriptio absoluta erit. Quod erat faciendum.
 Ex hæcenus dictis pauca sunt, quæ ulteriori egeant de-
 monstratione; ex constructione enim Typi, & aliis supra
 ostensis satis patent, Nam numerus primus, & secundus
 & coroll. 9, & 10 6* item ex 26, & 27 hujus constant.
 Numerus tertius probatione non eget; licet enim Ter-
 rarum tractus in libitâ formâ exhibere, modò longitudi-
 nes, & latitudines certa lege servantur. Tria ergo restant
 demonstranda, nempe in datâ praxi ritè determinari
 primò momenta summae Eclipsis in datis horarum, & di-

Fig. 26.

Fig. 27.

digitorum punctis, secundo *differentias longitudinum*, Tertio *puncta phasium horizontalium*.

Ostenditur primum. Summa Eclipsis in quovis loco tunc est, cum centrum penumbrae (23. huj.) ab eo minimè distat; tunc enim in Disco per Lunæ cælum apparet minima centrorum Solis, & Lunæ distantia. Sed à puncto ad lineam distantiam minimam determinat perpendicularis linea; nam alia quævis, utpote hypothenu-
sa trianguli rectanguli (18, & 32 i Euclid.) major est: ergo in datâ praxi determinatur minima distantia centri penumbrae ab assumptis Disci punctis, ideoque summa Eclipsis. Quod est primum. Vide tamen de hoc Scholium sequens.

Ostenditur secundum. Differentia longitudinum duorum Locorum Terrestrium commensuratur differentiaë horarum, quæ in utroque eodem reali momento numerantur. Singulis enim horis debentur quindenî gradus Aëquatoris, & cujusque Paralleli, posteriores quidem, Orientem versùs pro loco, in quo numeratur hora posterior, citeriores in Occidentem pro eo, in quo numeratur hora prior. Cum ergo horæ in Orbitâ notatæ sint quæ numerantur in dato loco, pro quo Typus descriptus, cum centrum penumbrae est in orbitâ horis &c. hora verò puncti assumpti in Disco ea sit, quæ eodem momento ibi numeratur; patet ritè determinari eo pacto longitudines. Quod est secundum.

Ostenditur tertium. Typi Semicirculus occidentalis pertinet (Coroll. xi. 6 hujus) ad loca, quibus Sol successivè oritur; orientalis ad ea, quibus occidit. Phases ergo per puncta peripheriæ Occidentalis inventa ad Solem orientem, & per puncta peripheriæ Orientalis ad occidentem pertinent. Jam ritè determinari phases summæ Eclipsis horizontalis constat ex demonstratione primæ partis. Pro punctis initii, & finis utimur toto penumbrae radio, consequenter cum centrum penumbrae est in punctis Orbitæ è perimetri punctis eo radio notatis, tunc per ea puncta transit penumbrae limbus,
vel

vel primò ea attingens, vel ultimò deferens: tunc ergo in iis incipit, vel definit Eclipsis: rectè ergo etiam harum linearum puncta determinavimus. Porro Disci, seu Telluris perimetri puncta penumbra primò attingit, cum centrum habet adhuc ad occidentem respectu Terræ (penumbra enim pergit, ut Luna, ab occasu in Ortum); ultimò autem, cum ad orientem. Ergo puncta Orbisæ occidentalia punctis summæ Eclipsis tam in ortu, quam in occasu Solis determinant initium Eclipsis in ortu, & orientalia finem: sed citra ea loca omnia, quibus Eclipsis finitur oriente Sole, & ultra ea, quibus incipit in ipso occasu, nihil de Eclipsi spectatur, cum Solem sub horizonte non videant: ubi verò Eclipsis incipit in ortu, aut finitur in occasu tota Eclipsis est conspicua: ergo puncta finis Eclipsis in ortu, & initii in occasu, sunt omnium utrinque extremæ, ac limites ad occasum, & ortum tractus Ecliptici; ideoque extra lineas summæ Eclipsis horizontalis; puncta verò initii in ortu, & finis in occasu sunt intra lineas summæ Eclipsis in ortu, & occasu. Similis est demonstratio pro aliis phasibus horizontalibus: cum enim utamur radio penumbrae minuto 3, 6 &c. digitis diametri Solaris, patet centro penumbrae posito in notatis punctis Orbisæ penumbram in ea loca, consequenter (23. hujus) Lunam in Solem immersam ibi spectari 3, 6 &c. digitis, sive in immersione sive in emersione. Puncta ergo omnia, consequenter etiam lineas rite determinavimus. Simili discursu patet de lineis spectantibus ad Eclipsim non horizontalem; pro quâ, quia punctis Disci usi sumus spectantibus ad horas simul, & digitos; ad horas simul, & digitos spectant puncta inventa in Mappâ; & quia digitorum lineæ ab occasu in ortum, horarum a Boreâ in Austrum procedunt, rectè tam has, quam illas ductas fuisse constat. Patet ergo ratio totius constructionis. Quod erat &c.

Ufus Tabulae facilis est, & magnam partem in ipsa constructione expositus: cavenda tamen confusio. Quare, ut dictum est supra, horæ, & lineæ digitorum Eclipsis

phis non horizontalis nil habent commune cum lineis phasium horizontalium, præterquàm summæ Eclipsis. Itaque ubi linea aliqua earum horarum secat li: eam aliquam phasis horizontalis, duo ibi indicantur; nempe eo in loco summam Eclipsim spectari eâ horâ, & quantam lineæ digitorum ab occasu in ortum innuunt: alterum ibidem Solem oriri, aut respectivè occidere cum defectu, quem linea phasis horizontalis eam horam interfecans notat; eritque in immersione, si de ortu Solis res sit; in emersione, si de occasu: nam prædictæ lineæ horariæ ad lineas immersionis in occasu, & emersionis in ortu non perveniunt.

Præterea Cum lineæ Eclipsis horizontalis in ortu discretæ non sunt à similibus in occasu, diligenter discernendæ earum partes. Nam linea summæ Eclipsis à linea horæ 24 summæ Eclipsis non horizontalis secernitur; ita ut ejus pars ad occidentem tota indicet summam Eclipsim in ortu Solis; ac tota pars in orientem, in occasu Solis. Punctum concursus ad utrumque spectat. Similiter lineæ initii, & finis secernuntur in punctis concursuum, in quibus binæ similes coeunt; & à concursu in occidentem ad Solis ortum, in orientem ad occasum, pertinent, communes concursus ad utrumque. Ratio est, quia hi tres concursus respondent Disci puncto B, quod in declinatione Solis ad Polum conspicuum spectat ad eum Parallelum, in quo centrum Solis tunc præcisè descendit usque ad horizontem, ac statim iterum ascendit; quare ortus, & occasus, seu potius quasi ortus, & occasus idem est momentum. In declinatione oppositâ spectat ad Parallelum, in quo centrum Solis præcisè usque ad horizontem pervenit, ac statim incipit rursus mergi. Hinc etiam ea tria puncta in Mappâ ortui, occasuique communia sunt. Cætera peripheriæ Disci puncta hinc, & inde a puncto B vel ad solum ortum, vel ad solum occasum referuntur; idèò similiter accidit prædictis lineis ultra citraque concursuum puncta. Notandum autem concursum linearum initii semper esse orientaliorem.

con-

concurfu linearum finis, quoties discreti ab invicem sunt. Cum enim in concursus ad ortum simul, & occasum referantur, & umbra loca orientalia serius attingat, quàm occidentaliora, & relinquat prius occidentaliora, quàm orientaliora, locus in quo Sol oritur, & occidit initio Eclipsis necessario occidentalior est eo, in quo sub eodem Parallelo oritur, occiditque in fine.

Consideranda Ulterius sunt puncta quædam, in quibus prædictæ tres lineæ se invicem secant. Linea initii Eclipsis in ortu secare non potest lineam summæ Eclipsis item in ortu, præterquam in limitibus penumbræ Australi, & Boreali. Nam cum ibi Eclipsis etiam summa sit o, ut initio, & fine, nihil est inconueniens: at alibi cum summa Eclipsis adulta sit, si ibi incurreret etiam linea initii in ortu, indicaret Eclipsim incipere simul, & adultam esse, quod est absurdum. Solum, ergo secabit lineam summæ Eclipsis in occasu, indicabitque in loco subiecto communi illi sectioni, Solem incipere tegi in ipso ortu, & in momento summæ obscurationis occidere eâ horâ, quam lineæ horariæ summæ Eclipsis indicant. Similiter linea initii in occasu extra prædictos limites, tantum lineam summæ Eclipsis in ortu secabit; & indicabit eo loci Solem occidere initio Eclipsis, & in momento summæ obscurationis rursus oriri; ideoque ibi Eclipsis præcedenti vespere capte reliquum a summa ad finem sequenti die mane videbitur. Nox ergo in eo loco admodum brevis, ut in priori casu dies: quare prior casus in declinatione tantum ad Polum non conspicuum, posterior in declinatione ad conspicuum, potest contingere. Pariter linea finis Eclipsis in ortu secare potest, extra limites prædictos, tantum lineam summæ Eclipsis in occasu, & linea finis in occasu tantum lineam summæ in ortu. In primo casu notabit in communi sectione ibi Solem occidere cum summo defectu, & in fine Eclipsis rursus oriri die sequenti: in posteriore, Solem oriri cum summo defectu, & in fine Eclipsis occidere; quare, ut supra, in priore casu nox admodum

brevis, in posteriore dies, ideoque in singulis declinatio Solis, ut supra. Item ubi concurrunt linea initii in ortu, & finis in occasu, indicatur ibi Sole oriente incipere obscurationem, quæ toto die perdurans in ipso occasu finitur; hinc pariter dies admodum brevis, & declinatio Solis ad polum non conspicuum. Ubi verò se secant linea finis in ortu, & initii in occasu, indicatur ibi Solis occultationem incipere vesperi præcedenti in ipso occasu ac Eclipsi totam noctem perseverante, in ortu diei sequentis finiri: quare nox brevis admodum, & declinatio ad Polum conspicuum. Lineæ horarum initii, & finis numero octavo ductæ indicant horam initii, & respectivè finis in locis sibi subjectis: quæ erit ortus, aut occasus in punctis ubi illæ secant lineas initii, & finis in horizonte. Porro hæ horæ cum lineis digitorum nihil habent commune, cum Eclipsis quantitas initio, & in fine semper sit 0. Momenta inter singulas horas, ut & Eclipsis quantitas in locis lineas digitorum interjacentibus, æstimatione, quantum satis ad intentum, discernuntur.

Tandem plaga defectus Solaris ex Mappâ ita sciatur. Si in Mappâ extat via centri penumbra, omnes regiones eâ Australiores vident Solem deficere in parte Boreali (intellige in summo defectu), Borealiores in Australi. Quæ subsunt viæ centri, defectum centralem vident. Excipe lineas digitorum 12, cum diversæ sunt a viâ centri. Nam si detur umbra pura (id in Mappa notatur adscriptis lineæ centri litteris CT, nempe *centralis totalis*, alias CA, *centralis anularis*) linea 12 digitorum Australior indicat contactum interiorem Solis, & lunæ ad plagam Australem, Borealiorem ad Borealem. In Eclipsi anulari Australior indicat contactum Borealem, Borealiorem Australem, hinc prior refertur ad digitos defectus in plagâ Boreali, posterior in Australi. Si in Mappâ desit viâ centri penumbra, omnibus regionibus apparebit summus defectus in eam plagam, in quam vergit cavitas linearum digitorum Eclipsis non horizontalis exhibentium.

Co-

Coroll. I. Ex Tabula Geographicâ superius descri-
 ptâ mirum in modum declaratur, imò oculis ipsis subii-
 citur totus penumbra in Terrâ progressus in occurrenti-
 bus Eclipsibus, ideoque diversitas tum temporis, tum
 quantitatis, quæ in Solis occultatione iisdem, ac di-
 versis momentis è diversis locis conspiciuntur: aliqua hîc
 ulterius declarare non erit inutile. Et *primò* patet, ei qui
 primus Eclipsim videt vel ultimus, tunc apparere Solis
 extremum occidentale in horizonte, consequenter So-
 lem proximè oriri, vel proximè occidere: nam radii
 Solis, qui penumbram circumscribunt, sunt radii è So-
 lis peripheriâ ad peripheriam Lunæ. Cum ergo penum-
 bra in Terram primò incidit, in eo puncto eam tangit
 radius ex limbo Solis occidentali, ad Lunæ limbum
 orientalem (nam Luna ab occidente Solem orientali-
 rem assequitur); ut etiam in loco, ubi ultimò cernitur
 initium Eclipsis. In iisdem punctis terram tangit pro-
 prius eorum locorum horizon: ergo radius ille & conse-
 quenter extremum Disci Solis occidentale, unde ema-
 nat, sunt in loci horizonte. At cum limbus occidenta-
 lis Solis est in horizonte ortivo, centrum, ac reliquum
 Solare corpus est infra horizontem, sed proximè emer-
 sura; & cum idem limbus est in horizonte occiduo, cen-
 trum, & corpus Solare totum sunt supra horizontem,
 sed proximè occasura: patet ergo propositum. Quia ta-
 men refractionis horizontalis sidera attollit ad 32', & pau-
 lò plus, totidem apparet ferè corpus Solare, hinc in
 priore casu Sol totus supra horizontem apparebit, tan-
 quam nonnihil antea ortus non in ortu viso, in poste-
 riore non nihil supra horizontem elevatus; ideoque non
 in ipso occasu viso; & hinc limites Eclipsis ad ortum, &
 occasum non nihil extenduntur.

II. Licet Sol oriatur saltem proximè ei loco in quo
 sit prima phasis, & occidat proximè ei, ubi ultima, non
 tamen ea loca sunt termini tractus Terrarum in quo Ecli-
 psis spectari poterit, sed etiam aliis locis occidentalio-
 ribus spectabilis erit, quibus momento primæ phasis Sol

adhuc sub horizonte delitescit, & orientalioribus, quibus momento ultimæ phasis jamdiu occidit; licet non integra. Ratio est, quia penumbra crassitiem suam habet satis magnam. Hinc quando ejus limes orientalis Terram attingit, reliqua umbra tota extra Terram est, quæ Lunâ paulatim in ortum procedente sensim Terram subit. Attamen interea Sol, & Luna in oceanum motu diurno rapiuntur, & successivè locis aliis, & aliis occidentalioribus oriuntur, in quæ cum incidere non possit radius Solem, & Lunam tangens, qui ad ortum jam processit incidunt radii intra penumbram, consequenter oritur Sol jam deficiens plus minus, prout axi penumbrae propior, aut ab eo remotior fuerit radius penumbrae in loco Terram tangens; idque tandiu, quandiu locum tangat radius tangens limbum orientalem Solis, & occidentalem Lunæ, qui in oppositâ umbrosi coni superficie existit. Similiter in occasu, quando in loco apparet ultima phasis, eum tangit superficies penumbrae occidentalis; ergo tota penumbra jam extra Terram est, quæ idcirco multò ante à Terra egredi caput. Non autem egredi caput in loco ultimæ phasis, alioquin ibi tunc Sol occidisset: ergo in locis orientalioribus, quibus prius occidit, consequenter ad ea etiam penumbra pervenit, Solisque defectus fuit conspicuus. Itaque linea initii Eclipsis in ortu, in quâ fit prima phasis, & finis in occasu, in quâ linea fit phasis ultima, sunt limites tantum tractus Terrarum, in quo Solis Eclipsis occurrens a principio ad finem spectari poterit.

III. Patet penumbram post initium Eclipsis Terræ ad ortum simul, & occasum diffundi; ad ortum quidem secundum partes orientales, procedente penumbrâ cum Lunâ ad ortum ab occasu; ad occasum secundum partes occidentales, quæ propter motum diurnum Solis, & Lunæ in loca occidentaliora successivè incurrant. Ubi autem limes penumbrae occidentalis Terram strinxit, tum diffusio in occidentem cessat, ac tota in ortum pergit, lentius tamen, quasi Sol, & Luna motum diurnum non ha-

haberent. Contra ante finem Eclipsis Terræ, penumbra in Terrâ postquam ejus limes orientalis eò pervenit, ut Terram tangens immediatè postea eam deferat, tam ab occasu, quàm ab ortu coarctatur, & decrefcit: ab occasu, quia limes penumbrae occidentalis inde ad ortum perpetuò progreditur; ab ortu, nam partes penumbrae orientales successivè aliæ atque aliæ, è Terrâ egrediuntur, donec limbus occidentalis Terram tangat, nempe in loco ultimæ phasis; ac tum Eclipsis Terræ finem habet. Quæ omnia lineæ phasium horizontalium in Mappâ ipsis oculis subiiciunt.

IV. Hinc in eâdem Mappâ sciri potest quantum temporis infumat penumbra, ut Terram subeat secundum totam eam partem quæ subitura est pro Lunæ latitudine, & quantum temporis ab initio emersionis è Terrâ ad finem infumat. Si enim observetur in Mappâ maxima longitudo primæ phasis, & minima in linea finis in ortu, differentia longitudinum in horas, & minuta conversa, dabit primum: alterum similiter habetur ex differentiâ longitudinis ultimæ phasis a maxima longitudine lineæ initii in occasu. Horæ enim, & differentia longitudinum commensurantur. Alia multa consideranti inde eruere proum est.

S C H O E I U M.

Facta descriptio ad intentum satis est, nempe, ut inde tempora, & phases Eclipsis prope veræ pro dato quouis loco cognosci possint, ac præparari necessaria ad observationem. Quod si res ad mathematicum rigorem exacta peteretur, multò majori labore opus esset. Nam *momenta summæ Eclipsos* determinauimus per normales ad Orbitam, quod fortè universaliter verum non est. Licet enim ex omnibus rectis, quæ ab uno puncto ad datam rectam duci possunt, normalis sit brevissima, non tamen est necessariò brevissima omnium etiam obliquarum, quæ ex aliis punctis ad eandem lineam duci possunt
nisi

nisi puncta illa sint omnia in lineâ datâ parallelâ. Porro, cum loca terrestria Opticè, & centrum penumbrae re ipsâ perpetuò moveantur, & non per lineas parallelas, Orbita enim semper recta est; Paralleli, aut sunt Ellipses, aut si lineae rectae, tum maxime ad Orbitam inclinantur, fieri fortè poterit alibi locum à centro penumbrae propius distare, quàm cum sunt ambo in eâ perpendiculari. Tamen discrimen, si quandoque sit, valde modicum erit: Nam cum centrum penumbrae triplo, & quadruplo quandoque velocius moveatur, quàm locus (is enim à limbo occidentali usque ad orientalem ab ortu Solis usque ad occasum pertingit, centrum verò penumbrae non impendit quatuor integras horas) vix continget minimam distantiam abesse ab eo perpendiculari ante, aut post, minuto uno. Nec obstat, quod in *Fig. 27* linea minimae distantiae centri penumbrae ab apparentiâ Pekini recedat a perpendiculari ad Orbitam triginta circiter gradibus: est enim ratio disparitatis. Nam pro eâ phasi puncta horarum, & minutorum in Orbitâ determinata sunt pro Pekino. In horis autem sic determinatis contingere potest, & contigit saepissimè tempora in Orbitâ, & Parallelo cognomina numquam incidere in rectam normalem ipsi Orbitae, consequenter nec locum Terrestrem cum centro penumbrae: hinc minima distantia, quae certò alicubi est, in lineâ obliquâ necessariò constituta est. At in descriptione Typi, & Mappae universalis tempora Orbitae indeterminata, & vaga supponuntur; ita ut aliter ac aliter pro diversis denominari possint. Hinc quia centro penumbrae posito in quovis puncto Orbitae, ex quo ducatur perpendicularis; cum centrum sit sub eâ perpendiculari, aliqua loca Terrestria apparere debent, in quibus ea numeratur hora, quam lineae horariae in Disco indicant, patet pro iis locis punctum illud Orbitae ad eandem horam pertinere: nempe cum centrum Orbitae ibi est, in locis sub eâ perpendiculari ea hora numeratur. Ea ergo loca conveniunt cum centro penumbrae in eadem lineâ ad Orbitam perpendiculari;

Fig. 27.

larè; quare ibi habent a centro penumbrae minimam distantiam, saltim quàm proximè; ut supra dictum est. Similiter neque *variationis diametri apparentis Lunæ* pro variâ ab horizonte altitudine rationem habuimus: cum hæc vel pro loco determinato non sit magni momenti; quanto minus pro Mappâ Generali. Item neque *Refractionis* rationem habuimus, qua cum ortum Solis acceleret, occasum retardet, limites Eclipsis ortivum, occiduumque nonnihil extendit, & phasces horizontales paulo majores aut minores ibi exhibet, quàm in Mappâ notentur, ut in fine *Corollæ* innuitur. Tandem, neque habita est ratio *plagæ defectûs horizontalis*, ratione cujus fieri potest phasim horizontalem in Mappâ indicatam in ortu adhuc sub horizonte latere (amplum enim corpus est, & apparet Sol), aut ante centri Solis occasum jam delituisse; licet refractioni huic defectui plerumque medeatur. Hæc omnia indicanda fuerunt, nè plus dari videatur, quàm reipsâ detur.

Tabulam Geographicam obsurationis Telluris ex Typo universali antecederet descripto deduxi. Methodus hæc perplacuit, tanquam omnium (quantum sum expertus) expeditissima, & simul tutissima. Nam ex unâ parte hic de pauculorum minutorum in longitudinibus, ac latitudinibus discrepantiâ cura esse non debet, quæ nec circino, multò minus oculo discernitur; ex alia parte eadem operâ puncta pro lineis Digitorum simul, & Horarum expeditè admodum obtinentur; ac insuper si quis notabilis error (qui in calculo tam multiplici facile subrepat) fortè committatur, ipsa inspectio Typi (in quo propter descriptos Parallelos propositorum punctorum latitudo præterpropter oculis ipsis manifesta est) illud prodit, monetque ut corrigatur. Cæterum eadem Tabula perfici potest tota ope solius calculi, unice, ad vitandam confusionem, descripto Typo Eclipsis Terrestris, qualis proponitur in 18. hujus; nempe Disco Terræ cum tribus axibus Æquatoris, Eclipticæ, & Orbitæ, ac viâ centri penumbrae, & hac etiam non sectâ in horas, & mi-

& minuta . Id , quod satis innui in *Coroll. 2.* post 24. hujus . Sed ne quis quidquam hîc desideret , placet nunc plenius rem declarare : inde enim , & superius dicta confirmabuntur , elucescentque magis , ut & projectionis hujus præstantia , usufque mirabilis , & amplissimus .

Tab. XI. Fig. 28.

Est ergo Discus Terræ (*Fig. 28.*) pro primo exemplorum , quibus superius usi sumus . In eo meridiana , & axis Æquatoris esto *BT* , Polus *P* , *ET* axis Eclipticæ , *OT* Orbitæ . Angulus *OTP* inventus fuit Gr. 12. 21' 43 *TM* est distantia minima centrorum penumbrae , & Disci , quam invenimus in partibus sinis totius partium 54, 47. Orbita , seu via Lunæ erit *IMF* ad *OT* per *M* normalis . Radius penumbrae *MO* , quem relativè ad sinum totum invenimus partium 526 , 86 . Diameter Solis est similium partium 523 , 13 . Motus æquabilis ☾ a ☉ partium 578 , 10 . Pro re præsentî , quærendæ sunt latitudines , & longitudines plurium punctorum in lineis singulis ducendis Digitorum . Pono pro exemplo lineam Digitorum 6 , quæ concipiatur tanquam ducta (in figura ducenda fuit re ipsa pro demonstratione , nempe *VAR* ; quæ secat *OT* orthogonaliter in puncto 6) . Cogitentur è centro *T* rectæ plures ad dictam lineam , utrinque a *TB* , facientes cum *TB* angulos quoscunque , suppositione tamen notos , puta ad denos gradus ; nempe duæ , altera hinc , inde altera , quæ supponantur facere angulos utrinque grad. 10 , duæ similes , quæ 20 , duæ quæ 30 . &c. Hæ in concursu cum propositâ lineâ Digitorum dabunt puncta , quorum si inveniantur latitudines , ac longitudines poterunt per propositionem in Mappam transferri , ac ibidem duci proposita Digitorum linea . Sint pro exemplo lineæ *TA* , *TR* , quæ cum *TB* faciant utrinque angulos Gr. 30 . Ex datis Radio penumbrae , diametro Solis , ac *TM* minima centrorum distantia , in triangulis 6 *TA* , 6 *TR* ad 6 rectangulis notum est (Schol. post 26 hujus) latus commune *T 6* . Pariter addito , aut subtracto (ut casus tulerit) angulo noto *OTB* , ipsis *BT A* , *BTR* suppositione notis , noti fient anguli 6 *TA* , 6 *TR* , & hinc

hinc eorum complementa $TA6$, $TR6$, Itaque per Trigonometriam inveniuntur hypotenusæ TA , TR , quæ (Coroll. 3. post 9. huj.) sunt sinus distantia a vertice punctorum A , & R ; & hinc per canonicum sinuum noti fient arcus Verticalium respondentes. Cogitati jam ex P polo per A , & R circuli maximi PA , PR erunt complementa latitudinis punctorum A , & R , fientque triangula spherica PAT , PRT , quorum notum est latus commune PT , id est complementum notæ declinationis Solis; latus TA , seu TR supra inventum, & angulus positionis interceptus suppositione notus. Non latebit ergo latus PA , seu PR , quorum complementa sunt quæsitæ latitudines. Notus etiam fiet angulus TPA , seu TPR ; qui in horas, & minuta resolutus dabit distantiam horariam punctorum A , & R a Meridiano, consequenter momentum, quod in ipsis numeratur.

Jam in triangulis rectilineis rectangulis $A6T$, $R6T$ datur latus commune $T6$, item superius inventæ hypotenusæ TA , TR , & anguli omnes. Multipliciter ergo inveniri potest latus $A6$, seu $R6$, hoc est (cogitatis AD , RG ad Orbitam rectis, & hinc Parallelogrammis AM , RM) DM , seu GM . Fiat jam, ut motus horarius in Orbita \odot notus in partibus sinûs totius, ad horam 1, seu $60'$, ita inventa MD , seu MG ad quartum, prodibunt horæ, & minuta, quæ addita, aut subtracta temporis noto puncti M , dabunt momentum conveniens puncto D , seu G in loco, pro quo est Typus. Ex hoc & momento, quod invenimus spectare ad punctum A , seu R invenitur, ut in propositione, longitudo punctorum A , seu R . Ita procedendum pro reliquis punctis quibuscumque in proposita quavis digitorum lineâ. Invenimus ergo latitudinem, & longitudinem propositorum punctorum, unde Tabulæ Geographicae lineas digitorum inscribere possumus. Quod erat unum faciendum. Progressum calculi totius pro puncto A habes in adjectâ formulâ,

Q

Ra-

Radius penumbrae 525, 86	Diameter ☉ 523, 13
Add. TM 54, 47	Dig. 6 261, 57
Sum. TO 580, 33	BTA 30° 0' 0"
Subtr. dig. 6. 261, 57	Subtr. OTB 12 21 43
TC 318, 76	CTA 17 38 17 Sc.l.C. 209118
578, 1 dant temp. 60'	TC 318, 76 l. 2.5034638
Ergo MD 101, 6562	TA 334, 98 2.5243750
Dant 10 30	Gr.respond. 19 32 29 tl. 9.5501475
Hora M . 6 0 15	PTA 30 0 0 Sc.l. 9.9375306
Subtr. 10 30	Inv. 1. 17 5 11 tl. 9.4876781
Hora D 5 49 45	Ex TP 74 19 20
Auf. Hora A 23 14 23	Resid. 57 14 9 Sc.l. 9.7333437
Differ. 6 35 22	TA 19 32 29 Sc.l. 9.9742353
In grad. 98 50 30	Inv. 1. 17 5 11 Sc.C. 29604
Ex long. Pekin.	Lat.q.pū. A 32 14 47 f.l. 9.7271834
133 46 0	Item PTA . 30 0 0 f.l. 9.6989700
Resid. 34 55 30	TA 19 32 29. f.l. 9.5243756
Longitudo puncti A quæsitâ.	PA 57 45 13 f.l.C. 727521
	TPA 11 24 18 f.l. 9.2960977
	Hoc est dist.pun. A à Mer. 0° 45' 37"
	Ergo hora in A 23 14 23.
	Tandem TC 318, 76 l. 2.5034638
	CTA 17 38 17 f.l. 9.4814469
	TA 72 21 43 f.l.C. 209118
	AC , seu MD partium 2.0058225
	101, 6562

Pro punctis in meridianâ ratio calculi habetur in Schol.
post 27. hujus. Licet autem inveniatur hora punctorum A
& R

& R pro tempore, quo centrum penumbrae est in D , vel respectivè G ; quia tamen rarissimè accidet puncta illa, inveniri in hora integra sine fractionibus, ejusmodi calculus satis non est, ut duci exactè possint, saltem methodo certa lineæ horarum: neque res confici potest imaginando ex Polo circulos horarum integrarum ad propositam lineam digitorum. Nam esto PS circulus hor. 22. secans in S lineam propositam. Juncta TS sinu distantia Solis a vertice puncti S , fit quidem triangulum tam sphericum $PS T$, quàm rectilineum $T 6 S$, sed neutrum resolvable. Nam in spherico dantur tantum latus PT , & angulus TPS in hoc exemplo grad. 30. In rectilineo præter angulum rectum 6 datur unicè latus $T 6$. Duo autem data non sufficiunt ad trianguli resolutionem. Hinc nulla est trigonometrica via querendi TS , & cætera inde pendentia. Sed neque mensura locum habet, cum TS supponatur non ducta, imò ignorato puncto S , nec duci possit.

Itaque pro lineis horarum peculiari calculo opus est, cujus progressus is erit. Proponatur ex grad. edicenda longitudo puncti horæ 20. in Parallelo latitudinis grad. 40. (nam supponenda hinc latitudo, sicut supra supposuimus angulum positionis). Queratur (3. Coroll. post 24. hujus) angulus positionis $PT 20$, & quantitas sinus $T 20$, notumque erit punctum 20, ex quo per P Polum arcus circuli maximi 20 P est complementum datæ latitudinis, ideoque notus; in exemplo est Gr. 50. Cogitetur 20 C recta ad OT . Addito, vel dempto (prout casus petit) angulo noto OTB ipsi invento 20 TB , notus fiet $CT 20$, ejusque complementum $T 20 C$, in rectilineo rectangulo $T 20 G$, in quo cum nota sit etiam hypotenusa $T 20$ supra inventa, innotescet latus 20 C , hoc est (cogitata 20 H ad orbitam recta) æqualis HM ; & inde, ut in priori casu, cognoscetur longitudo propositi puncti 20: & quia nota fieri etiam potest TC , & dempta TM ipsa MC , sciri etiam potest Eclipsis quantitas per comparisonem ad radium penumbrae, & Solis diametrum,

que ambo dantur. In exemplo *MC* invenitur major radio penumbrae, ex quo patet Eclipsim ad punctum 20 non pervenire; quod in Figura propositionis 18 oculis ipsis manifestum est. Inventa longitudine puncti 20, cum latitudo supponatur, poterit in Mappa notari tale punctum. Similiter procedendum pro reliquis horis, & Parallelis, puta denum graduum; & duci poterunt lineae horarum. Quod est secundum.

Licet autem in progressu etiam *Eclipsis quantitas*, nota fieri possit; quia tamen rarissime continget eam inveniri tot praecise Digitorum sine fractionibus: hinc similis hinc recurrit difficultas, circa lineas digitorum, quae in priori calculo circa lineas horarias. Patet ergo, si omnia ad certam methodum sint exigenda, utroque seorsim calculo opus esse. Propositi calculi seriem exhibet adjecta formula.

<i>TP</i> 20, 60° sc.l. 9.6989700	Ut Hor. ☾ à ☉ 578, 1 ad 60'; ita
<i>P</i> 20, 50° tl. 10.0761865	537, 69 ad 55' 50"
Inv. 1 30 47' 29" tl. 10.7751565	Hor. <i>M</i> . 6 0 15
Ex <i>TP</i> 74 19 20	Auf. 55 50
Resid. 43 31 56 fl.C. 1619306	Hor. <i>H</i> . 5 4 15
Inv. 1 30 47 24. fl. 9.7081367	Auf. 20 0 0
<i>T P</i> 20, 60 0 0 tl. 10.1385606	Diff. 9 4 15
<i>PT</i> 20, 52 9 22 tl. 10.1096279	In gr. 136 6 15
Item <i>P</i> 20, 50° 0 0 fl. 9.8842540	Ex long. Pekin.
<i>TP</i> 20, 60 0 0 fl. 9.9375306	133 46 0
<i>PT</i> 20, 52 9 22 fl.C. 1015460	357 39 45
<i>T</i> 20, 57 9 2 fl. 9.9243306	Longit. puncti 20,
Hujus sinus 840,1014.9243306	
<i>PT</i> 20, 52 9 22	
<i>OTP</i> , 12 21 43 subr	
<i>CT</i> 20, 39 47 39 fl. l. 9.8062015	
<i>C</i> 20 <i>T</i> , 51 12 21 fl. l. 9.8855583	
Sum. supremi & med. 2.7305119, Recta 20 <i>C</i> , h. e. <i>H M</i> .	537, 69
Summa sup. & infimi 2.8098889; Recta <i>CT</i>	645, 49

Est ergo *MC* major radio penumbrae; quare in longitudine 357 39' 45" ad Parallelum latitudinis Gr. 40. Eclipsis non per-tingit.

Punctorum in linea horæ XXIV., seu Meridiana latitudo determinatur calculo ex Schol. post 27. hujus, longitududo per datam hîc praxim.

At punctorum in perimetro Disci (hæc nota sunt calculo tradito in Schol. post 26 huj.) *Latitudo* determinatur per dictam 26 hujus: at longitudo tan pro summa Eclipsi, quàm pro initio, & fine in horizonte, facile item supputatur. Esto notum punctum V pro linea 6 digitorum in perimetro Disci. Scitur ergo arcus BV , ideoque & angulus BTV , cogitato radio TV ; & facta convenienti additione aut subtractione, angulus OTV , nempe $6TV$. In triangulo ergo $6TV$ ad 6 rectangulo, noti sunt anguli obliqui, & hypotenusa TV sinus totus: non latebit ergo latus $V6$, hoc est (intellectâ VN ad orbitam rectâ) ei æqualis orbitæ portio NM ; unde, ut supra, eruetur longitudo puncti V pro summa Eclipsi in horizonte. Pariter, quia nota est $M.6$, scitur ei æqualis VN . Si noto Radio penumbrae supponantur notari ex V in Orbita puncta Q pro initio, & T pro fine, ac jungi VQ , VT : Quoniam in triangulis VNQ , VNT ad N rectangulis nota sunt latus commune VN , & hypotenusa VQ , VT , nempe radius penumbrae, non latebunt latera NQ , NT , quæ (26 1. Eucl.) sunt æqualia, & inde ut supra longitudo puncti V pro initio in Q , & fine in T . Quod est propositum, ac totum quod petebatur. Calculi Methodum hîc subiicio.

Ex form. 1. $T6 = 318,76,2$. a. fin. $18^{\circ} 35' 16''$. Ergo $OV 71^{\circ} 24' 44''$			Adde OB ——— 12 21 43
$MN 947,8338$ comparata cum horar. ☉ à ☉ dat 1h 38' 23" lubit.			Sum. BV gr. — 83 46 27
Ex Hora M 6 0 15			$BV 8,^{\circ} 46 27''$ L.c. 9.0351040
Hora N 4 21 52 Pro sum. Ecl.			$BP 15.40 40$ L.c. 9.9815545
N subtr. pro in. 47 6 ad. pro fine			Larit. P 5 59 36 L.c. 9.0187540
Hora in Q 3 34 46 pro initio			It. $BP 15.40 40$ L. 9.4317288
Hora in T 5 8 18 pro fine in horizonte.			$BV 83 46 27$ L.c. 9.0177889
Ini.	Summa	Finis	At. sem. 92 41 19 L.c. 8.4595177
3h 34' 46"	4h 21' 52"	5h 8' 18"	Ergo hor. nrt. in $P 17^h 53' 15''$
Hor. ort. ☉	Hor. ort. ☉	Hor. ort. ☉	It. $OTV 71 24 44$ L.c. 9.9767333
17 53 10	17 53 10	17 53 10	$TV 1000$ ——— 3.0000000
9 41 36	10 28 42	11 15 48	$6V$, seu $MN 947,8338$ 1.9767333
In grad.	In gr.	In gr.	Tandem $T6$ 318, 76
145 24 0	157 10 30	168 57 0	Auf. TM 54, 47
Ex lon. Pek.	Ex lon. Pek.	Ex lon. Pek.	$M6$ 264, 29
133 46 0	133 46 0	133 46 0	V R. pen. 525, 36
Long. qu.	Long. qu.	Long. qu.	Sum. 750, 15 2.8977095
348 22 0	336 35 30	324 49 0	Differ. 26, 57 2.4160910
Coroll. I. Si per primam formulam inveniatur puncta Digitorum in TE axe Eclipti- cæ, qui exhibet hujus nonage- simum, duci poterit linea non- agesimi, sub qua quæ erunt loca videbunt summam Eclip- simi ☉ in nonagesimo.			Sum. Log. 5.3138005
			Semif. $Q N$, vel $N T$ 2.6569702
			454, 1245
			Quæ comparata cum horar. ☉ à ☉ 178, 1 dar temporis 0h 47' 6"

II. Si idem fiat circa similia puncta axis Orbitæ OT
duci poterit linea, sub qua quæ erunt loca videbunt
sum-

sumum defectum ☉ in momento, quo fit summa Eclipsis Terræ.

III. Si applicetur formula tertia aliis punctis horariis, vel etiam digitorum, duci poterunt lineæ initii, finis &c. in qualibet alia hora non horizontali, ut innuimus fieri posse per praxim propositionis. En igitur quomodo res tota conficiatur, etiam non descripto Typo universali cum Parallelorum, & horarum lineis. At quantum sit compendium laboris in praxi propositionis, licet describendus sit ille Typus, si utraque methodo rem semel aggrediaris, me non dicente, experimento cognosces.

Cæterum praxis primi exempli molliri nonnihil potest; si nempe anguli positionis supponantur bini & bini æquales utrinque ab axe Orbitæ, non ab axe Æquatoris: sic enim confluent triangula rectilinea ad axem Orbitæ rectangula, inter se æquiangula, & propter latus commune, omni sensu æqualia: hinc resolutio uno alterum quoque resolutum erit; & utriusque puncti eadem erit differentia longitudinum a longitudine, quam supponit hora puncti *M*, una quidem per defectum, ideoque subtractiva, altera per excessum additiva.

In praxi tertii exempli; quia *T6*, *6V* normales (ita de similibus) ac *T6* nota est in partibus sinûs totius, ideoque ex canone sinuum notus est arcus, cujus est sinus; notus etiam erit ejus arcûs complementum, cujus sinus est *6V*, quare sine alio calculo ex eodem canone excerpitur *6V*. Ut quoniam in exemplo *T6* invenitur sinus grad. 18 35' 16" erit *6V* sinus grad. 71 24' 44". In praxi secundi exempli compendium nullum mihi occurrit. Solum noto in Æquatore addendum log. sin. datæ declinationis, ac log. sin. distantie datæ horæ a meridie. Summa erit log. sin. anguli positionis; cui addendus, vel demendus angulus axium Orbitæ, & Æquatoris. Item summa log. sin. distantie datæ horæ a meridie; cum log. sin. declinationis dabit log. sin. quæsitæ distantie Solis à vertice, nempe *T20*; unde ut supra, eruetur horæ propositæ quæsitæ longitudo.

PRO-

PROPOSITIO XXIX. PROBL. XXI.

Peculiarior circa Lunæ Eclipses.

*Tab. XI. Fig. 29.
& Tab. XII. Fi-
gura 30.*

Dictum est sæpius traditam methodum etiam Luna-
ribus Eclipsibus aptam esse, quod per se patet :
Eclipses enim Terræ, ac Lunæ similiter, ac è simili cau-
sa accidunt. Verùm, quia diversimodè nonnihil am-
bræ accipiuntur, nec non diversimodè spectantur, pe-
culiaria quædam pro Lunaribus notanda sunt. Diversi-
modè accipiuntur : nam Eclipsis Lunæ non censetur, ni-
si umbram puram Terræ Luna aliquo modo subeat, nul-
lâ habitâ penumbrae ratione ; sive, quod hæc nudis ocu-
lis non appareat ; sive quod ejusmodi Eclipses Lunæ in
Terræ sola penumbra Astronomiæ inutiles sint, cum pe-
numbrae fines summe diluti discerni non possint ; ideo-
que nec defectus tempora, & phases. At verò Eclipsis Tel-
luris attenditur modò tantillum penumbrae Terram in-
tret ; quia tunc omnino alicubi Sol deficere spectatur.
Diversimodè spectantur : Nam Eclipsim Terræ quasi è
Luna intuemur in Disci Terræ parte superiori illumina-
ta, & diurna ; Lunæ verò è Terra, ideoque in Disci
per Cælum Lunare facie obscura, ac nocturna. Itaque
observanda discrimina breviter expono.

I. In Eclipsi Lunari Radius Disci supponendus
æqualis Radio umbræ Terrestris in loco transitus Lunæ,
qui radius methodo communi determinandus. Patet
enim tamdiu esse Eclipsim, quandiu aliquid Lunæ intra
talem Discum involvitur. Discus is est sectio con-
i umbrosi Terræ cum plano parallelo illius basi, nempe basi
hemisphæriorum terrestrium illuminati, & obscuri ;
ideoque (4. 1. Apoll.) circulus est, minor quidem præ-
dictâ basi, cum sit vertici con-
i sensibilibiter vicinior ; in
eo tamen projectiones circularum Terrestrium, ac Cœ-
lestium (2. 1. hujus) similes sunt iis, quæ in Disco Terræ
sunt ; consequenter eadem omninò ratione delineantur.

II. Quia

II. Quia Luna ipsa umbram subit, ubi in Eclipsi Terræ adhibetur Radius penumbrae, hinc usui erit Lunæ Radius apparens pro tempore, & quantitas Eclipsis æstimatur per comparisonem ad Lunæ diametrum in 12 æquales partes sectam.

III. In Eclipsibus Terræ partem Disci occidentalem statuimus ad sinistram, orientalem ad dextram. In Lunaribus fit oppositum: Nam spectans Eclipsim Terræ è Luna obtutu converso in boream, in quo hemisphærio nos sumus, occidentem habet ad sinistram, orientem ad dexteram. At spectans Eclipsim Lunæ quæ respectu nostri australior est convertitur in Austrum, ideoque occasum ad dexteram habet, ortum ad lævam. Hinc cum tam penumbra, quàm Luna ab occasu in ortum progrediantur, in priore casu ponimus penumbram a sinistra ad dexteram, contra in posteriore Lunam pergere. His servatis discriminibus, cætera omnia perinde, ac in Eclipsi Terræ; sive circino, sive calculo (19, & 20 hujus) expediuntur.

IV. Eclipsis Lunaris phases, ubicumque ea fuerit conspicua, eodem reali momento eadem sunt, cum Luna ipsi Disco incumbat. Hinc absque peculiari schemate in ipso Disco exhiberi possunt. Nam secta pro more via Lunæ in horas, semihoras &c., intervallo dati Radii Lunæ factis centris in punctis Orbitæ, in quibus accidit initium, & finis Eclipsis, item summa, hoc est media, ductisque circulis, exhibitæ erunt hæ tres phases. Similiter factis centris in aliis Orbitæ punctis, ut semihorarum, quadrantum &c., ducti eodem radio arcus intra Discum cæteras phases expriment. Ut autem singulæ statui possint in ea, quam habebunt inclinatione ad horizontem, quærendi, & delineandi verticales Solis, hoc est umbræ in singulis phasibus. Verticales hi non solum diversi sunt in phasibus aliis, & aliis, sed etiam in eadem, prout è diversis locis spectatur. Loca enim Terrestria, ut singula proprium horizontem, sic, & proprium Zenith, propriosque peculiare habent ver-

ticales. Hinc licet phasis quælibet eadem ubique appareat, non tamen similiter posita ubique. Verticales hujusmodi pro dato loco, ac momento (Coroll. 2.14. hujus) inveniri possunt: sed expeditius facies, si partem necessariam arcus nocturni paralleli dati loci describas in horas &c. sectam. Nam ad hujus puncta cognomina punctis Orbitæ, in quibus est centrum Lunæ in datis phasibus, ductæ rectæ à centro Disci, erunt verticales quæsitæ, ut ostendit *Fig. 29.* in verticalibus initii, finis, & summæ Eclipsis pro Parallelo latitudinis Borealis Grad. 25 25', longitudinis 131 30' circiter, ubi hæc scribo. Est autem Typus Eclipsis Lunaris diei 28 Maji anni 1733, pro cujus observatione Typum paraveram; usum tamen ejus Cælum integrè nubilum, ac pluvium non concessit.

Fig. 29.

Quod si placeat (ut satius est) omnes Eclipsis phases in unico Lunæ Disco exhibere, ut superius pro Eclipsi Solis; id etiam licet; pro quo ita procedi potest. Centro quovis *M* describatur Discus Lunæ, quem per *M* secatur Orbita *AMB*. Ad hanc per *M* agatur normalis Orbitæ axis *MT*, in quo abscindatur *MT* æqualis minimæ distantie centrorum Lunæ, & umbræ in summa Eclipsi. Centro *T*, radio datæ umbræ in convenienti ratione ad Radium assumptum Lunæ, describatur umbræ circulus. Clarum est haberi phasim summæ Eclipsis; ac potest juxta dicta duci *ZTN* verticalis summæ Eclipsis. Per *T* agatur occulta *ITF* Parallela Orbitæ, in eaque dividantur horæ &c. omnino, ut in ipsa Orbita, sed ordine inverso, nempe *TI* habeat puncta rectæ *MB*, ac *TF* convenientia rectæ *MA*. In hac recta factis centris in punctis temporis convenientis exhibendis phasibus, Radio umbræ describantur arcus intra Discum Lunæ, & factum erit, quod petitur. Arcus notati per puncta exhibent phases emerfionis. Verticales ex Typo, ut etiam linea Eclipticæ ejusque axis huc transferri possunt pro libito.

Fig. 30.

Ratio constructionis clara est; cum enim tanta sit pha-

phasis, quanta Lunæ pars est intra umbram; Luna autem
 similiter immergatur, siue ipsa umbram immotam subeat
 ab occasu in ortum, siue fingatur Lunam immotam um-
 bra æquali progressu ab ortu in occasum invadere, & in
 constructione hoc postremum factum sit; patet exhiberi
 phases petitas. At lineas verticalium idem hic præstare,
 ac supra in Disco, sic ostendo. Esto CT verticalis initio
 Eclipsis, cum Lunæ centrum est in B . MB , TI sunt (ex
 constructione) parallelæ, & æquales; si ergo jungantur BT ,
 MI æquales item (33 1 Euclid.) & Parallelæ erunt. Du-
 cta BC ex centro Lunæ initio Eclipsis ad datum locum,
 Terrestrem C , fiat angulus AMD æqualis angulo MBC ,
 & MD æqualis BC , ac jungantur ID , CD . Quoniam
 angulus externus AMD factus est æqualis interno, &
 opposito MBC , rectæ MD , BC (27 1 Euclid.) sunt
 parallelæ: factæ sunt autem & æquales: ergo MD , CB
 (33 1 Euclid.) Parallelæ sunt, & æquales: Cum ergo
 etiam MB , IT parallelæ sint, & æquales, etiam CD
 talis erit ipsi IT , & DI ipsi CT . Si itaque CT statua-
 tur normalis ad horizontem, & DI (8 1 1 Euclid.) ad
 eundem recta erit. Est autem DI verticalis initio Ecli-
 psis, si tunc centrum Lunæ ponatur in M : nam Trian-
 gula BCT , MDI , quorum latera omnia ostensa sunt
 æqualia, æqualia sunt inter se, (8 1 Euclid.) in omni
 sensu, & similiter posita propter angulos MBC , AMD
 æquales: ergo data phasis similiter sita crit ad horizon-
 tem, siue utaris CT , siue DI pro linea verticali. Eo-
 dem discursu ostenditur de cæteris. Dixi *similiter pos-
 ta ad horizontem*, quia hoc satis est ad intentum. Cœ-
 terum, an verticalis hinc an inde sit a centro Lunæ,
 schema hoc non exhibet, uno excepto verticali summæ
 Eclipsis. Nam initio Eclipsis distat centrum Lunæ à ver-
 ticali loci C totâ recta BC , cum tamen in schemate ap-
 pareat MC multò minor. Hoc autem nihil refert: nam
 ex plaga visæ phasis oculus ipse discernit utrum umbræ
 centrum, per quod verticalis ille transit ad has, vel
 illas à Luna partes inveniatur. Poterit autem & hoc

ipsum facile exhiberi, si loco *CT* ducas *DI*, & ita de cœteris verticalibus.

S C H O L I U M.

In neutra datarum praxium licuit unicam lineam pro omnibus verticalibus substituere, ut licuit in schemate Eclipsis Solaris. Ratio est, quia Luna non est immobiliter in linea ad Discum normali in centro ut est Sol. Hinc verticales per Lunæ centrum, utpotè ad Discum inclinati Ellipses sunt aliæ aliis dissimiles pro diversa inclinatione, quæ non solum difficilius delineantur, sed neque est via eas statuendi in situ convenienti. Verum, & si fieri posset, neque expediret. Nam facies Lunæ non homogenea, & æquabilis spectatur, ut facies Solis, in quo nullæ hætenus maculæ constantes visæ sunt. Hinc quia Solis partes oculus non discernit, nisi secundum differentias sursum, deorsum ad Austrum, ad Boream &c. modò defectus Solares exhibeantur quales futuræ sint respectivè ad eas plagarum differentias, spectatoribus sit satis. Non idem contingit in Lunæ plurimas distinctionis notas individuales in suis partibus habente. Et cum sciatur quomodo corpus Lunare ad Orbitam se habeat, inconcinna prorsus res esset, si comparando tuum schema Eclipticum cum Selenographia, inveniretur phasis à te descripta, esto in quantitate, tempore, inclinatione ad horizontem consentiat, tamen alteri Lunæ portioni appicta, in quam non cadit; ac perinde esset ac si phasim Eclipsis Terræ Pekino convenientem Romæ appingeres. Imò, ut puto, non esset inutile in Disco Lunari (nisi ipsa Selenographiâ uti libuerit) puncta insigniora Lunæ in suis locis aptè notare. Sic enim prædefiniri posset, an & quando umbra ad illa appulsura sit, & inde recessura, ut sit locis Terrestribus in Eclipsi Terræ. Ex quo, & differentiâ, si qua in observatione reperitur, forte plura & certiora circa Lunæ librationem, & inde macularum motum paulatim statui possent.

Cete-

Cæterum ex descripto schemate duo intelliguntur . Primum contingere aliquas Lunæ partes integrè emergere ex umbra ante summam Eclipsim, aliquas verò non-nisi post eam immergi . Nam in phasi *ggg* penultima, ante summam Eclipsim umbra pervenit ad *g* in limbo Lunæ orientali, in phasi sequenti *bbb* umbra totum spatium *g e b* reliquit, & in summa Eclipsi adhuc majus *g E t* . Pariter in summa Eclipsi umbra in Limbo Lunæ occidentali attingit punctum *t*, in phasi proximè sequente ascendit ad *m*, & inde adhuc amplius ad *n*; unde postea descendit ad *o* &c. ac spatium totum *n t G* solum post mediam Eclipsim occultatur . Hinc oculo posito in spatio *g E b*, quia apparet defectus Solis, cum è Terra conspiciatur Eclipsis Lunæ, totus defectus Solis ante summam Lunæ Eclipsim absolvitur, in *n t G* tota post . Ex quo iterum patet, cur à fortiori idem accadat Terri-colis in Terræ Eclipsibus . Si enim id in Luna contingit, licèt ea multò minor sit, quàm umbra, multò magis in Terra, quæ multò major, quàm penumbra .

Secundum . Quomodo fiat nonnullas maculas Euna-res diutius hære prope umbræ marginem, nec tamen unquam immergi . Nam maculæ proximæ ultra *E*, & *G* marginem umbræ se quasi lambentem habent ultra horæ quadrantem, nec tamen umbra eas unquam mordet . Posset etiam pro Lunæ Eclipsibus pingi Mappa universalis, ut factum fuit pro Eclipsi Terræ . Sed res haberet laboris multum, nihil utilitatis . Hic enim pro locis Terræ diversis sola intervenit denominationis horarum diversitas, quæ ex differentia longitudinum locorum facillimè, sine alio habetur . Idem valet quoad phases horizontales; cum enim pro dati loci latitudine sciri possit hora ortus, & occasus Solis, ac tempus cuiusvis phasis pro dato loco habeatur in Schemate, ex differentia longitudinum sciri similiter potest phasis proximè vera, in qua in dato loco Luna oritur occidente Sole, aut occidit hoc oriente . Dixi *proximè vera*: Nam cum centra Solis, & Lunæ non opponantur directè nisi

in summa Eclipsi centrali; rarò admodum erit idem momentum ortus, aut occasus Lunæ, quod occasus, & ortus Solis; tamen differentia semper erit admodum modica; cum enim distantia centrorum Lunæ, & penumbrae initio, & in fine Eclipsis, si maxima sit, nunquam impleat 63' in aliis phasibus, patet esse minorem; consequenter altitudo, aut depressio respectu horizontis adhuc minor est. Hujus tamen diversitatis, modicæ licet, haberi ratio potest, aut etiam refractionis. Non tamen tanti videtur hæc summa subtilitas, cum Lunæ, Solisque in horizonte observationes ægerrimè exactæ haberi possint, ipsæ potissimum obstante refractione.

Illud denique notandum, in Lunæ Eclipsibus nil immutari incremento, aut decremento apparenti diametri Lunæ. Nam eadem apparenti mutatione proportionaliter augetur, minuiturve umbrae apparens diameter; & Lunæ partes 12.

PROPOSITIO XXX. PROBL. XXII.

*Siderum sub Lunæ occultationes eadem
methodo construere.*

Quia Luna, ut Solis, ita & aliquorum quandoque Siderum conspectum intercipit, eo modo, quo Terra interposita eripit Lunæ Solis Radios; quæ unica est omnium Eclipsium causa, facile ex dictis inferitur datam methodum etiam Siderum post sive ultra Lunam occultationibus construendis aptam esse. Hinc pauca peculiaria ad materiæ complementum hic adnecto.

I. Radius Disci supponendus æqualis Parallaxi Lunæ horizontali pro tempore veræ conjunctionis Lunæ cum dato Astro. Quod tempus ex longitudinibus Lunæ, & Astri communi methodo determinatur, ut & prædicta parallaxis.

II. In

II. In Disci Polo non Sol, sed datum Astrum erit, cujus longitudinem, latitudinem, Ascensionem rectam, ac declinationem ab Æquatore prænosse opus est. Quibus datis in Disco apparentiæ, Æquatoris, Parallelorum, & axis Æquatoris eodem modo, ac pro Sole determinantur, ac describuntur.

III. Angulus axium Æquatoris, & Eclipticæ hic paulò aliter querendus, ac in Terræ Lunæque Eclipsibus. Licet enim semper sit æqualis complemento anguli rectilinei, quem faciunt communes sectiones Eclipticæ, & Ascensionis rectæ Astri (quodcumque tandem illud sit) cum Disco Terræ; non tamen angulus is rectilineus semper æquatur angulo sphaerico eorundem circulorum, nisi ipsa Ecliptica per Disci Polum transeat; quod in Eclipsibus Terræ, & Lunæ evenit semper, ut ostendimus in secunda hujus: Sol enim Terræ omni caret latitudine. At in aliorum Astrorum occultationibus plerumque non ita est, cum plerumque non in ipsa sint Ecliptica, sed extra eam. Itaque si contingat occultari Astrum, carens latitudine; tunc angulus ille per tertiam hujus queratur. In aliis casibus aliter agendum. Hoc ut oculis subjiciam.

Esto Discus Terræ $ACBD$, AFB Ascensio recta Astri in * Disci Polo extra Eclipticam, quæ sit GFE , & ejus cum Disco communis sectio $GE.L * O$ esto circulus longitudinis Astri secans Eclipticam in a , & Discum in recta LTO . Agatur per T recta CD normalis ad AB communem sectionem Disci cum circulo Ascensionis rectæ. Circuli longitudinum transeuntes per polos Eclipticæ sunt ad Eclipticam recti: Quare angulus $Fa *$ rectus est; & quia etiam Discus rectus est ad circulum longitudinis transeuntem per Disci polum *; Eclipticæ, ac Disci communis sectio ETG (19. 11. Euclid.) ad circulum longitudinis, & hinc ad rectam LO normalis est; Angulus ergo ETO rectus: Axis Eclipticæ jacet in plano circuli longitudinis; cum ergo hujus apparentia in Disco (Coroll. 3. hujus) sit recta LO , in eadem apparet
axis

axis Eclipticæ, consequenter is in Disco est recta LO . Quoniam ETO , CTB ambo recti, ablato utrinque communi CTO , erit reliquus ETC , hoc est æqualis ad verticem DTG reliquo OTB æqualis: est autem DTG complementum anguli GTB Eclipticæ cum circulo Ascensionis rectæ in Disco: ergo angulus axium TB Æquatoris, ac TO Eclipticæ in Disco eodem angulo æqualis. Angulo OTB (Coroll. post 21. 2.^a Theod.) æqualis est sphericus $O * B$ (cùm amborum mensura sit arcus iidem OB) hoc est angulus ad verticem $F * a$, qui major est complemento $* Fa$ anguli spherici Eclipticæ cum circulo Ascensionis rectæ. (Nam $Fa *$ rectus; & in triangulis sphericis tres anguli simul semper excedunt duos rectos): ergo Angulus OTB non est æqualis, sed major quàm complementum anguli $* Fa$. Quod erat ostendendum.

Pro habendo angulo OTB posset quidem quæri angulus ei æqualis $F * a$; in trigono enim $Fa *$ præter angulum rectum a , & latus $a *$ latitudinem datam Astri notum fieri potest latus $a F$, nempe differentia datæ longitudinis Astri à puncto Eclipticæ culminante cum Astro, nempe habente eandem Ascensionem rectam; item (30. hujus) notus fieri potest angulus $aF *$, aut etiam hypotenusa $F *$ differentia declinationis ab Æquatore punctorum $F \& *$, sed quia hæc nonnisi multiplici calculo expediri possunt, melius; & brevius quæretur arcus DG ostensus æqualis ipsi OB quæsito. Quoniam tam Æquator, quàm Discus recti sunt ad circulum Ascensionis rectæ per utriusque Polos transeuntem, etiam eorum communis sectio [19. 11. Euclid.] ad hunc, & rectam AB recta est: hæc ergo est recta CTD , quare Æquator per C , & D transit. Elio ergo Æquatoris circulus CMD secans Eclipticam in Y . In triangulo spherico DYG omnia nota sunt, uno excepto quæsito arcu DG . Nam cum Æquator ac Discus se secent mutuò, & circulus Ascensionis rectæ transeat per utriusque polos, hic (9. 2. Theod.) segmenta illorum bifariam secat.

Sunt

Sunt autem (11. 1. ejusdem) ea segmenta semicirculi :
 Ergo MD quadrans, in quo cum MY sit arcus datæ
 Ascensionis rectæ Aſtri cognoscitur ejus complemen-
 tum YD . Similiter, quia circulus longitudinis tranſit
 per polos Eclipticæ, & Diſci ſe invicem ſecantium in
 ſemicirculis, oſtenditur aG quadrans, in quo dato ar-
 cu Ya longitudine Aſtri, datur ſimiliter ejus comple-
 mentum YG . Angulus ad Y notus item eſt, nempe
 Grad. 23. 30' Eclipticæ cum Æquatore. Pariter quia $*B$
 quadrans, & datur $*MA$ Aſtri declinatio, datur etiam
 MB complementum ejus; pariter, quia $*L$ quadrans,
 in quo datur Aſtri latitudo $a*$, datur etiam ejus com-
 plementum aL . Eſt autem MB meſura anguli YDG
 propter quadrantes DM, DB ; & aL meſura angu-
 li YGD propter quadrantes GI, Ga : ergo anguli
 omnes trianguli YDG , & latera duo YD, YG nota
 ſunt. Ex his datis unica Analogia dupliciter inveniri
 poteſt arcus DG ſic. Logarithmo ſin. Gr. 23. 30' addatur
 vel log. ſin. complementi datæ longitudinis, vel log. ſin.
 complementi datæ Aſcenſionis rectæ, & inſuper priori
 ſummæ addatur complementum ad 10, 0 &c. ſin. comp.
 datæ declinationis Aſtri, vel poſteriori complementum
 ad 10, 0 &c; ſin. comp. datæ latitudinis: utraque ſumma
 mulctata 1 ſiniſtima erit log. ſin. quaſiti arcus DG ; hoc
 eſt BO , ut conſtat ex trigonometria. Quod erat &c.

IV. Angulus axium Eclipticæ, & Orbitæ, ſive
 verus, ſive apparens, prout juxta caſus mox expo-
 nendos alterutro utendum, quaeritur methodo commu-
 ni. Quo habito ducatur in Diſco (4. hujus) axis Eclipti-
 cæ, itemque ad plagam convenientem axis Orbitæ.

V. Latitudo Lunæ in axe Eclipticæ a centro T ab-
 ſcindenda, non erit Lunæ altitudo abſoluta, ſed rela-
 tiva ad datum Aſtrum. Hoc eſt, ſi Lunæ, & Aſtri la-
 titudines fuerint ejusdem ſpeciei, minor è majori ſub-
 trahatur, ac differentia habebitur tanquam Lunæ lati-
 tudo, quæ habebitur pro Boreali, ſi Luna ſit Aſtro Bo-
 realior, & pro Auſtrali, ſi Auſtraliior, licèt reſpectivè
 ad.

ad Eclipticam ambo Borealia sint, vel Australia. Si fuerint diversæ speciei, utriusque summa erit latitudo adhibenda, eritque Borealis, vel Australis, prout fuerit latitudo Lunæ absoluta. Per finem abscissæ latitudinis demissa normalis ad axem Orbitæ erit Orbita in Disco utrinque extendenda, quantum opus fuerit. Si res sit de occultatione fixarum, utendum axium Eclipticæ, & Orbitæ inclinatione vera, consequenter etiam Orbita in Disco erit Orbitæ veræ apparentia, & motus Lunæ in ea dividendus erit motus Lunæ verus in longitudinem. Nam fixarum motus in consequentia tardissimus, intra unam, aut alteram horam omnino insensibilis est. Sed si res sit de erraticis, eorum motus in consequentia, si directi sint; aut in antecedentia, si retrogradi, ratio habenda, ideoque Orbita apparenti, ut in Lunæ, & Solis Eclipsibus utendum: motus item sumendus Lunæ non verus in longitudinem, sed verus à planeta, qui est differentia motus veri Lunæ a vero planeta, si hic directus sit, vel amborum summa, si retrogradus. Et hinc in priore casu angulus axium Orbitæ apparentis, & Eclipticæ major prodibit angulo vero, ut in Eclipsibus Solis, & Lunæ; in posteriore vero prodibit minor. Verum in Saturno, & fortè etiam Jove, præsertim stationariis, aut non multum distantibus a statione, eorum motus horarius dissimulari potest, non secus, ac pro fixis.


VI. Quoniam Stellæ pro punctis haberi possunt, & rectæ ex iis Lunam stringentes sunt ad sensum Parallelæ; Radius penumbrae; seu quasi penumbrae fiet æqualis Radio Lunæ apparenti pro tempore. Si de *Planetis* res sit, & horum diameter pro dato tempore appareat notabilis magnitudinis, Radio Lunæ addatur planetæ apparens diameter, eritque summa Radius penumbrae.

VII. Horæ descriptæ in Disco (25. hujus) hinc sunt horæ Astri, non Solis. Quia autem tempora per Solis cursum metimur, horæ Stellæ ad horas Solares reducendæ sunt. Hoc ex differentia inter datam Ascensionem

nem rectam Stellæ, & Solis quarendam communi methodo, fiet.

Prædictis servatis, cætera omnia fient ac pro Eclipsi Solis. Distantia minima centri penumbrae à dato loco in Disco; erit distantia inde visa centri Lunæ ab Astro, quæ quanta sit facile scitur per comparationem ad minuta dati Radii apparentis Lunæ. Similiter describi posset Mappa universalis, si tanti esset, ut patet ex superius dictis; & frustra esset plura addere.

Patet autem, servatis servandis, eandem methodum applicari posse transitibus *Mercurii sub Sole*, itemque arctis conjunctionibus Lunæ cum Sideribus &c. Quæ singillatim persequi non vacat; & quisque ex superioribus per se enodare poterit. Interea in una eademque methodo facili, & clara habes Eclipsium quarumcumque constructionem. Et hæc de his fatis sunt.



141

Tabula Expansa universalis Angulorum in Disco Terræ, Axium Æqua-
toris & Eclipticæ, ad dena minuta longitudinis veræ Solis in
Ecliptica, in hypothefi ejus maximæ Obliquitatis 23 30'.

Signa		Y		Ω		Diffe- rent.		Signa	
Signorū		Angulus Occid.		Orient.		Sub- defcen.		Signorū	
G	M	G	"	"	"	"	"	M	G
0	0	23	30	0				0	30
1	10	23	29	59		1		50	
	20	23	29	58		1		40	
	30	23	29	57		1		30	
	40	23	29	55		2		20	
	50	23	29	52		3		10	
	0	23	29	48		4		0	29
	10	23	29	44		4		50	
	20	23	29	39		5		40	
	30	23	29	33		6		30	
	40	23	29	27		6		20	
	50	23	29	20		7		10	
	0	23	29	13		7		0	28
2	10	23	29	5		8		50	
	20	23	28	57		8		40	
	30	23	28	48		9		30	
	40	23	28	38		10		20	
	50	23	28	28		10		10	
	0	23	28	17		11		0	27
	10	23	28	5		12		50	
	20	23	27	53		12		40	
	30	23	27	40		13		30	
	40	23	27	26		14		20	
	50	23	27	12		14		10	
	0	23	26	57		15		0	26
3	10	23	26	41		16		50	
	20	23	26	25		16		40	
	30	23	26	8		17		30	
	40	23	25	50		18		20	
	50	23	25	32		18		10	
	0	23	25	13		19		0	25
	G	M	G	"	"	"	"	M	G
	Signorū	Orient.	Occid.	Angulus	Diffe- rent.	Signorū			
	Signa	♌	♋	Adde Ascen.	Signa				

Signa	Y	Ω	Diffe- rent.	Signa		
Signorū	Occid.	Angulus Orient.	Sub- defcen.	Signorū		
G	M	G	"	M	G	
5	0	23 25 13		0	25	
	10	23 24 54	19	50		
	20	23 24 34	20	40		
	30	23 24 13	21	30		
	40	23 23 53	21	20		
	50	23 23 30	22	10		
6	0	23 23 7	23	0	24	
	10	23 22 44	23	50		
	20	23 22 20	24	40		
	30	23 21 55	25	30		
	40	23 21 30	25	20		
	50	23 21 4	26	10		
7	0	23 20 37	27	0	23	
	10	23 20 10	27	50		
	20	23 19 42	28	40		
	30	23 19 14	28	30		
	40	23 18 45	29	20		
	50	23 18 15	30	10		
8	0	23 17 45	30	0	22	
	10	23 17 14	31	50		
	20	23 16 42	32	40		
	30	23 16 10	32	30		
	40	23 15 37	33	20		
	50	23 15 4	33	10		
9	0	23 14 30	34	0	21	
	10	23 13 55	35	50		
	20	23 13 20	35	40		
	30	23 12 44	36	30		
	40	23 12 7	37	20		
	50	23 11 30	37	10		
10	0	23 10 52	38	0	20	
G	M	G	"	"	M	G
Signorū	Orient.	Occid.	Angulus	Diffe- rent.	Signorū	
Signa	♊	♉	Adde Ascen.	Signa		

Signa	Y	☿	Diffe- rent.	Signa		
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Sub- Defect.	Signorū		
G	M	G	"	M	G	
10	0	23	10 52		0 20	
	10	23	10 13	39	50	
	30	23	9 34	39	40	
	20	23	8 54	40	30	
	40	23	8 13	41	20	
	50	23	7 32	41	10	
11	0	23	6 50	42	0 19	
	10	23	6 8	42	50	
	20	23	5 25	43	40	
	30	23	4 41	44	30	
	40	23	3 57	44	20	
	50	23	3 12	45	10	
12	0	23	2 26	46	0 18	
	10	23	1 40	46	50	
	20	23	0 53	47	40	
	30	23	0 5	48	30	
	40	22	59 17	48	20	
	50	22	58 28	49	10	
13	0	22	57 39	49	0 17	
	10	22	56 49	50	50	
	20	22	55 58	51	40	
	30	22	55 7	51	30	
	40	22	54 15	52	20	
	50	22	53 22	53	10	
14	0	22	52 29	53	0 16	
	10	22	51 35	54	50	
	20	22	50 40	55	40	
	30	22	49 45	55	30	
	40	22	48 49	56	20	
	50	22	47 53	56	10	
15	0	22	46 56	57	0 15	
G	M	G	"	"	M	G
Signorū	Orient Occid- Angulus		Diffe- rent.	Signorū		
Signa	☿	☿	Adde A fecu.	Signa		

Signa		Y	☿	Diffe- rent.	Signa	
Signorū		Angulus Occid. Orient.		Sub- Defect.	Signorū	
G	M	G	"	"	M	G
15	0	22	46	56		0 15
	10	22	45	58	58	50
	20	22	45	0	58	40
	30	22	44	1	59	30
	40	22	43	1	60	20
	50	22	42	1	60	10
16	0	22	41	0	61	0 14
	10	22	39	59	61	50
	20	22	38	57	62	40
	30	22	37	54	63	30
	40	22	36	51	63	20
	50	22	35	47	64	10
17	0	22	34	42	65	0 13
	10	22	33	37	65	50
	20	22	32	31	66	40
	30	22	31	24	67	30
	40	22	30	17	67	20
	50	22	29	9	68	10
18	0	22	28	0	69	0 12
	10	22	26	51	69	50
	20	22	25	41	70	40
	30	22	24	30	71	30
	40	22	23	19	71	20
	50	22	22	7	72	10
19	0	22	20	55	72	0 11
	10	22	19	42	73	50
	20	22	18	28	74	40
	30	22	17	14	74	30
	40	22	15	59	75	20
	50	22	14	44	75	10
20	0	22	13	28	76	0 10
G	M	G	"	"	M	G
Signorū		Orient. Occid. Angulus		Diffe- rent.	Signorū	
Signa		☿	☿	Adde- A fecu.	Signa	

Signa		Y		Diffe- rent.		Signa	
Signorū		Angulus Occid. Orient.		Subt. deficien.		Signorū	
G	M	G				M	G
20	0	22	13	28		0	10
	10	22	13	11	77	50	
	20	22	10	54	77	40	
	30	22	9	36	78	30	
	40	22	8	17	79	20	
	50	22	6	58	79	10	
21	0	22	5	38	80	0	9
	10	22	4	17	81	50	
	20	22	2	56	81	40	
	30	22	1	34	82	30	
	40	22	0	12	82	20	
	50	21	58	49	83	10	
22	0	21	57	25	84	0	8
	10	21	56	1	84	50	
	20	21	54	36	85	40	
	30	21	53	10	86	30	
	40	21	52	44	86	20	
	50	21	50	17	87	10	
23	0	21	48	50	87	0	7
	10	21	47	22	88	50	
	20	21	45	53	89	40	
	30	21	44	23	91	30	
	40	21	42	53	90	20	
	50	21	41	22	91	10	
24	0	21	39	51	91	0	6
	10	21	38	19	92	50	
	20	21	36	46	93	40	
	30	21	35	13	93	30	
	40	21	33	39	94	20	
	50	21	32	4	95	10	
25	0	21	30	29	95	0	5
G	M	G	"	"	"	M	G
Signorū	Orient.	Occid.	Angulus	Adde	Afocen.	Signorū	
Signa	mp	X	Diffe- rent.			Signa	

Signa		Y		Angulus		Diffe rest.		Signa	
Signorū				Occid. Orient.		Subt. deficen.		Signorū	
G	M	G						M	G
23	30	21	30	29				0	5
	10	21	28	53			96	50	
	20	21	27	17			96	40	
	30	21	25	40			97	30	
	40	21	24	2			98	20	
	50	21	22	24			98	10	
36	0	21	20	45			99	0	4
	10	21	19	6			99	50	
	20	21	17	26		100	40	40	
	30	21	15	45		101	30	30	
	40	21	14	4		101	20		
	50	21	12	22		102	10		
27	0	21	10	39		103	0	3	
	10	21	8	56		103	50		
	20	21	7	12		104	40		
	30	21	5	27		105	30		
	40	21	3	42		105	20		
	50	21	1	56		106	10		
28	0	21	0	9		107	0	2	
	10	20	58	22		108	50		
	20	20	56	34		108	40		
	30	20	54	46		109	30		
	40	20	52	57		109	20		
	50	20	51	8		110	10		
29	0	20	49	18		111	0	1	
	10	20	47	27		111	50		
	20	20	45	35		112	40		
	30	20	43	43		112	30		
	40	20	41	5		113	20		
	50	20	39	57		113	10		
30	0	20	38	3		114	0	0	
G	M	G	"	"	"	"	"	M	G
Signorū		Orient.		Occid.		Adde		Signorū	
		Angulus				Afocen.			
Signa		np		X		Diffe rest.		Signa	

Signa	φ	m	Diffe reut.	Signa		
Signorū	Angulus Orient. Occid.		subt. defect.	Signorū		
G	M	G		M	G	
0	0	20 38	3	0	30	
	10	20 36	9	114	50	
	20	20 34	14	115	40	
	30	20 32	18	116	30	
	40	20 30	22	116	20	
	50	20 28	25	117	10	
1	0	20 26	27	118	0	29
	10	20 24	29	118	50	
	20	20 22	30	119	40	
	30	20 20	30	120	30	
	40	20 18	30	120	20	
	50	20 16	29	121	10	
2	0	20 14	28	121	0	28
	10	20 12	26	122	50	
	20	20 10	23	123	40	
	30	20 8	20	123	30	
	40	20 6	16	124	20	
	50	20 4	11	125	10	
3	0	20 2	6	125	0	27
	10	20 0	0	126	50	
	20	19 57	54	126	40	
	30	19 55	47	127	30	
	40	19 53	40	127	20	
	50	19 51	32	128	10	
4	0	19 49	23	129	0	26
	10	19 47	14	129	50	
	20	19 45	4	130	40	
	30	19 42	53	131	30	
	40	19 40	42	131	20	
	50	19 38	30	132	10	
5	0	19 36	17	133	0	25
G	M	G		M	G	
Signorū	Angulus Orient. Occid.		Addit. Alcen	Signorū		
Signa	Ω	φ	Diffe reut.	Signa		

Signa		φ	m	Diffe. reut.	Signa		
Signorū		Angulus Orient. Occid.		Subt. Defect.	Signorū		
G	M	G	"	"	M	G	
5	0	19	36	17		0	25
	10	19	34	4	133	50	
	20	19	31	50	134	40	
	30	19	29	36	134	30	
	40	19	27	21	135	20	
	50	19	25	6	135	10	
	0	19	22	50	136	0	24
6	10	19	20	33	137	50	
	20	19	18	16	137	40	
	30	19	15	58	138	30	
	40	19	13	39	139	20	
	50	19	11	20	139	10	
	0	19	9	0	140	0	23
	10	19	6	39	141	50	
7	20	19	3	18	141	40	
	30	19	1	57	141	30	
	40	18	59	35	142	20	
	50	18	57	12	143	10	
	0	18	54	48	144	0	22
	10	18	52	24	144	50	
	20	18	49	59	145	40	
8	30	18	47	34	145	30	
	40	18	45	8	146	20	
	50	18	43	42	146	10	
	0	18	40	15	147	0	21
	10	18	37	47	148	50	
	20	18	35	19	148	40	
	30	18	32	50	149	30	
9	40	18	30	21	149	20	
	50	18	27	51	150	10	
	0	18	25	20	151	0	20
	G	M	G	"	"	M	G
Signorū		Angulus Orient. Occid.		Addit. Alcen.	Signorū		
Signa	Ω	φ		Diffe. reut.	Signa		

Signa	Ꝣ	Ꝣ	Diff. reor.	Signa	
Signorū	Angulus Occid.Orient.	subt. defcen.	Signorū		
G	M	G	"	M	G
10	0	18 25 20		0	20
	10	18 22 49	151	50	
	20	18 20 17	152	40	
	30	18 17 44	153	30	
	40	18 15 11	153	20	
	50	18 13 37	154	10	
11	0	18 10 3	154	0	19
	10	18 7 28	155	50	
	20	18 4 53	155	40	
	30	18 2 17	156	30	
	40	17 59 41	156	20	
	50	17 57 4	157	10	
12	0	17 54 26	158	0	18
	10	17 51 49	158	50	
	20	17 49 9	159	40	
	30	17 46 29	160	30	
	40	17 43 49	160	20	
	50	17 41 8	161	10	
13	0	17 38 27	161	0	17
	10	17 35 45	162	50	
	20	17 33 2	163	40	
	30	17 30 19	163	30	
	40	17 27 35	164	20	
	50	17 24 51	164	10	
14	0	17 22 6	165	0	16
	10	17 19 21	165	50	
	20	17 16 35	166	40	
	30	17 13 48	167	30	
	40	17 11 1	167	20	
	50	17 8 13	168	10	
15	0	17 5 25	168	0	15
G	M	G	"	M	G
Signorū	Angulus Orient. Occid.	Adde Afcen.	Signorū		
Signa	Ꝣ	Ꝣ	Diff. reut.	Signa	

Signa	Ꝣ	Ꝣ	Diff. reut.	Signa	
Signorū	Angulus Occid. Orient.	Subt. Defcen.	Signorū		
G	M	G	"	M	G
15	0	17 5 25		0	15
	10	17 2 36	169	50	
	20	16 59 47	169	40	
	30	16 56 57	170	30	
	40	16 54 7	170	20	
	50	16 51 16	171	10	
16	0	16 48 24	172	0	14
	10	16 45 32	172	50	
	20	16 42 39	173	40	
	30	16 39 46	173	30	
	40	16 36 52	174	20	
	50	16 33 58	174	10	
17	0	16 31 3	175	0	13
	10	16 28 7	176	50	
	20	16 25 11	177	40	
	30	16 22 14	177	30	
	40	16 19 17	177	20	
	50	16 16 19	178	10	
18	0	16 13 20	179	0	12
	10	16 10 21	179	50	
	20	16 7 21	180	40	
	30	16 4 21	180	30	
	40	16 1 20	181	20	
	50	15 58 19	181	10	
19	0	15 55 17	182	0	11
	10	15 52 15	182	50	
	20	15 49 12	183	40	
	30	15 46 8	184	30	
	40	15 43 4	184	20	
	50	15 39 59	185	10	
20	0	15 36 54	185	0	10
G	M	G	"	M	G
Signorū	Angulus Orient. Occid.	Adde Afcen.	Signorū		
Signa	Ꝣ	Ꝣ	Diff. reut.	Signa	

Signa		U	m	Diffe rest.	Signa	
Signorū		Angulus Occid. Orient.		Subt. Defect.	Signorū	
G	M	G	"	"	M	G
20	0	15	36 34		0	10
	10	15	33 49	185	50	
	20	15	30 43	186	40	
	30	15	27 36	187	30	
	40	15	24 29	187	20	
	50	15	21 21	188	10	
21	0	15	18 13	188		9
	10	15	15 4	189	50	
	20	15	11 55	189	40	
	30	15	8 45	190	30	
	40	15	5 35	190	20	
	50	15	2 24	191	10	
22	0	14	59 12	192		8
	10	14	56 0	192	50	
	20	14	52 48	193	40	
	30	14	49 35	194	30	
	40	14	46 21	194	20	
	50	14	43 6	195	10	
23	0	14	39 51	195		7
	10	14	36 45	196	50	
	20	14	33 29	196	40	
	30	14	30 3	196	30	
	40	14	26 46	197	20	
	50	14	23 29	197	10	
24	0	14	20 13	198		6
	10	14	16 53	198	50	
	20	14	13 34	199	40	
	30	14	10 14	200	30	
	40	14	6 54	200	20	
	50	14	3 54	201	10	
25	0	14	0 13	201		5
G	M	G	"	"	M	G
signorū		Orient. Occid. Angulus		Differ. rest.	Signorū	
Signa	Ω	☾		Addē Alfcon.	Signa	

Signa	U	m	Diffe rest.	Signa			
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Subt. Defect.	Signorū			
G	M	G	"	M	G		
25	0	14	0 13	0	5		
26	10	13	56 52	202	50		
	20	13	53 30	202	40		
	30	13	50 8	203	30		
	40	13	46 46	203	20		
	50	13	43 22	203	10		
	0	13	39 59	204	0	4	
	27	10	13	36 34	204	50	
		20	13	33 10	205	40	
		30	13	29 44	206	30	
		40	13	26 18	206	20	
		50	13	22 51	207	10	
		0	13	19 24	207	0	3
28		10	13	15 56	208	50	
		20	13	12 28	208	40	
		30	13	8 59	209	30	
		40	13	5 30	209	20	
		50	13	2 0	210	10	
		0	12	58 30	210	0	2
	29	10	12	55 0	210	50	
		20	12	51 29	211	40	
		30	12	47 58	211	30	
		40	12	44 26	212	20	
		50	12	40 54	212	10	
		0	12	37 21	213	0	1
30		10	12	33 48	213	50	
		20	12	30 15	213	40	
		30	12	26 41	214	30	
		40	12	23 7	214	20	
		50	12	19 32	215	10	
		0	12	15 57	215	0	0
	G	M	G	"	"	M	G
	Signorū	Orient. Occid. Angulus		Diffe- rent.	Signorū		
	Signa	Ω	☾	Addē Alfcon.	Signa		

Signa	II	†	Diffe. rest.	Signa
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Subt. deficen.	Signorū
G M	G	"	"	M G
0	0	12 15 57		0 30
	10	12 12 21	216	50
	20	12 8 45	216	40
	30	12 5 8	217	30
	40	12 1 30	218	20
	50	11 57 52	218	10
1	0	11 54 14	218	0 29
	10	11 50 35	219	50
	20	11 46 56	219	40
	30	11 43 16	220	30
	40	11 39 36	220	20
	50	11 35 56	220	10
2	0	11 32 15	221	0 28
	10	11 28 34	221	50
	20	11 24 52	222	40
	30	11 21 10	223	30
	40	11 17 27	223	20
	50	11 13 44	223	10
3	0	11 10 0	224	0 27
	10	11 6 16	224	50
	20	11 2 32	225	40
	30	10 58 47	225	30
	40	10 55 2	225	20
	50	10 51 16	226	10
4	0	10 47 30	226	0 26
	10	10 43 44	226	50
	20	10 39 57	227	40
	30	10 36 10	227	30
	40	10 32 22	228	20
	50	10 28 34	228	10
5	0	10 24 45	229	0 25
G M	G	"	"	M G
Signorū	Orient. Occid. Angulus		Adde Alcen.	Signorū
Signa	00	†	Diffe. rest.	Signa

Signa	II	†	Diffe. rest.	Signa
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Subt. deficen.	Signorū
G M	G	"	"	M G
5	0	10 24 45		0 25
	10	10 20 56	229	50
	20	10 17 7	229	40
	30	10 13 17	230	30
	40	10 9 27	230	20
	50	10 5 36	231	10
6	0	10 1 45	231	0 24
	10	9 57 54	231	50
	20	9 54 2	232	40
	30	9 50 10	232	30
	40	9 46 18	232	20
	50	9 42 25	233	10
7	0	9 38 32	233	0 23
	10	9 34 38	234	50
	20	9 30 44	234	40
	30	9 26 50	234	30
	40	9 22 55	235	20
	50	9 19 0	235	10
8	0	9 15 5	235	0 22
	10	9 11 9	236	50
	20	9 7 13	236	40
	30	9 3 16	237	30
	40	8 59 19	237	20
	50	8 55 22	237	10
9	0	8 51 24	238	0 21
	10	8 47 26	238	50
	20	8 43 28	238	40
	30	8 39 29	239	30
	40	8 35 31	239	20
	50	8 31 31	239	10
10	0	8 27 31	240	0 20
G M	G	"	"	M G
Signorū	Orient. Occid. Angulus		Adde Alcen.	Signorū
Signa	00	†	Diffe. rest.	Signa

Signa		II †		Diffe rest.	Signa	
Signorū		Angulus Occid. Orient.		Subt. deficien.	Signorū	
G	M	G	"	"	M G	
10	0	8 27 31			30 20	
	10	8 23 31	240		50	
	20	8 19 31	240		40	
	30	8 15 30	241		30	
	40	8 11 29	241		20	
	50	8 7 28	241		10	
11	0	8 3 26	242		0 19	
	10	7 59 24	242		50	
	20	7 55 22	242		40	
	30	7 51 19	243		30	
	40	7 47 16	243		20	
	50	7 43 13	243		10	
12	0	7 39 9	244		0 18	
	10	7 35 5	244		50	
	20	7 31 1	244		40	
	30	7 26 57	244		30	
	40	7 22 52	245		20	
	50	7 18 47	245		10	
13	0	7 14 42	245		0 17	
	10	7 10 36	246		50	
	20	7 6 30	246		40	
	30	7 2 24	246		30	
	40	6 58 18	246		20	
	50	6 54 11	247		10	
14	0	6 50 4	247		0 16	
	10	6 46 7	247		50	
	20	6 41 49	248		40	
	30	6 37 41	248		30	
	40	6 33 33	248		20	
	50	6 29 24	249		10	
15	0	6 25 15	249		0 15	
G	M	G	"	"	M	G
Signorū	Orient. Occid. Angulus		Diffe rest.	Signorū		
Signa	00	†	Adde Afice.	Signa		

Signa	II	†	Diffe rest.	Signa		
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Subt. deficen.	Signorū		
G	M	G	"	M	G	
15	0	6 25 15		0	15	
	10	6 21 6	249	50		
	20	6 16 57	249	40		
	30	6 12 47	250	30		
	40	6 8 37	250	20		
	50	6 4 27	250	10		
16	0	6 0 17	250	0	14	
	10	5 56 7	250	50		
	20	5 51 56	251	40		
	30	5 47 45	251	30		
	40	5 43 34	251	20		
	50	5 39 23	251	10		
17	0	5 35 11	252	0	13	
	10	5 30 59	252	50		
	20	5 26 47	252	40		
	30	5 22 35	252	30		
	40	5 18 23	252	20		
	50	5 14 10	253	10		
18	0	5 9 57	253	0	12	
	10	5 5 44	253	50		
	20	5 1 31	253	40		
	30	4 57 17	254	30		
	40	4 53 3	254	20		
	50	4 48 49	254	10		
19	0	4 44 35	254	0	11	
	10	4 40 20	255	50		
	20	4 36 5	255	40		
	30	4 31 50	255	30		
	40	4 27 35	255	20		
	50	4 23 20	255	10		
20	0	4 19 5	256	0	10	
G	M	G	"	"	M	G
Signorū	Orient. Occid. Angulus		Diffe rest.	Signorū		
Signa	00	†	Adde Afice.	Signa		

Signa	II	†	Diffe. rest.	Signa
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Subtr. defect.	Signorū
G M	G	n	n	M G
20	0	4 19 5		0 10
	10	4 14 49	256	50
	20	4 10 33	256	40
	30	4 6 17	256	30
	40	4 2 1	256	20
	50	3 57 45	256	10
21	0	3 53 29	257	0 9
	10	3 49 12	257	50
	20	3 44 55	257	40
	30	3 40 38	257	30
	40	3 36 21	257	20
	50	3 32 4	257	10
22	0	3 27 47	257	0 8
	10	3 23 30	258	50
	20	3 19 12	258	40
	30	3 14 54	258	30
	40	3 10 36	258	20
	50	3 6 18	258	10
23	0	3 2 0	258	0 7
	10	2 57 42	258	50
	20	2 53 24	259	40
	30	2 49 5	259	30
	40	2 44 46	259	20
	50	2 40 27	259	10
24	0	2 36 8	259	0 6
	10	2 31 49	259	50
	20	2 27 30	259	40
	30	2 23 11	259	30
	40	2 18 52	259	20
	50	2 14 33	260	10
25	0	2 10 13	260	0 5
G M G " " " M G				
Signorū	Orient. Occid. Angulus		Diffe. rest.	Signorū
Signa	☉	☿	Adde defect.	Signa

Signa	II	†	Diffe. rest.	Signa
Signorū	Angulus Occid. Orient.		Subtr. defect.	Signorū
G M	G	n	n	M G
25	0	2 10 13		0 5
	10	2 5 53	260	50
	20	2 1 33	259	40
	30	1 57 14	260	30
	40	1 52 54	260	20
	50	1 48 34	260	10
26	0	1 44 14	260	0 4
	10	1 39 54	260	50
	20	1 35 34	260	40
	30	1 31 14	261	30
	40	1 26 53	260	20
	50	1 22 33	260	10
27	0	1 18 13	260	0 3
	10	1 13 53	261	50
	20	1 9 32	260	40
	30	1 5 12	261	30
	40	1 0 51	260	20
	50	0 56 31	261	10
28	0	0 52 10	261	0 2
	10	0 47 49	261	50
	20	0 43 28	260	40
	30	0 39 8	260	30
	40	0 34 48	261	20
	50	0 30 27	261	10
29	0	0 26 6	261	0 1
	10	0 21 45	261	50
	20	0 17 24	261	40
	30	0 13 3	261	30
	40	0 8 42	261	20
	50	0 4 21	261	10
30	0	0 0 0	261	0 0
G M G " " " M G				
Signorū	Orient. Occid. Angulus		Diffe. rest.	Signorū
Signa	☉	☿	Adde defect.	Signa

Tabula Caffinianæ pro Eclipsibus Lunæ ab Editore adjunctæ.

Tabula II. (Caffino 28.) Differentiæ inter oppositionem, & medium Eclipsis				
Latitudo	Inclinatio apparens Orbitæ.			
	G. M. 84 30	G. M. 84 25	G. M. 84 20	G. M. 84 15
min.	Differentia inter oppof. & medium Eclipsis.			
0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	0 12	0 12	0 12	0 12
4	0 23	0 23	0 24	0 24
6	0 35	0 35	0 36	0 36
8	0 46	0 47	0 48	0 48
10	0 58	0 58	0 59	1 0
12	1 10	1 10	1 11	1 12
14	1 21	1 22	1 23	1 24
16	1 33	1 34	1 35	1 36
18	1 44	1 46	1 47	1 48
20	1 55	1 57	1 58	2 0
22	2 7	2 9	2 10	2 12
24	2 18	2 20	2 22	2 24
26	2 30	2 32	2 34	2 36
28	2 41	2 44	2 46	2 48
30	2 52	2 55	2 57	3 0
32	3 4	3 7	3 10	3 12
34	3 15	3 18	3 21	3 24
36	3 27	3 30	3 33	3 36
38	3 38	3 41	3 45	3 48
40	3 50	3 53	3 57	4 0
42	4 2	4 5	4 9	4 12
44	4 14	4 17	4 21	4 24
46	4 25	4 28	4 32	4 36
48	4 37	4 40	4 44	4 48
50	4 48	4 52	4 56	5 1
52	5 0	5 4	5 8	5 13
54	5 11	5 16	5 20	5 25
56	5 22	5 27	5 32	5 37
58	5 34	5 39	5 44	5 49
60	5 45	5 50	5 56	6 1
62	5 57	6 2	6 7	6 13
64	6 8	6 14	6 19	6 25
Differ. est Additiva quando inclinatio est verfus Ortum: fubtractiva, quando illa est verfus Occafum.				

Tabula III. (Caffino 29) Semidurationis Eclipsis totalis Lunæ in umbra Terræ .

Latitudo min.	Differencia inter Semidiametros umbræ , & Lunæ .						
	G. M. 24 0	G. M. 25 0	G. M. 26 0	G. M. 27 0	G. M. 28 0	G. M. 29 0	G. M. 30 0
	Semiduratio Eclipsis totalis in minutis gradus .						
0	24 0	25 0	26 0	27 0	28 0	29 0	30 0
1	23 59	24 59	25 59	26 59	27 59	28 59	29 59
2	23 55	24 55	25 55	26 55	27 56	28 56	29 56
3	23 49	24 49	25 50	26 50	27 50	28 51	29 51
4	23 40	24 41	25 41	26 42	27 43	28 43	29 44
5	23 29	24 30	25 31	26 32	27 33	28 34	29 35
6	23 15	24 16	25 18	26 19	27 21	28 22	29 24
7	22 58	24 0	25 2	26 4	27 6	28 8	29 10
8	22 38	23 41	24 44	25 47	26 49	27 52	28 54
9	22 16	23 20	24 23	25 27	26 30	27 33	28 36
10	21 50	22 55	24 0	25 5	26 9	27 13	28 17
11	21 21	22 28	23 35	24 41	25 46	26 51	27 56
12	20 49	21 57	23 5	24 13	25 19	26 25	27 31
13	20 13	21 23	22 33	23 42	24 50	25 57	27 4
14	19 33	20 45	21 56	23 7	24 16	25 25	26 34
15	18 48	20 3	21 17	22 30	23 41	24 52	26 1
16	17 57	19 15	20 32	21 48	23 2	24 14	25 25
17	17 1	18 23	19 43	21 1	22 18	23 33	24 46
18	15 58	17 26	18 50	20 11	21 30	22 48	24 3
19	14 47	16 21	17 50	19 16	20 38	21 59	23 17
20	13 25	15 7	16 43	18 14	19 41	21 5	22 27
21	11 48	13 43	15 27	17 5	18 38	20 6	21 32
22	9 50	12 4	14 1	15 47	17 27	19 1	20 31
23	7 14	10 4	12 20	14 19	16 7	17 48	19 24
24	2 22	7 24	10 17	12 35	14 37	16 27	18 9
25		2 28	7 33	10 30	12 50	14 54	16 46
26			2 34	7 43	10 42	13 5	15 11
27				2 40	7 52	10 55	13 20
28					2 46	8 2	11 7
29						2 52	8 12
30							2 58
31							
32							

Tabula IV. (Cassini 30.) Semidurationis Eclipsis Lunæ in Minutis, & secundis Gradus.

Latitudo min.	Summa Semidiametrorum Lunæ, & umbræ terræ.					
	G. M. 53 °	G. M. 54 °	G. M. 55 °	G. M. 56 °	G. M. 57 °	G. M. 58 °
	Semiduratio Eclipsis Lunæ in minutis, & secundis gradus.					
	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.
0	53 0	54 0	55 0	56 0	57 0	58 0
1	53 0	54 0	55 0	56 0	57 0	57 58
2	52 58	53 58	54 58	55 58	56 58	57 58
3	52 55	53 55	54 55	55 55	56 55	57 55
4	52 51	53 51	54 51	55 51	56 52	57 52
5	52 46	53 46	54 46	55 46	56 47	57 47
6	52 40	53 40	54 40	55 40	56 41	57 41
7	52 33	53 33	54 33	55 34	56 34	57 34
8	52 24	53 25	54 25	55 26	56 26	57 27
9	52 14	53 15	54 16	55 17	56 17	57 18
10	52 3	53 4	54 5	55 6	56 7	57 8
11	51 51	52 52	53 53	54 54	55 56	56 57
12	51 38	52 39	53 40	54 42	55 44	56 45
13	51 23	52 25	53 26	54 28	55 30	56 32
14	51 7	52 9	53 11	54 13	55 15	56 17
15	50 50	51 52	52 54	53 56	54 58	56 0
16	50 32	51 34	52 36	53 38	54 41	55 43
17	50 12	51 15	52 17	53 20	54 22	55 25
18	49 51	50 54	51 57	53 0	54 3	55 6
19	49 29	50 33	51 36	52 40	53 44	54 47
20	49 6	50 11	51 15	52 19	53 23	54 27
21	48 42	49 47	50 52	51 57	53 1	54 6
22	48 16	49 22	50 27	51 33	52 38	53 43
23	47 48	48 55	50 1	51 7	52 13	53 18
24	47 19	48 26	49 33	50 39	51 45	52 51
25	46 48	47 56	49 3	50 10	51 17	52 23
26	46 15	47 24	48 32	49 40	50 47	51 54
27	45 41	46 50	47 59	49 8	50 16	51 24
28	45 5	46 15	47 25	48 34	49 43	50 52
29	44 27	45 38	46 49	47 59	49 9	50 18
30	43 47	45 0	46 12	47 23	48 33	49 43
31	43 5	44 19	45 32	46 45	47 56	49 9
32	42 22	43 36	44 50	46 4	47 16	48 33

Tabulæ IV. (Cassini 10.) continuatio.

Latitude	Summa Semidiametrorum Lunæ, & umbræ terræ.					
	G. M. 59 0	G. M. 60 0	G. M. 61 0	G. M. 62 0	G. M. 63 0	G. M. 64 0
min.	Semiduratio Eclipsis Lunæ in minutis, & secundis gradus.					
	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.
0	59 0	60 0	61 0	62 0	63 0	64 0
1	59 0	60 0	61 0	62 0	64 0	64 0
2	58 58	59 58	60 58	61 58	62 58	63 58
3	58 55	59 55	60 55	61 56	62 56	63 56
4	58 52	59 52	60 52	61 53	62 53	63 53
5	58 48	59 48	60 48	61 48	62 49	63 49
6	58 42	59 42	60 42	61 42	62 42	63 42
7	58 35	59 35	60 36	61 36	62 37	63 37
8	58 27	59 28	60 29	61 29	62 30	63 30
9	58 19	59 20	60 20	61 21	62 22	63 22
10	58 9	59 10	60 11	61 12	62 13	63 13
11	57 58	58 59	60 0	61 1	62 2	63 3
12	57 46	58 48	59 49	60 50	61 51	62 52
13	57 33	58 35	59 37	60 38	61 39	62 40
14	57 19	58 21	59 23	60 24	61 26	62 27
15	57 3	58 5	59 7	60 9	61 12	62 14
16	56 46	57 49	58 51	59 53	60 56	61 59
17	56 28	57 31	58 34	59 37	60 40	61 43
18	56 9	57 13	58 16	59 19	60 23	61 26
19	55 50	56 54	57 58	59 1	60 5	61 8
20	55 31	56 35	57 39	58 43	59 47	60 50
21	55 10	56 14	57 19	58 23	59 27	60 30
22	54 48	55 52	56 57	58 1	59 5	60 9
23	54 24	55 28	56 34	57 38	58 42	59 47
24	53 57	55 2	56 8	57 13	58 18	59 23
25	53 29	54 35	55 41	56 47	57 53	58 58
26	53 0	54 7	55 13	56 20	57 26	58 32
27	52 30	53 38	54 45	55 52	56 58	58 5
28	51 59	53 8	54 15	55 22	56 29	57 37
29	51 27	52 36	53 44	54 52	55 59	57 8
30	50 53	52 3	53 12	54 21	55 29	56 37
31	50 17	51 28	52 38	53 48	54 57	56 5
32	49 40	50 51	52 2	53 12	54 22	55 31

Tabulæ IV. continuatio.

Latitudo	Summa Semidiametrorum Lunæ, & umbræ Terræ.					
	G. M. 53 °	G. M. 54 °	G. M. 55 °	G. M. 56 °	G. M. 57 °	G. M. 58 °
min.	Semiduratio Eclipsis Lunæ in minutis, & secundis gradus.					
	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.
32	42 22	43 36	44 50	46 4	47 16	48 28
33	41 35	42 51	44 6	45 21	46 35	47 48
34	40 47	42 3	43 20	44 37	45 52	47 6
35	39 57	41 14	42 32	43 50	45 7	46 22
36	39 4	40 23	41 42	43 1	44 20	45 36
37	38 8	39 29	40 50	42 10	43 31	44 49
38	37 8	38 32	39 55	41 17	42 39	43 59
39	36 5	37 32	38 57	40 21	41 45	43 6
40	34 59	36 29	37 56	39 23	40 48	42 11
41	33 49	35 21	36 52	38 21	39 48	41 14
42	32 35	34 10	35 44	37 16	38 45	40 13
43	31 16	32 55	34 32	36 7	37 39	39 9
44	29 52	31 35	33 16	34 55	36 30	38 2
45	28 22	30 9	31 55	33 37	35 16	36 52
46	26 43	28 38	30 28	32 15	33 58	35 37
47	24 56	26 59	28 56	30 47	32 35	34 18
48	22 58	25 10	27 16	29 14	31 7	32 54
49	20 45	23 13	25 25	27 32	29 30	31 25
50	18 16	21 0	23 27	25 41	27 48	29 48
51	15 17	18 27	21 12	23 41	25 57	28 4
52	11 28	15 26	18 38	21 24	23 54	26 12
53	5 14	11 36	15 36	18 49	21 37	24 8
54		5 20	11 44	15 45	19 1	21 49
55			5 26	11 52	15 55	19 12
56				5 32	11 59	16 5
57					5 38	12 7
58						5 44
59						
60						
61						
62						
63						
64						

Tabula V. (Cassini 31.) quantitatis Digitorum, & Minutorum Eclipsis.

Differ. Iner. Semi- diam. Tab. & Lunae eclips. Lunae.	Semidiameter Lunae.									
	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.
	14 45	15 0	15 15	15 30	15 45	16 0	16 15	16 30	16 45	
	Digiti, & minuta Eclipsis.									
min.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.	D. M.
0	0 6	0 6	0 7	0 7	0 7	0 7	0 7	0 7	0 7	0 7
2	0 55	0 54	0 53	0 53	0 52	0 52	0 51	0 51	0 50	
4	1 43	1 42	1 41	1 39	1 38	1 37	1 36	1 34	1 33	
6	2 32	2 30	2 27	2 25	2 24	2 21	2 20	2 18	2 16	
8	3 21	3 18	3 15	3 12	3 9	3 6	3 3	3 1	2 59	
10	4 9	4 5	4 2	3 58	3 54	3 51	3 48	3 45	3 42	
12	4 58	4 53	4 48	4 44	4 39	4 35	4 31	4 27	4 24	
14	5 47	5 41	5 35	5 30	5 25	5 20	5 15	5 11	5 7	
16	6 35	6 28	6 22	6 17	6 11	6 5	6 0	5 55	5 50	
18	7 24	7 16	7 9	7 3	6 56	6 50	6 44	6 38	6 33	
20	8 13	8 4	7 56	7 49	7 42	7 35	7 28	7 22	7 16	
22	9 2	8 52	8 43	8 35	8 27	8 19	8 11	8 4	7 58	
24	9 51	9 40	9 30	9 21	9 12	9 4	8 56	8 48	8 41	
26	10 39	10 27	10 16	10 7	9 58	9 49	9 40	9 32	9 24	
28	11 27	11 15	11 3	10 53	10 44	10 34	10 24	10 15	10 6	
30	12 15	12 3	11 51	11 40	11 29	11 18	11 8	10 58	10 49	
32	13 4	12 51	12 38	12 26	12 14	12 3	11 52	11 41	11 32	
34	13 53	13 39	13 25	13 12	13 0	12 48	12 36	12 25	12 15	
36	14 41	14 26	14 12	13 58	13 45	13 33	13 21	13 9	12 58	
38	15 30	15 14	14 59	14 44	14 31	14 18	14 5	13 52	13 40	
40	16 19	16 2	15 45	15 30	15 16	15 2	14 49	14 36	14 23	
42	17 7	16 50	16 32	16 16	16 1	15 47	15 33	15 19	15 6	
44	17 55	17 37	17 19	17 2	16 47	16 32	16 17	16 2	15 48	
46	18 43	18 25	18 7	17 49	17 33	17 17	17 1	16 46	16 31	
48	19 32	19 13	18 54	18 36	18 18	18 1	17 45	17 29	17 14	
50	20 20	20 0	19 41	19 22	19 4	18 46	18 29	18 12	17 56	
52	21 9	20 48	20 28	20 8	19 49	19 31	19 13	18 56	18 39	
54	21 58	21 36	21 14	20 54	20 35	20 16	19 57	19 39	19 22	
56		22 24	22 1	21 40	21 20	21 0	20 41	20 22	20 5	
58				22 27	22 5	21 45	21 25	21 6	20 47	
60						22 30	22 10	21 50	21 30	
62									22 13	
64									22 56	

005663035